
NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA BÁSICA

Voltado para o entendimento da fisiopatologia, neuroanatomia, neurofisiologia e diagnóstico.



Escrito por: **Fabrício Zorzin Borges.**
Escrito em: **25/06/2026 – 15/07/2026**

Sumário |

Capítulo 1. Neuroanatomia e Neurofisiologia. ***(1, 48)***
Capítulo 1.1 – Medula. *(1, 9)*
Capítulo 1.2 – Tronco Encefálico. *(9, 16)*
Capítulo 1.3 – Cerebelo. *(17, 23)*
Capítulo 1.4 – Diencéfalo. *(23, 32)*
Capítulo 1.5 – Telencéfalo. *(32, 48)*
Capítulo 2. Anatomia Vascular. ***(49, 71)***
Capítulo 3. Encefalopatias. ***(72, 93)***
Capítulo 4. Oncologia. ***(94, 136)***
Capítulo 4.1 – Medular. *(94, 113)*
Capítulo 4.2 – Tronco cerebral. *(113, 125)*
Capítulo 4.3 – Encéfalo. *(125, 136)*
Capítulo 5. Anemias. ***(137, 147)***
Capítulo 6. Venenos/Acidentes. ***(148, 178)***
Capítulo 6.1 – Animais. *(148, 155)*
Capítulo 6.2 – Farmacológico. *(155, 166)*
Capítulo 6.3 – Metais Pesados. *(166, 171)*
Capítulo 6.4 – Pesticidas. *(172, 178)*
Capítulo 7. Órgãos Secundários. ***(179, 196)***
Capítulo 8. Manejo do TCE. ***(197, 222)***
Capítulo 8.1 – Principais achados radiológicos. *(197, 210)*
Capítulo 8.2 – Semiologia para identificação. *(210, 213)*
Capítulo 8.3 – Possíveis complicações. *(213, 218)*
Capítulo 8.4 – Manejo do paciente. *(218, 222)*
Capítulo 9. Desenvolvimento Neural. ***(223, 230)***
Capítulo 10. Farmacologia. ***(231, 255)***
Capítulo 10.1 – No tratamento de um AVC. *(231, 237)*
Capítulo 10.2 – No tratamento oncológico. *(237, 240)*
Capítulo 10.3 – No tratamento de demências. *(240, 243)*
Capítulo 10.4 – No tratamento de intoxicações. *(244, 245)*
Capítulo 10.5 – No paciente do trauma. *(245, 248)*
Capítulo 10.6 – De uso continuo. *(248, 251)*
Capítulo 10.7 – Outros fármacos que afetam sistema nervoso. *(251, 255)*
Capítulo 11. Demências. ***(256, 282)***
Capítulo 12. Álcool e Suas Complicações. ***(283, 309)***
Capítulo 13. Processo de Envelhecimento. ***(310, 323)***
Capítulo 14. Principais Más Formações Embrionárias. ***(324, 341)***
Capítulo 15. Genética. ***(342, 362)***
Capítulo 15.1 Mutações do sistema nervoso periférico. *(342, 348)*

Capítulo 15.2 Mutações do sistema nervoso central. *(348, 352)*
Capítulo 15.3 Principais alterações genéticas. *(352, 356)*
Capítulo 15.4 Alterações genéticas raras. *(357, 359)*
Capítulo 15.5 Manejo desses pacientes. *(360, 362)*
Capítulo 16. Características diferencias do S.N.P. ***(363, 376)***
Capítulo 17. Paralisia. ***(377, 402)***
Capítulo 17.1 – Classificações e suas causas. *(377, 396)*
Capítulo 17.2 – Manejo do paciente. *(396, 399)*
Capítulo 17.3 – Fármacos auxiliares para o paciente. *(399, 402)*
Capítulo 18. Bactérias e Fungos. ***(403, 434)***
Capítulo 18.1 – Principais bactérias que afetam o S.N.P. *(403, 409)*
Capítulo 18.2 – Principais bactérias que afetam o S.N.C. *(410, 422)*
Capítulo 18.3 – Principais fungos que afetam o S.N.P. *(422, 423)*
Capítulo 18.4 – Principais fungos que afetam o S.N.C. *(423, 429)*
Capítulo 18.5 – Fármacos para tratamento bacteriano. *(429, 432)*
Capítulo 18.6 – Fármacos para tratamento fúngico. *(432, 434)*
Capítulo 19. Tomografia Computadorizada e Raio-X. ***(435, 459)***
Capítulo 19.1 – Principais achados da T.C de crânio. *(435, 453)*
Capítulo 19.2 – Principais achados no raio-x de crânio. *(453, 459)*
Capítulo 20. Finalização. ***(460)***

Todos os direitos reservados à: **Fabrício Zorzin Borges** ----------

---

Capítulo 1 | Neuroanatomia e Neurofisiologia.

Capítulo 1.1 | Medula.

A medula é um dos componentes do nosso sistema nervoso, sua função é como um local de passagem de sinais/retransmissão e iniciar reflexos, ela atua como a principal via do corpo para passar os sinais/mensagens enviadas pelo córtex até os músculos e órgãos, porem ela tambem possui uma importante ação inconsciente, graças a ela que temos nossos reflexos automáticos, um exemplo para entendermos esses reflexos seria quando tocamos em uma região extremamente quente e automaticamente tiramos o braço antes de processar aquela temperatura, depois de um tempo começamos a sentir a dor e o calor.




Representação medular.

Antes de continuarmos precisamos entender alguns conceitos importantes, a medula durante seu desenvolvimento embrionário possui um crescimento mais lento em comparação as vertebras, por conta disso no adulto a medula

termina por volta das **vertebras L1-L2**, onde se forma o **cone medular**.
A importância de sabermos disso é para entendermos que ao realizar uma punção liquórica em um paciente para investigarmos uma possível meningite por exemplo temos que evitar a medula e puncionar apenas o liquor que reveste a cavidade medular impedindo o atrito e servindo para passagem de proteínas e células do nosso corpo. Caso o paciente seja uma criança que ainda está em desenvolvimento devemos puncionar perto de **L5-S1** ou as vezes até na região sacral entre os forames sacrais em crianças de 1 ano ou menos, já nos adultos focamos entre **L3-L4** pois existem variações anatômicas em que a medula se estende até L2-L3 e caso ela seja puncionada a dor será extrema e teremos morte de neurônios, o que vale a ressalva que neurônios são as únicas células do nosso corpo que não se regeneram após serem lesadas (no sistema nervoso central, no periférico é possível ter regeneração, porem ela é extremamente lenta).

Uma das principais funções da medula além de atuar nos reflexos é a função hematopoiética, nela temos a ´´fabricação´´ das nossas células, tanto do sistema imune quanto do circulatório, nossas hemácias são produzidas na medula, neutrófilos, basófilos, linfócitos, etc. Então podemos concluir que qualquer neoplasia que chegue até a medula é extremamente perigosa pois afeta o centro da nossa ´´fabrica´´ de produção, cessando a atividade medular, lembrando que o liquor que reveste a medula é um local repleto de proteínas e substancias necessárias para a multiplicação e replicação celular justamente por conta dessa produção, porem esse ambiente tambem é ideal para a proliferação bacteriana, por isso pacientes com quadros de meningite é tão perigoso, já que no momento em que a bactéria chega ao liquor e começa a se multiplicar ela invade a medula e começa a comprometer todo o nosso sistema nervoso podendo levar a óbito se não tratado ou a sequelas irreversíveis por toda a vida.

Falando agora da estrutura interna da medula falaremos sobre os principais núcleos internos da substancia cinzenta medular, a função de cada um e depois sobre os núcleos da substância branca.



Como podemos ver na imagem os principais núcleos presentes na substancia cinzenta medular são os núcleos:

N. Marginal que atua junto da **Substancia Gelatinosa**, responsáveis por modular a intensidade da dor percebida e captar a sensação de mudança de temperatura para iniciar reflexos (caso necessário)

N. Próprio que é a primeira via de entrada para tato grosseiro, pressão e dor antes de chegar até o trato espinotalâmico que vai levar essa informação até o tálamo.


N. Torácico Posterior é responsável pela propriocepção inconsciente de membros superiores e inferiores para reflexos.

Substancia Cinzenta Visceral é responsável por processar as sensações/estímulos de órgãos profundos viscerais.

N. Intermediolateral é responsável por enviar sinais para vísceras, glândulas e vasos, sistema nervoso simpático e parassimpático.


N. Motores Medias são responsáveis pelas mensagens de controle da musculatura do tronco/postura (axial) enquanto os **Motores Laterais** pelos membros superiores e inferiores, vale ressaltar que os Motores Laterais não estão por toda medula, apenas nos níveis dos membros superiores e inferiores (C5-T1 e L1-S3).

4



Anatomia Medular.

Agora que falamos sobre os principais núcleos da substância cinzenta da medula e conseguimos visualizar a anatomia medular falaremos sobre os principais tratos e fascículos presentes na substancia branca, quando falamos sobre tratos temos que entender que uma das principais funções da medula é ser uma via de passagem de sinais, esses tratos servem justamente para isso, ser uma via onde conseguimos conectar neurônios do córtex com a medula para chegar até um musculo ou órgão específico, e o mesmo acontece na via ascendente, onde eu tenho sinais chegando à medula e indo até o córtex para serem interpretados, nessa lógica podemos dividir a medula em dois grandes grupos que utilizam as vias: anterolaterais da medula para passagem de sinais de baixa urgência e pouca especificidade e outros que utilizam a via dorsal lemnisco medial da medula para sinais de alta precisão e urgência, mas essas duas lógicas sobre as vias são apenas para os tratos que ascendem a medula até o córtex, já aqueles que descendem para chegar até um músculo para realizar uma ação específica tendem a passar apenas pela via anterolateral já que a maior parte da via dorsal está ocupada por grandes fascículos como o fascículo grácil e cuneiforme para passagem de sinais rápidos de urgência que chegam dos músculos, passam pela medula e são interpretados pela córtex.



Substancia Branca.

Os principais tratos são divididos nos piramidais (que conectam a córtex diretamente ao músculo) e os extrapiramidais, enquanto os fascículos são responsáveis por enviar as sensações captadas pelos respectivos membros até a córtex, lembrando que os tratos utilizam os núcleos da substancia cinzenta como ´´checkpoints´´ de passagem.

Na via piramidal nossos principais tratos são:

Corticoespinhal que é o principal trato motor do nosso corpo, ele se divide em **corticobulbar** para o controle da musculatura da cabeça e pescoço e **corticoespinhal** para controle da musculatura abaixo dos ombros até os membros inferiores.

Na via extrapiramidal os principais tratos são:

Tetoespinal que é o principal responsável pelo movimento dos olhos com a cabeça mediante a um estimulo sonoro, por conta dele que quando escutamos um barulho mexemos os olhos e depois viramos a cabeça em direção ao estimulo.

Reticuloespinal que é o principal responsável pelo controle antecipatório de movimentos planejados, ele se divide em pontino e bulbar dependendo da ação, caso seja necessário a ação de extensão temos a ação do reticuloespinal pontino, caso seja flexão atua o bulbar.

Rubroespinal ele é importante para regular a atividade dos neurônios motores, quando estudamos fisiologia da junção neuromuscular vemos que o neurônio motor possui um neurônio inibitório que regula a atividade dele, mas o mais interessante do trato rubroespinal é que ele é mais ativo em R.N onde além de regular os neurônios motores ele tambem é o principal trato responsável pela flexão no R.N e no adulto em quadros de lesões da via corticoespinal podemos

ter uma substituição onde juntamos o trato rubral com o cortical formando o corticorubroespinal, porem a ação dele é pouco específica, por isso que pacientes com lesões centrais do trato corticoespinal depois de muito tempo conseguem fazer apenas movimentações bruscas.


Vestibuloespinal é o principal trato que nos ajuda no equilíbrio, ao cairmos ele é responsável pelo controle involuntário dos membros inferiores e movimentação da cabeça e pescoço para evitarmos cair de cara no chão, além de que ele tambem move a cabeça e os olhos mediante a estímulos visuais, por isso que quando estamos fazendo algo e na periferia da visão vemos alguém entrando na sala inconscientemente olhamos para a pessoa.

Nossos principais fascículos que atuam levando a mensagem dos músculos e tendões até a córtex são:

Fascículo Grácil para os membros inferiores.


Fascículo Cuneiforme para os membros superiores.


Agora para finalizarmos sobre a medula precisamos falar sobre a vascularização, a principal artéria que irriga a região medular são as terias torácicas internas posteriores, ramos da aorta, enquanto o sistema de drenagem pode ocorrer por duas vias dependendo da alteração da pressão do sistema venoso, ela pode ocorrer pelos seios durais, que estão presentes na Dura-máter que reveste a medula ou pelo sistema ázigo, a escolha de qual sistema irá realizar depende da pressão venosa no momento da passagem de sangue.




Para finalizarmos iremos falar sobre os plexos e os dermátomos, os plexos são conjuntos de nervos que saem das raízes nervosas da medula (C1 -> C8, T1 -> T12, L1 -> L5, S1 -> S5), os principais plexos do nosso corpo é o plexo braquial que atua na movimentação dos membros superiores e o plexo lombossacral que atua na movimentação dos membros inferiores. Vale uma ressalva que do plexo braquial se formos falar qual raiz nervosa é a mais perigosa se lesada seria a C5, o plexo braquial é formado por C5 até C8 e T1, o problema é que de C5 temos a saída do nervo frênico que inerva o diafragma


que atua no controle da respiração, lesão bilateral desse nervo leva a paralisia do diafragma, consequentemente levando a parada respiratória.





(Plexo Braquial e Dermátomos Membros Superiores | Netter).





A. Cutaneous nerves of the right lower extremity. Front and posterior views. B. Diagram of the segmental distribution of the cutaneous nerves of the sole of the foot

(Plexo Lombossacral e Dermátomos Membros Inferiores | Netter).


Os dermatomos são divisões corpóreas para identificar qual raiz nervosa

inerva cada região sensorial do corpo, util para identificar lesões medulares.


Capítulo 1.2 | Tronco Encefálico.

O tronco encefálico é composto, em ordem descendente pelas três principais estruturas: mesencéfalo, ponte bulbo, eles atuam nas funções não conscientes do corpo, diferente da medula que atua através de reflexos automáticos aqui iremos manter funções corpóreas automáticas que não precisam de um estimulo inicial, por exemplo os batimentos cardíacos, ciclo respiratório, etc.

Para explicar sobre cada parte do tronco encefálico iremos começar da região mais caudal e iremos rumo a mais cefálica, logo iremos começar discutindo sobre o bulbo.




(Representação do tronco encefálico completo – Netter)



(Divisões do tronco encefálico)

O Bulbo possui algumas características que o tornam único, a primeira característica é que ele tambem pode ser chamado de medula oblonga pois sua extremidade inferior faz continuação com a medula e possui alguns núcleos de corpos de neurônios próprios, pares de nervos cranianos específicos que saem do mesmo e estruturas próprias que afetam todo o sistema nervoso, uma das principais estruturas é a Decussação das Pirâmides um local onde as fibras nervosas motoras cruzam de uma extremidade para a outra, por conta dessa estrutura que a maioria dos sintomas neurológicos


motores normalmente são contralaterais a lesão.



(Bulbo – Netter)

Da mesma maneira que temos a decussação das pirâmides para o cruzamento de mensagens motoras descendentes do córtex temos a comissura dos lemniscos onde os axônios dos fascículos grácil e cuneiforme se cruzam, vamos rever rapidamente o que são esses fascículos. No musculo eu possuo as fibras musculares e dentro de cada fibra eu possuo fusos musculares e órgãos tendinosos de golgi, o fuso muscular possui um pequeno axônio de uma fibra nervosa, da mesma maneira o órgão tendinoso de golgi, esse pequeno axônio leva a mensagem sobre as micro alterações musculares e tendinosas para a medula que envia essas alterações para a córtex para que possamos sentir o nosso próprio corpo, famosa propriocepção, por conta dela que o indivíduo é capaz de detalhar a posição dos membros inferiores sem ter que olhar para os mesmos. Os fascículos são os pontos de encontros dessas fibras, caso sejam dos membros inferiores eles se reúnem no fascículo grácil, caso seja dos membros superiores eles se reúnem no fascículo cuneiforme e ambos caminham em direção a comissura dos lemniscos no bulbo onde cruzam para o lado oposto, por isso podemos afirmar que a córtex cerebral direita interpreta os estímulos do lado esquerdo do corpo, por conta desse cruzamento.

Agora falando especificamente sobre a substancia cinzenta do bulbo precisamos saber que temos dois tipos, a homologa que faz referência a medula que já vimos e a própria que é própria da estrutura que estamos estudando.



(Fibras nervosas – Netter)

Para falarmos sobre as substâncias cinzentas homólogas e próprias precisamos antes falar sobre os pares de nervos cranianos que emergem do bulbo e devemos ter uma noção que caso seja um núcleo homólogo quer dizer que pode ter tanto par de nervo craniano que emerge do bulbo quanto de outras estruturas, por isso o nome homólogo. Os pares de nervos cranianos que emergem são: Glossofaringeo (IX), Vago (X), Acessório (XI) onde ambos possuem como origem encefálica o sulco pós olivar (ou sulco lateral posterior) e origem cranial no forame jugular. Hipoglosso (XII) onde possui como origem encefálica o sulco pré olivar (ou sulco lateral anteior) e origem cranial no canal do nervo hipoglosso.

A substância cinzenta homologa do bulbo é composta por núcleos homólogos a medula, então aqui teremos sete principais núcleos.

1) Núcleo Salivatório inferior (NC IX) É motor para a produção da saliva, e inervação da glândula Parótida.

2) Núcleo do Trato Espinhal do N. Trigêmeo (NC's V, VII, IX, X) É sensorial relacionado a dor e temperatura para a cabeça, vale ressaltar que o N. Trigêmeo possui terminação nas três estruturas do tronco encefálico, as quais serão discutidas ao falarmos sobre a ponte.

3) Núcleo Dorsal do Vago (NC X) É motor pertencente a via parassimpática e á digestão, sendo o principal responsável pelo reflexo do vômito.

4) Núcleo Ambíguo (NC's IX, X, XI) É motor para a musculatura estriada da laringe e faringe.

5) Núcleo do Trato Solitário (NC's VII, IX, X) É sensorial relacionado a gustação, parte posterior da língua.

6) Núcleos Vestibulares/ Medial e Inferior (NC VIII) É sensorial relacionado ao equilíbrio e à posição do corpo.

7) Núcleo do Hipoglosso (NC XII) É motor para a musculatura intrínseca e extrínseca da língua, menos o músculo Palatoglosso.

A substância cinzenta própria do bulbo é composta pelos núcleos:


1) Núcleo Olivar Inferior e Acessórios, formando o complexo olivar inferior que é extremamente importante já que é a nossa via de aprendizagem, utilizando a

via olivocerebelar para comunicar com o cerebelo para que possamos realizar nossas atividades diárias com maior práxis,

2) Núcleo Grácil e Cuneiforme que formam a comissura do lemnisco medial para os fascículos grácil e cuneiforme.

Além das substancias cinzentas temos tambem uma estrutura extremamente importante que nos ajuda a entender ainda mais alguns dos tratos presentes na medula sendo ela a **formação reticular**, uma estrutura presente em todo o tronco encefálico que atua no controle de ações autônomas, no bulbo a formação reticular está responsável pelo centro vasomotor, reflexo do vômito e centro respiratório.

A Ponte, após falarmos sobre o bulbo falaremos sobre a ponte, uma estrutura intermedia de grande importância.



No centro dela temos o sulco basilar, uma importante estrutura anatômica pois é onde passa a artéria basilar que falaremos mais a frente quando formos falar sobre polígono de willis no telencéfalo, formada por uma parte basal sendo a base da ponte e uma parte de tegmento, sendo chamado de tegmento da ponte, sua localização já é interna ao crânio, ficando na parte do clivo e no dorso da sela turca do osso esfenoide, no limite entre o tegmento e a base da ponte temos um conjunto de fibras que formam o corpo trapezoide que está relacionado a audição, falaremos novamente sobre a audição ao falarmos sobre os giros temporais no cérebro, o importante é entender que essas fibras estão relacionadas a ações que precisam de estímulos sonoros, por isso falamos que está relacionada a audição, porem a interpretação do significado de estímulos sonoros captados é realizada em regiões cerebrais específicas.

Na **Base da Ponte**, por ser a maior região podemos encontrar **fibras longitudinais** que possuem como os principais tratos o trato Corticoespinhal que já mencionei antes e o Corticopontino que conecta a córtex aos **núcleos pontinos** da ponte como uma via terciaria para passagem de sinais, normalmente chega o sinal nessa região e vai até o cerebelo, formando a via **Pontocerebelar** e **Cerebropontina**, irei cita-la novamente ao detalhar o cerebelo porem a importância dessa via é a capacidade de cronometria e cálculo da força necessária para realizar um movimento específico, enquanto as **fibras transversais** são a continuação dos axônios dos núcleos pontinos, então se formos analisar as vias aquelas que conectam a córtex aos núcleos

pontinos são as fibras longitudinais enquanto aquelas que conectam os núcleos pontinos a outra estrutura são as fibras transversais, como o trato Pontocerebelar por exemplo.

No **Tegmento da Ponte** precisamos saber dos núcleos que o formam, sendo eles:

1) Núcleo Olivar Superior sendo sensitivo para o controle do movimento muscular, informando o cerebelo sobre os movimentos realizados.


2) Núcleo do N. Vestíbulo-coclear sendo sensitivo para a audição e equilíbrio, atuando em conjunto ao cerebelo para controle do equilíbrio.

3) Núcleo do N. Facial sendo motor para os m. da mímica facial.

4) Núcleo do N. Abducente sendo motor para o m. Reto lateral do olho

5) Núcleo do N. Trigêmeo sendo motor para os m. da mastigação.

O nervo trigêmeo é um nervo misto, falaremos primeiro dele e depois iremos detalhar os outros nervos presentes na ponte, dependendo da região em que o trigêmeo chega a sua ação vai mudar, caso ele chegue no Mesencéfalo ele será sensitivo e vai atuar na propriocepção da face, não cruzando em nenhum momento, e vai para o mesmo hemisfério, caso chegue na Ponte ele será misto, sua parte sensitiva será responsável pela dor, temperatura, discriminação de tato fino e pressão da cabeça, ele cruza até chegar então a sensação é contralateral, já seu núcleo motor atua na inervação dos músculos da mastigação, caso chegue no Bulbo será sensitivo para dor, temperatura e tato grosseiro da face, ele tambem cruza por isso é reconhecido pelo lado oposto do hemisfério.




(Representação N. Trigemeo)

Como podemos ver na imagem além do trigêmeo poder ser interpretado em

três regiões diferentes do tronco encefálico ele tambem possui três diferentes ramos, sendo eles o ramo oftálmico que inerva a órbita, tendo origem encefálica entre a ponte e o pedúnculo cerebelar médio e origem cranial através da fissura orbital superior e sua função é apenas sensitiva, ramo maxilar que possui a mesma origem encefálica com origem cranial no forame redondo tendo função apenas sensitiva e o ramo mandibular com principal função motora tendo a mesma origem encefálica porem com origem cranial pelo forame oval. Vale uma ressalva que o trigêmeo possui dois ramos na ponta, onde o maior é sensitivo e o menor motor.


Agora sobre os outros pares de nervos cranianos presentes na ponte temos:
NCs (V) Trigêmeo (que já foi detalhado)
NCs (VI) Abducente, NCs (VII) Facial, NCs (VIII) Vestibulo-Coclear, ambos os três possuem origem encefálica no sulco bulbopontino.




Porem a origem cranial desses nervos é diferente, o nervo abducente utiliza a fissura orbital superior, o nervo facial utiliza o forame estilomastóideo e o nervo vestíbulo-coclear utiliza o meato acústico interno.

Antes de passarmos para o mesencéfalo vale mencionar duas estruturas importantes na ponte, primeiro temos os **núcleos da rafe** que atuam na produção de serotonina, um neurotransmissor extremamente importante com várias funções diferentes porem focaremos nesse livro apenas nas funções neurológicas, a serotonina nessa via central terá dois principais destinos, em

um paciente hígido ela será desviada para a via da melatonina, nosso hormônio do sono, porem caso o paciente esteja acometido por alguma patologia que afete o sistema nervoso central a serotonina é desviada para a via de formação da Niacina (B3) já que temos como subcomposto da metabolização de Niacina NADH+, que é extremamente necessário para a famosa ´´explosão respiratória´´ que os macrófagos realizam para a eliminação de patógenos. A outra estrutura importante de ser mencionada é o **Lócus Ceruleus**, uma região responsável pela produção de Noradrenalina para o sistema nervoso que é extremamente importante para o funcionamento do corpo como um todo.



O Mesencéfalo é a última estrutura que compõe o tronco encefálico, possui uma das principais estruturas de todo o tronco encefálico sendo o aqueduto cerebral que une o terceiro ao quarto ventrículo, locais de passagem para o liquor produzido que já discutimos suas funções no capítulo sobre a medula, sua divisão anatômica é em três partes, teto, tegmento e base, ao separamos o tegmento da base no mesencéfalo iremos encontrar a substancia negra, responsável pela produção de dopamina e que já iremos falar mais sobre ela.




No teto do mesencéfalo precisamos entender que é uma região extremamente importante pois integra varias funções sensoriais e sensitivas com o nosso sistema nervoso e córtex, sendo as quatro eminencias responsáveis por isso

os Colículos Superiores, responsáveis pela integração da visão e os Colículos Inferiores responsáveis pela integração da audição, vale uma ressalva a área pré-tetal chamada tambem de núcleo pré-tetal localizado acima dos Colículos Superiores responsável pela contração das pupilas.

No tegmento do mesencéfalo por ser continuação do tegmento da ponte encontramos substancia cinzenta homóloga, sendo ela o núcleo do nervo troclear e núcleo do nervo oculomotor, todos responsáveis e atuando na movimentação ocular, enquanto na substancia cinzenta própria temos o núcleo rubro que atua na coordenação/modulação dos neurônios motores (rever via rubroespinal no capítulo sobre medula caso tenha dúvida). Temos saindo do mesencéfalo dois nervos cranianos, o NCs Troclear (IV), com origem encefálica no Véu Medular Superior e o NCs Oculomotor (III), com origem encefálica no Sulco Medial do Pedúnculo Cerebral, ambos possuem origem craniana na fissura orbital superior já que vão inervar a musculatura ocular para movimentação ocular.


Para finalizarmos falaremos por fim da dopamina, um neurotransmissor extremamente importante produzido na substancia nigra que já aprendemos a localizar no mesencéfalo, sua função varia, podendo ser inibitória ou excitatória em cima dos neurônios do córtex cerebral, por isso que ela atua em duas vias diferentes, a via direta e a via indireta, primeiro temos a via direta que é excitatória, enquanto a via indireta é inibitória, o detalhe de cada via irei falar com mais detalhe quando for detalhar sobre o Diencéfalo e os núcleos da base. Para cada via temos um receptor específico para dopamina, onde na via direta predomina o receptor para D1 enquanto na via indireta predomina para D2, existem algumas patologias que afetam essa via as quais falaremos nos capítulos adiantes, em suma é preciso entender que a dopamina por ser produzida na substancia negra caso a patologia seja por uma alteração genética em que eu não tenho os receptores das vias diretas e indiretas não adianta querer tratar com levodopa (medicamento que simula a dopamina) pois aqui o problema não é a produção mas sim a falta de receptores, porem patologias que degenerem a substancia negra, diminuindo a quantidade de dopamina produzida como consequência tem uma boa resposta quando tratamos com levodopa, já que aqui o problema não é a falta de receptores mas sim a falta de dopamina em si, um clássico exemplo que não é tratável com levodopa seria a doença genética de Huntington e uma doença clássica que é tratada com levodopa é o Parkinson, ambas falaremos nos capítulos adiante.



Capítulo 1.3 | Cerebelo.

O cerebelo é uma das estruturas mais interessantes de todo o sistema nervoso, ele atua na maioria das nossas tarefas do dia a dia sem percebermos e qualquer alteração nele se torna visível.

Para falarmos dele primeiro precisamos voltar para a embriogênese, com a evolução das espécies um fator de diferenciação e que aumentava a capacidade de sobrevivência era o quão desenvolvido seria o sistema nervoso daquela espécie, por isso que o cerebelo é dividido em três partes: Arquicerebelo, relacionado ao equilíbrio primordial, Paleocerebelo, relacionado a postura e grau de contração muscular e Neocerebelo atuando na coordenação motora fina.




Corte transversal no nível do pedúnculo cerebelar superior

Podemos dividir o cerebelo tambem quanto a parte funcional sendo eles o Vestibulocerebelo, que o próprio nome já explica, liga o aparelho vestibular ao cerebelo para o controle do tônus muscular e equilíbrio, já que o aparelho vestibular atua na captação de movimento corpóreo. Espinocerebelo, que faz a ligação da medula com o cerebelo para o controle da musculatura fina e informar o cerebelo sobre o movimento realizado para que ele faça as devidas correções necessárias. Cerebrocerebelo que conecta a córtex ao cerebelo para a passagem de sinais específicos, se formos linkar todas as três diferentes partes em uma linha de raciocínio seria a seguinte: Você está caminhando e ao tropeçar você estende a perna pois perdeu o equilíbrio


(Vestibulocerebelo) porem após estender a perna você precisa corrigir o movimento pois pisou em falso e virou o pé (Espinocerebelo), agora o cerebelo vai calcular o novo movimento que a córtex precisa realizar para você não cair no chão (Cerebrocerebelo) e depois de tudo isso a mensagem corrigida chegou a córtex e vai descer até o grupo muscular específico via trato corticoespinhal.

Além dos tratos já estudados na medula temos algumas vias novas que precisam ser citadas, primeiro temos o trato espinocerebelar que informa o cerebelo sobre o movimento realizado, complexo olivar inferior que fica em intima comunicação da ponte com os núcleos cerebelares para o aprimoramento dos movimentos, essa via é muito ativa em pianistas por exemplo, muita das vezes ao tocar músicas complexas o cerebelo já aprendeu o movimento necessário das mãos e o pianista toca no ´´automático´´ sem perceber, dependendo do nivel podem até tocar músicas de olhos fechados. Como falamos sobre o planejamento de movimentos precisamos saber que o principal trato que desce com a mensagem antecipada do movimento pré calculado no cerebelo é o trato reticuloespinal que já fora detalhado no capítulo sobre medula e por fim temos o núcleo do fastígio, fazendo a via de integração mais importante do cerebelo, já que ele conecta o aparelho vestibular ao sistema reticular e a medula, assim podemos fazer correções de postura mediante a alterações da posição corpórea, um paciente que tenha lesão no núcleo fastígio por exemplo ao pedir para que ele se sente na cadeira mesmo que braços e pernas estejam normais o tronco dele ficara ´´balançando´´ pois o núcleo fastígio tambem está localizado no Arquicerebelo que atua na postura, porem os membros inferiores e superiores estão localizados no Paleo e Neo cerebelo, por isso não são afetados.

Outra característica do cerebelo é que ele é fortemente afetado pelo álcool, por isso que quando o paciente bebe ele perde o equilíbrio, já que o cerebelo é responsável pelo equilíbrio, feedback de movimentos e previsão do movimento ao caminhar o paciente desaba já que a integração com o sistema vestibular está inibida, não consegue corrigir movimentos e precisa de apoio para andar.



(Vista anterior do cerebelo - Unesp)




(Vista anterior do cerebelo colorida – Unesp)


Outras vias importantes do cerebelo é a via Pontocerebelar, que utiliza do trato corticopontocerebelar, é graças a essa via interna do nosso sistema nervoso que o cerebelo consegue suavizar os nossos movimentos para que testes simples como esticar o braço e tocar na ponta de um lápis seja feito de maneira fluida sem, por exemplo, ultrapassar a ponta do lápis.

As lesões diretas no cerebelo podem causar diferentes patologias, sendo elas: Dismetria e ataxia, famoso andar do bêbado, Disdiadococinesia, dificuldade em realizar movimentos rápidos e alternados, Tremor Intencional, ao realizar um movimento como tocar a ponta do dedo em um lápis o paciente começa a tremer porem ao segurar o lápis o tremor para, Nistagmo, movimento incontrolado de tremor ocular, temos outras possíveis patologias porem essas


são as mais clássicas.



(Vista posterior do cerebelo - Unesp)





(Vista superior do cerebelo – Unesp)




(Vista lateral do cerebelo – Unesp)

Antes de passarmos para o próximo capítulo e falarmos sobre Diencéfalo vale aqui uma revisão da anatomia real do que já vimos:








(Tronco encefálico com e sem cerebelo – Unesp)

Capítulo 1.4 | Diencéfalo.


Agora falaremos sobre o diencéfalo, uma região estrutural localizada logo acima do mesencéfalo composta pelo Tálamo, Hipotálamo, Epitálamo, Subtálamo e aproveitaremos para já explicar sobre os núcleos da base que ficam entre toda essa região que já explique do tronco encefálico até o diencéfalo.



Nessa região temos uma importante estrutura que permite a passagem do


liquor que é a abertura do terceiro ventrículo fazendo a comunicação com o quarto ventrículo, essa abertura é representada na imagem pelo forame interventricular.

Agora detalharemos sobre cada uma das estruturas do diencéfalo, primeiramente falando sobre o Tálamo precisamos saber que ele atua como uma estação de retransmissão, a maioria dos sinais da córtex chegam em conjunto até aqui e depois cada um segue a sua via dependendo da informação que estão levando, o Talamo tambem possui uma região chamada pulvinar do tálamo que comporta duas estruturas importantes chamadas de Corpos Geniculados, sendo o medial responsável pela integração dos estímulos relacionados a audição enquanto o lateral pela visão, uma sugestão para se lembrar é que medial começa com M de musica enquanto lateral começa com L de luz, essas duas estruturas juntas podem ser chamadas tambem de metatálamo. Dos diversos núcleos encontrados no tálamo levamos em consideração apenas 5, sendo eles os núcleos posteriores que estão relacionados ao pulvinar do tálamo, núcleos laterais que são divididos em pósteros laterais e medias para sensibilidade e lateral, intermédio e anterior para passagem de informações relacionadas a motricidade, núcleos anteriores para memoria e emoção e núcleos mediais/medianos para motivação, comportamento e emoção.




Já o Hipotálamo possui uma glândula extremamente importante chamada de

hipófise que está relacionada a diversas funções sendo uma das principais funções dela a produção de hormônios como os hormônios endócrinos e tireoidianos, ela atua regulando a via de sono e vigília, diurese, comportamento sexual, entre outros, a hipófise é extremamente importante, além dessa glândula podemos falar que a principal função do Hipotálamo está relacionada a memória, já que ele integra todas as informações que aprendemos ao longo do dia e vai ´´anotando´´ no hipocampo como se fosse um bloco de notas para que durante o sono o hipocampo redirecione essas informações para as regiões cerebrais relacionadas, por exemplo, se for uma memoria motora mandamos para a região motora, se for sensorial para a região sensorial, etc. O Epitálamo suas principais características é a presença da glândula pineal que atua na produção de melatonina para o ciclo do sono vigília, irei explicar melhor sobre sono e vigília assim que detalhamos cada estrutura que compõe o diencéfalo, temos no Epitálamo tambem a comissura das habênulas que ligam os núcleos habenulares aos trígonos habenulares responsáveis pela produção de dopamina para a via mesolimbica relacionada a sensação de frustação. Por fim temos o Subtalamo que está no limite da divisão entre o mesencéfalo e o diencéfalo e a principal característica dele que devemos nos lembrar é que ele atua na regulação dos neurônios motores das vias extrapiramidais, lesões nele vamos ter como sintomas o Hemibalismo.




Falaremos agora sobre os núcleos da base, eles estão relacionados com a via direta e indireta da dopamina, antes de falar dessa via, via do sono e vigília e a via do aprendizado primeiro falaremos dos sintomas clássicos pela lesão de cada núcleo, lesões no núcleo **Putamen** o paciente vai apresentar Coreia, lesões no **Globo Pálido** o paciente vai apresentar Atetose, lesões no **Subtalamo**

o paciente vai apresentar Hemibalismo, alterações na **Substancia Nigra** o mais comum é Parkinson e lesões no núcleo **Caudado** o paciente apresenta Apatia.
Via direta e indireta da dopamina: para entendermos essa via vamos começar desde a sua produção e a função dos núcleos da base sobre o tálamo, como vimos a dopamina é produzida na substancia nigra, após a sua produção ele pode ativar duas vias, no dia a dia temos essas duas vias oscilando, sendo uma delas a via direta relacionada com excitação enquanto a via indireta está relacionada com inibição, precisamos desse equilíbrio entre as duas vias para que possamos controlar movimentos detalhados, por exemplo, escrever no teclado do computador, aqui estamos fazendo excitação de músculos dos membros superiores e ao mesmo tempo que estamos inibindo, para que possamos clicar na tecla e retirar o dedo, então ambas as vias são de extrema importância para o dia a dia, o problema é quando, devido a alguma patologia como a de Parkinson, uma via sobressai sobre a outra. Como o tálamo é um local de retransmissão de sinas normalmente a córtex detalha o movimento, envia ele para o tálamo onde ele deve reenviar essa mensagem para córtex com a quantidade X de dopamina para que esse movimento seja ´´liberado´´ e possa descer e passar pelos tratos específicos e é aqui que a mágica acontece, na via direta a dopamina se liga aos receptores de D1 que alteram os sinais enviados pelos núcleos da base para o tálamo, normalmente o Globo Palido envia sinais inibitórios (a base de gaba) para o tálamo, o que impede que ele libere dopamina o suficiente para que a mensagem seja liberada na córtex pré frontal, quando a dopamina se liga na via D1(onde os receptores estão nos núcleos da base) ela faz com que o Globo Palido pare de enviar sinais inibitórios e passe a enviar sinais excitatórios (a base de glutamato) para o Tálamo, estimulando que o mesmo envie mais sinais excitatórios para a córtex liberar a mensagem motora. Na via indireta temos a dopamina se ligando a via D2, onde ela estimula o núcleo Subtalamico a estimular com que o Globo Palido envie sinais inibitórios para o tálamo, por isso falamos que na via direta ela é excitatória enquanto na via indireta ela é inibitória. Doença de Parkinson por exemplo eu tenho diminuição da via direta e aumento/predomínio da via indireta, já que a substancia nigra além de produzir dopamina tambem atua APENAS na via direta, como um cofator que ajuda a inibir o Globo Pálido.





Falando mais um pouco sobre os núcleos da base antes de falar sobre ciclo de sono-vigília é importante entendermos algumas coisas, na neurologia clinica podemos juntar o Putamen com o Globo Pálido em um núcleo chamado de Lentiforme, enquanto tambem podemos juntar o Putamen com o núcleo Caudado em um corpo chamado de corpo estriado, juntamos para falar sobre como dois núcleos da base podem atuar em conjunto em uma via específica, por exemplo, o núcleo Lentiforme está relacionado principalmente com a inibição de movimentos indesejados, enquanto o corpo estriado está relacionado com a via emocional, como prazer, alegria, frustação, etc. Tanto é que pacientes que tenham lesão desse corpo ou apenas da cabeça do núcleo Caudado apresentam apatia severa e não possuem vontade de fazer nada, pois a via de prazer deles foi ´´desligada´´, lembrando que esses núcleos e corpos são apenas fisiológicos, agrupamentos quanto a esses núcleos de base e suas funções semelhantes, porem uma estrutura física que está ao lado do núcleo caudado e que tem extrema importância é a capsula interna, o motivo é que dentro dela passa o trato corticoespinhal, temos tratos corticoespinhal espalhados por toda a córtex, já que cada região da córtex está responsável por uma região corpórea, aprenderemos mais sobre isso e o homúnculos motor no capitulo sobre Telencéfalo, mas o que precisamos entender é que todos esses diferentes tratos corticoespinhais se juntam na capsula interna, ela é um ponto de encontro e depois falaremos no capítulo sobre irrigação arterial qual artéria irriga essa região, e entendendo que aqui é um ponto de

encontro de todos os tratos corticoespinhais de todas as diferentes regiões conseguimos entender porque a isquemia local causa paralisia de todo o corpo.




Falaremos agora sobre a via de aprendizado, no dia a dia ao aprendermos sobre algo precisamos entender que a memória em si funciona de uma maneira peculiar, ela nada mais é do que uma facilitação entre sinapses neuronais, ao aprendermos algo novo no dia o hipotálamo reserva aquela informação e envia para o hipocampo, ao final do dia durante o sono (NREM e REM, irei explicar os diferentes sonos logo a frente) essas informações salvas são enviadas para cada região da córtex especializada, no próximo capitulo falaremos sobre os principais neurotransmissores do sistema nervoso, o que são neurônios inibitórios, o que são neurônios facilitatórios, sistema nervoso motor, sensorial, visceral, etc. Por enquanto basta entender essa comunicação entre os neurônios.






Falaremos agora sobre o ciclo de sono-vigília, durante o dia, famoso ciclo circadiano nossos núcleos da Rafe (presentes na ponte) produzem serotonina, essa serotonina tem dois destinos nessa via central do encéfalo, na primeira via ela chega até a glândula pineal onde é transformada em Melatonina, na via secundaria ela é redirecionada para se transformar em Niacina (B3) em quadros de infeção, pois tem como subproduto NADH+ que auxilia no burst

oxidativo dos macrófagos para que eles consigam fagocitar a bactéria, por isso pacientes com doenças infecciosas tem dificuldade para dormir, já que a Melatonina é precursora para a adenosina iniciar o ciclo de sono, porem o mais curioso é que o destino da Serotonina nessa via central é apenas de 10%, os outros 90% ocorrem no sistema digestório, onde a Serotonina absorvida é utilizada pelo fígado para se regenerar de lesões, utilizada pelas células da camada intima das artérias e veias para controle vasomotor, utilizada para fortalecimento ósseo, tanto é que falta de Serotonina na dieta na infância já foi comprovada estar relacionada a baixo desenvolvimento ósseo e possível osteoporose, pode ser utilizada pelos músculos para a contração muscular mas as principais ações dela são hepáticas, vasomotora e ósseas (nessa via periférica, na central é produção de B3 ou Melatonina).



Assim que a Melatonina chega até a córtex ela vai estimular a Adenosina para que faça a pressão homeostática do sono, a adenosina se liga em receptores que estimulam o influxo de cargas negativas para dentro dos neurônios causando o sono, uma curiosidade é que o café se liga como antagonista ao receptor de adenosina, impedindo que ela cause o ´´sono´´, a maneira mais eficiente para tomar cafeína e se manter acordado por mais tempo seria após beber o café tirar um cochilo de trinta minutos (pois durante o cochilo o seu cérebro limpa os receptores de adenosina) e assim a cafeína consegue se ligar a ainda mais receptores para impedir que mais adenosinas se liguem, pois a cafeína não consegue remover uma molécula de adenosina que já tenha se ligado e já esteja realizando um influxo de carga negativa, mas se você tirar um cochilo seu cérebro faz esse trabalho para você e assim a cafeína consegue se ligar ao receptor previamente ocupado.


Durante toda a fisiologia do sono podemos dividi-la em duas principais etapas, o sono não REM(random eye moviment/movimentos aleatórios dos olhos) e sono REM. A principal diferença de ambos os sonos é que o sono NREM(não REM) ao analisar as ondas elétricas de comunicação interneural percebemos ondas rítmicas, lentas e nessa fase temos atonia muscular, ou seja não é possível movimentar o corpo, ela dura a maior parte do sono, após ela temos a fase de sono REM, onde são os nossos sonhos mais lúcidos, surreais e vívidos, você sonhar que está voando enquanto sente o cheiro da fumaça da cidade por exemplo, aqui temos movimentação ocular aleatória e não temos atonia muscular, pacientes que se movimentam muito durante o sono é por conta dessa fase e pacientes com Parkinson tendem a ter uma fase de sono REM onde eles ´´sonambulizam´´, levantam da cama e se movimentam, normalmente mesmo durante o sono REM o seu corpo ainda tem controle para que você não saia andando pela casa durante seu sonho, porem em pacientes com Parkinson ou outras alterações psicológicas podem ter falha desse micro controle, a paralisia do sono por exemplo é um momento em que você desperta e seu corpo estava indo da fase do sono NREM para o sono REM, então se lembrarmos a fase do sono NREM vamos ter atonia muscular, enquanto no sono REM temos sonhos lúdicos e surreais, junte esses dois fatores e você vai entender porque quando você acorda nessa ´´paralisia do sono´´ você não consegue se mover (sono NREM) e normalmente ve criaturas bizarras ao seu redor (sono REM).




Portanto podemos concluir que mesmo o sono não tendo sido 100% elucidado ele é um processo vital e de suma importância para o corpo.

Capítulo 1.5 | Telencéfalo.

Chegamos ao final do nosso sistema nervoso central, o famoso telencéfalo ou tambem chamado de cérebro, antes de nos aprofundarmos sobre cada estrutura e a função de cada região vamos falar sobre os neurônios, os principais componentes dessa estrutura magnifica.






Ao falarmos sobre neurônios temos que entender o que eles são, eles são células onde a comunicação é baseada em eletricidade ou substancia químicas, chamadas de neurotransmissores, o neurônio funciona de maneira peculiar, ele necessita de estímulos que são captados pelos dendritos e direcionados até o ponto mais externo dele revestido por bainha de mielina, nessa região temos um potencial, o famoso potencial de ação, o potencial de ação funciona da seguinte maneira, estímulos externos ao serem captados pelos dendritos geram potenciais graduados, que caso consigam juntos atingir uma carga mínima eles se tornam o potencial de ação cujo qual não perde sua carga elétrica, pois como qualquer eletricidade ele tende a se dissipar (potenciais graduados), porem o potencial de ação possui uma característica fantástica, ele possui capacidade regenerativa.

Toda célula possui um potencial de repouso, que no geral é regulado por quantidades de íons de cálcio que se fixam na parte externa da membrana celular e um potencial de ação que é ditado por canais de sódio voltagem dependentes, o que isso quer dizer, quer dizer que a membrana tende a ficar em uma carga -65 por exemplo e que ao atingir uma carga de -30 por estímulos externos é o suficiente para que todos os canais de sódio voltagem dependentes ao redor daquela célula se abram e tenhamos um influxo massivo de sódio para dentro da célula, fazendo assim com que a membrana da célula agora passe de uma carga (anteriormente em -30) para +30 em um piscar de olhos.

Essa passagem de sinais é vital para que o nosso corpo consiga comunicar entre as diferentes células que temos, como se fosse praticamente um ´´computador´´ que precisa de ´´eletricidade´´ para comunicar entre si e essa

passagem de sinais é extremamente rápida, devido a presença da bainha de mielina ao redor dos neurônios (que por sinal temos doenças que a degeneram e por isso temos sintomas como lentificação muscular, já que agora o sinal demora mais para passar), a importância da bainha de mielina é a função dela como uma pseudo borracha isolante, já que quando a carga elétrica está passando do corpo do neurônio pelo axônio para que ela não se dissipe e perca a sua mensagem precisamos que a bainha de mielina isole aquela região, porem se você prestar atenção na imagem verá pequenos fragmentos entre as bainhas de mielina, esses fragmentos tambem são chamados de nódulos de Ranvier, são locais onde eu tenho novamente canais de sódio voltagem dependentes e quando eu tenho aquela carga elétrica positiva que foi disparada do corpo do neurônio ela chega nesses canais de sódio e os abre de forma abrupta de maneira quase instantânea, por isso que o potencial de ação não perde carga, já que ele utiliza desses nódulos de Ranvier para se regenerar, já que se tivéssemos uma dissipação dos sinais imagine o seguinte, iria descer a carga X do córtex para o seu músculo realizar a contração porem no meio do caminho ela caiu para 1/2X, agora o seu músculo recebeu metade da mensagem original e vai contrair apenas metade do caminho (teremos patologias que afetam essa região e serão explicadas em outros capítulos)



(Representação Potencial de Ação)

Depois do influxo massivo de ions de sódio ao atingir uma carga próxima de +30 - +40 esses canais tem suas comportas fechadas e agora canais lentos de vazamento de potássio se abrem, assim eu ´´jogo´´ para fora da célula ions de potássio para reestabelecer o meio interno, no capitulo 6.2 de acidentes farmacológicos falaremos como alterações nesses ions afetam essa comunicação. (Hipercalemia, Hipocalemia, etc.)

Agora que entendemos o potencial de ação vamos entender como funciona a geração do potencial graduado, já que eu acabei de explicar que são diversos


potenciais graduados que se juntam para chegar até a região limítrofe do neurônio e caso tenham força o suficiente tenho o potencial de ação, seu mecanismo de funcionamento é curioso pois aqui ao invés de cargas teremos neurotransmissores, moléculas produzidas dentro de vesículas dos neurônios vizinhos que são liberadas na fenda sináptica (região de comunicação entre os neurônios ou com outras células) que possuem uma capacidade de alterar o meio interno da célula adjacente.

Neurotransmissor	Receptor	Patologia
Acetilcolina	Muscarínico M1, M2, M3, M4 e M5	Alzheimer
Dopamina	D1, D2, D3, D4 e D5	Esquizofrenia Parkinson
GABA	$GABA_A$ e $GABA_B$	Ansiedade Epilepsia
Glutamato	NMDA, Cainato, AMPA	Epilepsia Isquemia cerebral
Norepinefrina	Alfa 1 e Alfa 2 Beta 1, Beta 2 e Beta 3	Depressão
Serotonina	$5HT_{1A-F}$ 5HT2 5HT3 5HT4 5HT5 5HT6 5HT7	Ansiedade Depressão Distúrbio do pânico Enxaqueca Esquizofrenia Náuseas e vômitos Transtornos alimentares

Falaremos dos principais neurotransmissores do nosso sistema nervoso: Acetilcolina, Dopamina, GABA, Glutamato, Norepinefrina e Epinefrina, Serotonina.


Acetilcolina: um neurotransmissor que possui duas divisões, chamamos no geral receptores para acetilcolina de receptores colinérgicos, ela é responsável pela nossa via parassimpática, agora caso o receptor onde a acetilcolina vai se ligar esteja ligado a Proteina G chamaremos o receptor de receptor muscarínico (presente principalmente em músculos lisos e cardíacos), caso o receptor esteja ligado a um canal iônico chamados de receptor nicotínico (presente principalmente na musculatura esquelética), no geral a função da acetilcolina é uma ação excitatória, ao se ligar ao receptor ela estimula um influxo de cargas iônicas positivas, porem caso ela fique ligada por muito tempo no receptor e não seja removida é extremamente problemático, falaremos sobre no capítulo sobre acidentes agrícolas. Em contra partida, se a acetilcolina está responsável pela via parassimpática a Epinefrina e Norepinefrina (Adrenalina e Noradrenalina) estão responsáveis

pela via simpática, uma curiosidade é que mesmo que ambas estejam relacionadas a um influxo de cargas positivas por fazerem partes de sistemas diferentes a sintomatologia de cada um é totalmente o oposto, e por sinal a acetilcolina é precursora para a produção de adrenalina e noradrenalina nos gânglios neuronais, no geral a Adrenalina está responsável pela via de luta ou fuga enquanto a Acetilcolina está responsável pela via de tranquilidade, por exemplo, quando vemos aquele paciente que acaba de ter um acidente de transito conseguir levantar e sair andando sem sentir dor é por conta da via de luta ou fuga, depois que ele identifica que não possui nenhum perigo extra ao redor essa via desliga e ele desmaia (um exemplo simples apenas para visualizarem como essa via é importante)



Agora falando mais sobre a comunicação entre os neurônios (já que acetilcolina e adrenalina é mais comum na comunicação de um neurônio com um musculo, órgão, etc.) temos dois principais e clássicos neurotransmissores, primeiro temos o GABA, uma molécula produzida nas vesículas dos neurônios pós sinápticos que é liberada na fenda pós sináptica e a principal função dele é se ligar a receptor de canais iônicos para cargas negativas, então o GABA tem como principal função ser depressor do sistema nervoso central, enquanto o Glutamato tem como principal função ser excitador do sistema nervoso central, já que ele se liga a canais de cargas positivas. Para finalizar temos dois neurotransmissores que já mencionamos nos capítulos anteriores, a Serotonina e Dopamina, ambas dependem da região em que estão ligadas, já que podem ser tanto excitatórios quanto


inibitórios, a Serotonina está ligada principalmente a via de tranquilidade, plenitude mental e satisfação, enquanto a Dopamina está ligada principalmente a via dopaminérgica mesolimbica responsável pela via do vício, ou tambem chamado de busca e recompensa, no geral o que precisamos saber sobre a via límbica ou via do prazer/vicio é que temos o córtex límbico e as principais estruturas relacionados é o giro cingulado em associação aos núcleos da base para que no final chegue a mensagem até o núcleo de Accumbens, todas as atividades que geram vicio estão relacionadas a essa via, já que ao excitar esse núcleo temos uma liberação massiva de dopamina, uma curiosidade é que o cérebro entende esse influxo massivo de dopamina como algo toxico e pelo principio de dowregulation começa a cria resistência a dopamina e assim o núcleo de Accumbens vai pedir por estímulos mais fortes para voltar aquela onda inicial de dopamina sendo que nunca vai conseguir, por isso que indivíduos que fazem uso de cocaína por exemplo, tem um influxo massivo de dopamina na primeira dose porem depois vão atrás de drogas ilícitas mais potentes pois o cérebro e a via límbica já começaram a ganhar resistência.



Agora que já entendemos como a comunicação neural é realizada falaremos de algumas classificações de neurônios, primeiro temos os neurônios motores primário e secundários, os primários são aqueles cujos corpos neurais estão no córtex, já os secundários são aqueles que os corpos neurais estão na medula e seus axônios vão até o musculo, basicamente podemos dividir como os primários estando no sistema nervoso central e os secundários no periférico, além dos motores temos uma classificação para os sensitivos, caso estejam relacionados a sensações superficiais chamados de neurônios sensitivos superficiais e caso sejam para sensações de vísceras chamados de neurônios sensitivos viscerais, ambos como estão responsável por enviar a


mensagem das sensações até a córtex se integram no grupo de neurônios aferentes somáticos e viscerais (superficial e visceral), já os neurônios responsáveis pelo controle muscular são classificados em neurônios eferentes.

Essa é uma classificação simples, porem além dela vale ressaltar o sistema nervoso entérico, eu mencionei anteriormente sobre apenas o sistema nervoso periférico e central, porem no sistema digestivo temos uma comunicação e rede neural tão extensa que fora criada uma classificação apenas para essa região, chamada de sistema nervoso entérico que possui capacidade quase independente do sistema nervoso periférico e central, por isso que pacientes com lesões medulares abaixo de T12, paraplégicos, conseguem se alimentar e ainda ter motilidade gástrica independente de estímulos do sistema nervoso periférico e central. Para uma facilitação de comunicação podemos identificar que ao lado da medula possuímos gânglios neurais, são regiões que estão ´´fora´´ da proteção do sistema nervoso central e por isso se agrupam em grupos compactos, estou mencionando-os pois normalmente a comunicação entre o SNE (sistema nervoso entérico), com o SNC (sistema nervoso central) ocorre através de gânglios neurais, imagine esses gânglios como pontos de encontro onde ambos os diferentes sistemas nervosos se encontram. (por sinal são esses gânglios são um dos locais onde temos a produção de adrenalina).




Falaremos agora sobre nossas células de suporte, chamadas tambem de

células da glia, no SNC temos a micróglia cuja função é basicamente a mesma dos macrófagos porem com uma atividade um pouco inferior, ependimárias cuja função é o revestimento de cavidades ocas para produção de liquor, astrócitos sendo as nossas principais células de barreira, eles fazem o tamponamento das fendas sinápticas para não ocorrer extravasamento de moléculas e ions para o meio externo, e por final as células de Schwann responsáveis pela formação da bainha de mielina nos neurônios. Já no SNP temos apenas duas, os oligodendrócitos que possuem a mesma função das células de Schwann, sendo a única diferença entre elas que um oligodendrócito tem capacidade de mielinizar dezenas de neurônios, e as células satélites, cuja função é de oferecer estabilidade para os neurônios, no capitulo 16 falaremos mais sobre o sistema nervoso periférico e como ele possui capacidade regenerativa.



Os neurônios tambem recebem estímulos externos, o que isso quer dizer, quer dizer que dentro do cérebro como estamos em um sistema fechado é necessário que consigamos ligar e desligar esse sistema, já que se fosse um ciclo fechado onde o primeiro neurônio após estimular o segundo, ao final do ciclo é estimulado novamente, criaríamos uma onda de sinalização interna tão forte que a córtex seria incapaz de enviar sinais precisos e o paciente iria evoluir rapidamente com uma sindrome convulsaria e em poucos minutos iria evoluir para óbito, nosso corpo para inibir isso criou três classificações de neurônios, os neurônios inibitórios cuja função principal é a de enviar cargas negativas para impedir a disparada de potenciais de ação na zona de disparo, imagine eles tendo como principal molécula produza o GABA, os interneurônios, cuja função é apenas de repassar a mensagem adiante para outros neurônios (já que eu preciso de neurônios no meio do caminho para levar uma mensagem do cérebro até o Hálux) e os neurônios excitatórios cuja

função é de enviar cargas positivas para facilitar o disparo do potencial de ação, por sinal essa via de comunicações, principalmente a de facilitação mediada por neurônios excitatórios é o principio para a memoria que já discutimos e falaremos ainda mais nesse capitulo, já que quando mais facilitada aquela via mais facil é disparar o potencial de ação, por isso existem tópicos que apenas menciona-los vagamente nos permite lembrar com clareza, enquanto existem tópicos que mesmo focando e tentando lembrar daquele conteúdo as vezes não conseguimos lembrar, tudo isso é pelo princípio de facilitação de comunicação neural.



Terminando o tópico sobre neurônios iremos falar agora detalhadamente sobre as colunas aferentes e eferentes. Temos a **Coluna Eferente Somática** uma coluna composta por neurônios que originam fibras para a inervação dos músculos oculares e linguais, sendo os pares de nervos cranianos pertencentes a essa via o:

. Núcleo do Oculomotor (NC-III) → Inervando todos os mm.Extrínsecos do Olho (m.Reto Superior, medial, inferior e oblíquo inferior; m.Levantador da pálpebra do olho).

. Núcleo do Troclear (NC-IV) → Inervando o M.Oblíquo Superior.

. Núcleo do Abducente (NC-VI) → Inervando o M.Reto Lateral.

. Núcleo do Hipoglosso (NC-XII) → Inerva os mm.da Língua (mm. Genioglosso, estiloglosso, palatoglosso, hioglosso, transverso e vertical).

Coluna Eferente Visceral onde nos seus núcleos encontramos os neurônios pré-ganglionares do sistema parassimpático. As fibras que saem desses núcleos antes de atingirem as vísceras, fazem sinapse em um gânglio para funcionar como ponto de partida, dentre eles temos os:

.Núcleo de Edinger-Westphal → Pertence ao complexo do Oculomotor,

originam fibras para o Gânglio Ciliar e inervam o m. Ciliar e o Esfíncter da pupila.
. Núcleo Lacrimal → Situado na Ponte, emergindo fibras nervosas finas que saem pelo (nervo facial VII), passam pelo N.Petroso Maior e N.do Canal Pterigóideo, e chegam ao Gânglio Pterigopalatino, onde emitem fibras para inervar a Glândula Lacrimal.
. Núcleo Salivatório Superior → Situado na Ponte, emerge fibras que saem pelo (nervo intermédio ramo facial III) e chegam ao N.Lingual, através dele vão até o Gânglio Submandibular onde inervam as Glândula Submandibular e Sublingual.
. Núcleo Salivatório Inferior → Situado no Bulbo onde emergem fibras que saem pelo N.Glossofaríngeo e chegam ao Gânglio Ótico, pelos Nervos Timpânico e Petroso Menor e inervam à parótida.
. Núcleo Dorsal do Vago → Situado no Bulbo onde origina fibras que saem pelo N.Vago e terminam fazendo sinapse em vários gânglios pequenos nas paredes das vísceras torácicas e abdominais.
Coluna Eferente Visceral Especial que dá origem a fibras que inervam músculos que se desenvolvem a partir dos arcos faríngeos. (mm. Da mandíbula, faringe e pescoço), os núcleos pertencentes a essa coluna são:
. Núcleo Motor do Trigêmeo → Situa-se na Ponte onde origina fibras que saem da divisão Mandibular do N. Trigêmeo, e terminam inervando os músculos da mastigação (mm. Temporal, Masseter, Pterigóideo lateral e medial), o M.Milo-Hioídeo e o Ventre Anterior do Digástrico (que por sinal podem ser chamados de acessórios a mastigação, já que estão relacionadas a deglutição)
. Núcleo do Facial → Situa-se na Ponte onde origina fibras que saem do NC-VII(Facial) e vão para a musculatura da mímica (mm. Zigomáticos, Risório, Orbicular da boca, Bucinador, Frontal, Temporal e aqueles pertencentes a região Mentoniana) além do Ventre Posterior do Digástrico.
. Núcleo Ambíguo → Situa-se no Bulbo onde origina fibras que inervam os músculos da Laringe e da Faringe, essas fibras nervosas saem pelos nervos Glossofaríngeo, Vago e Acessório para chegar até os músculos específicos.
Coluna Aferente Somática Os núcleos dessa coluna recebem fibras que trazem grande parte da sensibilidade somática da cabeça. É a única coluna que se estende ao longo de todo o tronco encefálico sendo composta pelos:
. Núcleo do Trato Mesencefálico do Trigêmeo →. Recebe impulsos de sensibilidade e tato epicrítico de toda a face.
Núcleo Sensitivo Principal → Toda a sensibilidade que não é abrangida pelos outros dois tratos chegam no sensitivo principal, então podemos concluir que é praticamente do pescoço para baixo.
. Núcleo do Trato Espinhal do Trigêmeo → Onde recebem impulsos proprioceptivos originados em receptores encontrados nos músculos da


mastigação e nos músculos extrínsecos do olho.

Coluna Aferente Visceral, é formada somente por um núcleo.

. Núcleo do Trato Solitário → Sensibilidade para gustação geral


Agora voltaremos a falar um pouco sobre a memória, no caso falaremos sobre os tipos de memorias, primeiro vamos nos lembrar de como ela funciona, aquilo que aprendemos durante o dia o hipocampo durante a noite redireciona essa informação para a córtex, onde se formam nossas memorias de longo prazo, porem durante o dia a dia nosso cérebro aprendeu a utilizar, de maneira prática, as informações que ele recebe, por isso classificamos a memória com duas principais categorias, as memorias de curto prazo que são aquelas que esquecemos rapidamente, as memorias de trabalho que ao finalizar uma tarefa nos esquecemos, tanto é que ela é a responsável pelo esquecimento de conteúdo, quando focamos em estudar apenas para passar em uma prova nosso cérebro identifica 80% daquele conteúdo estudado como memoria de trabalho e apenas 20% como memoria de longo prazo, por isso que ao terminar a prova e passar de ano o cérebro tende a descartar aquela informação e por fim temos as memorias de longo prazo, sendo que algumas nos acompanham durante toda a vida até a morte. No geral temos que saber que a memoria tambem pode ser classificada como negativa, sendo as de curto prazo e positiva é aquela onde tivemos uma mudança conformacional, o que isso quer dizer, quer dizer que o nosso neurônio fez uma nova sinapse, mudou sua estrutura, para guardar essa informação para o resto da vida.

Além desses dois tipos existe tambem a memoria intermediaria que são essas mudanças conformacionais porem fracas, memorias que duram de dias até semanas depois são esquecidas, foi descoberto esse tipo de memoria e dado o nome de modelo aplysia, onde descobrimos através de testes animais que a Serotonina é precursora para a formação de memorias intermediarias, o que por sinal é excelente, já que a memoria intermediaria ao ser reforçada se torna uma memoria positiva e nos acompanha por toda a vida.



circuito de recompensa

Agora que finalizamos toda a parte teórica sobre os neurônios vamos falar sobre o córtex, primeiramente temos que conhecer as principais divisões, sendo elas o lobo frontal, parietal, occipital, temporal e lobo da insula (que ´´guarda´´ os núcleos da base que já foram explicados dentro dela)



Insula está interna ao temporal.

No córtex temos a área somatossensorial, a principal área sensitiva, dentro dela temos o homúnculo sensitivo, que é uma breve representação de como o cérebro interpreta o corpo e as diferentes regiões de sensações, enquanto temos a área motora onde temos o homúnculo motor que é a mesma lógica, uma representação de como pontos específicos do cérebro possuem tratos corticoespinhais para enviar mensagens motoras para grupos musculares


específicos.




(Representação dos Homúnculos)

Podemos perceber ainda mais na motora como que as mãos e face são altamente inervadas com diversas regiões para ditar os movimentos finos, enquanto os membros inferiores estão extremamente pequenos, o que demonstra que o nosso cérebro possui vias extremamente detalhadas e complexas para o controle fino das mãos.

Temos diversas regiões especializadas na córtex, porem se formos separar as cinco principais seriam a região pré-central, responsável pelo controle motor, já que fazem parte da via de associação motora, que une diferentes regiões do lobo pré-frontal para detalhada a mensagem motora, região pós central, atuando principalmente na função de interpretação sensorial, aqui temos uma intima associação de toda a região formando a área de associação somatossensorial para a interpretação de estímulos diversos, área de Broca, responsável pela formulação motora de palavras para fala, lesão nessa área torna a pessoa incapaz de comunicar, chamado tambem de afasia motora, por fim na área parieto-occipto-temporal esquerda temos a área de Wernicke, que atua na interpretação da fala, lesões nessa região o paciente vai apresentar uma afasia sensorial, onde ao falar ele irá formular frases sem sentido e desconexas da realidade, vale uma ressalva que do lado direito do cérebro não temos área de Wernicke, essa região é sobreposta por uma área responsável pela interpretação de duplo sentido, ao lesar essa região oposta a área de Wernicke o paciente perde a capacidade de entender piadas de duplo sentido e comunicações não verbais.




Agora falando sobre os grandes lobos no **Lobo Frontal** possuímos algumas regiões específicas, temos o giro pré central, que atua na função motora, giro frontal superior, atuando como região pré motora e motora auxiliar, para ajudar no refinamento da ação, giro frontal inferior onde se localiza na região triangular e opercular a área de Broca e giro frontal médio que auxilia o giro frontal superior.




No **Lobo Parietal** as principais estruturas são: giro pós-central, responsável pela integração sensorial de todo o corpo, giro angular, uma área associada a leitura e escrita, giro supra marginal que trabalha em conjunto ao giro angular, lesões nesses dois giros o paciente vai apresentar um sintoma clássico onde ele enxerga porem não consegue associar essa visão a leitura, área de Wernicke (que já fora explicada). No **Lobo Temporal** temos os giros superior, médio e inferior responsáveis pela identificação de objetos e ao

afastarmos o Sulco Lateral podemos ver o giro transverso do lobo temporal responsável pela audição. No **Lobo Occipital** temos principalmente o sulco calcaríneo atuando na visão, vale uma ressalva que o lábio calcaríneo que está responsável pela visão principalmente possui três etapas, na primeira etapa vemos algo, na segunda interpretamos aquilo que estamos vendo e na terceira associamos alguma emoção aquilo que vimos. Por fim temos o **Lobo da Insula** que está relacionada a gustação e na face medial de todo cérebro estão as estruturas que compõe a **Área Límbica**, sendo eles o uncus, giro para-hipocampal, istmo do giro do cíngulo e giro do cíngulo, a importância da área límbica e a imagem mostrando a via de passagem para o núcleo de Accumbens causando o vício já fora mostrado.



O cérebro possui fascículos que interligam diferentes lobos, imagem como se o cérebro fosse uma cidade cheia de ruas onde é possivel a passagem de apenas um carro porem para destinos diversos, nos fascículos é como se alargássemos as ruas para passagem de quatro carros ao mesmo tempo rumo ao mesmo destino, os principais fascículos são o fascículo arqueado, responsável pela linguagem, fascículo uncinado responsável pelo comportamento, fascículo longitudinal superior responsável por integrar o lobo parietal ao frontal, por sinal lesões nessa via vão ter os sintomas clássicos como dismetria e caso peça ao paciente para desenhar um pentágono dentro de outro pentágono ele não consegue, pois perde essa capacidade de imaginar e integrar formas complexas na mente e depois colocar em ação, fascículo longitudinal inferior responsável pelo processamento visual, integra o lobo temporal ao lobo occipital.




Por fim para finalizarmos esse capitulo temos as meninges, estruturas que revestem o cérebro para servirem de proteção, temos três meninges ao todo, a Dura-máter que se divide em Perióstea e Meníngea, a porção que está em contato com o crânio é a perióstea, enquanto a porção que está em contato com a Aracnoidea-máter é a meníngea, ela é a única meninge que é vascularizada e inervada, a cefaleia por exemplo não é um dano direto no cérebro, são processos de vasodilatações que ´´empurram´´ a dura-máter irritando-a, e interpretamos esses sinais como dor de cabeça, mas o cérebro em si não possui sensibilidade, por isso temos cirurgias abertas com o paciente acordado e o mesmo não refere dor, por conta dessa falta de sensibilidade interna do cérebro. Temos a Aracnoidea-máter que se liga entre a Dura-máter e a Pia-máter, ela é uma meninge fragmentada, devido a passagem de liquor, por isso ela se fixa através de colunas ou tambem chamado de trabéculas aracnoideas e a parte que se fixa a Dura-máter é chamada de barreiras aracnoideas, uma característica tambem da aracnoidea é a capacidade de invaginação para dentro do seio sagital superior, formando as granulações aracnoideas e permitindo assim que o liquor escorra para o sistema venoso e seja drenado, por fim a ultima meninge é a Pia-máter, que faz comunicação e fixação nos astrócitos ao redor dos neurônios e reveste toda a camada intima, essas meninges tambem podem ser classificadas em dois grandes grupos, a Paquimeninge (onde temos apenas a Dura-máter) e a Leptomeninge (que comporta tanto a Aracnoidea quanto a Pia), vale reforçar que a Dura-máter por ser a mais externa ao se dobrar forma algumas

estruturas, temos a foice cerebral que divide os hemisférios cerebrais, foice do cerebelo que divide o cerebelo e tenda ou tentório cerebelar que separa o teto do cerebelo da base do cérebro, por sinal mesmo após essa separação feita pela Dura-máter, graças ao corpo caloso conseguimos manter a comunicação entre os diferentes hemisférios cerebrais.





(Vista da Dura-máter dissecada - Unesp)




(Representação da Aracnoidea-Máter, a Pia não é possivel visualizar porem é possivel visualizarmos a aracnoidea já que devido a composição é possivel remover a Dura-máter sem descolar a aracnoidea dela – Unesp)

Capítulo 2 | Anatomia Vascular.


Abordaremos nesse capítulo sobre toda a anatomia vascular relacionada ao telencéfalo principalmente, citaremos a anatomia vascular cardíaca para referência, composição histológica das artérias e veias, problemas decorrentes das oclusões de cada artéria responsável pela irrigação do telencéfalo e detalharemos o processo fisiopatológico da oclusão, passando por aterosclerose brevemente, isquêmica, infarto, necrose e aneurismas.

Como esse livro é voltado para a neurologia não iremos nos aprofundar detalhadamente em todas as artérias e veias, porem o básico é necessário, toda artéria e veia é composta principalmente por três camadas, a túnica intima, que é a camada mais interna do vaso, onde ocorrem as trocas de moléculas, túnica médica responsável pela integridade do vaso, repleta de fibras de colágeno e células musculares lisas, vai ser nessa camada que mais a frente falaremos sobre aterosclerose, por fim temos a túnica adventícia que é a camada mais externa, composta por algumas fibras de colágeno, ela vai servir como nossa capa final, porem vale ressaltar que a principal função de elasticidade é da túnica média.




No geral a divisão entre camadas é essa, porem vale ressaltar que temos algumas diferenças dos vasos de grandes calibres como as artérias e veias,


para os vasos de pequenos calibres como arteríolas, vênulas e capilares, logicamente quanto menor o diâmetro do vaso menor as camadas e dependendo, em caso de capilares por exemplo temos apenas a túnica íntima, vale uma ressalva para uma célula extremamente importante chamada de pericito.




Presentes principalmente nos capilares a sua função é a de fornecer estabilidade e atuar na angiogênese, quando um capilar é lesado é preciso ter uma regeneração celular e é aqui que os pericitos entram, eles se multiplicam para auxiliar e dar estabilidade durante a angiogênese, a diabetes por exemplo ou a isquêmica crônica afeta a função dos pericitos e assim eu fico incapaz de fazer o processo de angiogênese para irrigar regiões do corpo que foram anteriormente lesadas e perderam sua vascularização.




Podemos no questionar sobre a gravidade, a final como que o sangue retorna ao coração e não fica preso em certas regiões do corpo? Já que para o sangue descer do coração faz sentido, já que está a favor da gravidade, porem e para ´´subir´´ de volta ao coração? A resposta é simples, existem pequenas válvulas dentro das veias, essas válvulas impedem que o sangue retorne da panturrilha para o pé por exemplo, e fique ´´preso´´ em pequenos segmentos, quando temos contração de músculos ao redor damos força para empurrar esse sangue que enfim volta ao coração, por isso que ao ficarmos muito tempo sentados ou em pé em apenas uma posição é recomendado que faça contração sequenciada da panturrilha para ajudar no fluxo sanguíneo. (lesões nos vasos podem causar veias varicosas, onde eu tenho falha dessas válvulas e assim o sangue fica estagnado)



No geral o que precisamos nos lembrar da anatomia periférica é saber que do coração temos a Aorta que vai jogar o ramo da artéria subclávia e artéria carótida comum, na artéria subclávia eu tenho uma pequena artéria que sai que segue rumo a região posterior do pescoço, a artéria vertebral, enquanto na região anterior a artéria carótida comum joga o ramo da artéria carótida interna que segue direto para o canal carotídeo sem jogar nenhum outro ramo para o pescoço.



Antes de adentrarmos sobre toda a vascularização cerebral vamos falar de alguns conceitos sobre as artérias, veias e como elas podem ser afetadas, primeiro falaremos sobre o conceito de isquemia, isquemia é um conceito onde estamos falando sobre a falta de oxigênio em uma região, esse conceito é de grande importância ao nos lembrarmos da micro fisiologia celular, onde a célula ao perder seus estoques de oxigênio começa a fazer um processo chamado de respiração anaeróbica, onde temos como subproduto a liberação de ácido lático para o meio externo, assim diminuímos os níveis de ph no sangue levando a uma acidose.




Essa acidose ocasiona em alterações perigosas dentro da célula, mediante uma queda do ph dentro da célula canal trocador de hidrogênio com sódio é inativado, ou seja eu paro de pegar sódio do meio externo e mandar para dentro da célula enquanto paro de pegar hidrogênio e jogar para o meio externo, justamente para evitar uma piora da acidose, porem isso é extremamente perigoso já que eu começo a perder meu estoque interno de sódio, além disso eu inativo a bomba de sódio e potássio, então eu paro de pegar sódio interno e jogar para fora e paro de pegar potássio do meio externo e jogar para dentro da célula, enquanto uso o resto do estoque interno de potássio para fazer um cotransporte com ions de bicabornato interno da célula para tentar conter a acidose, o problema? Saímos de uma acidose entramos em uma hipercalemia, o aumento de potássio extracelular vai, principalmente, alterar a função cardíaca, já que o potássio em excesso diminui o potencial de repouso da célula cardíaca facilitando com que aja contração, por isso o paciente começa a apresentar taquicardia (além de claro o corpo estar respondendo para tentar enviar sangue para a região com infarto, que é basicamente a isquêmica crônica que perdurou), porem após alguns minutos o potássio em excesso começa a inativar os canais de sódio das células musculares cardíacas responsáveis pela fase 0 de despolarização, agora o nosso paciente evolui de uma taquicardia para uma bradicardia e está pendendo para uma parada cardíaca se perdurar o acumulo excessivo de potássio. (esse é um exemplo extremo, nem toda isquemia leva a morte obviamente, porem já linkamos com o potássio para servir como curiosidade, esse mecanismo do potássio é comum em intoxicação por potássio, nos quadros de isquemia ela tende a evoluir para infarto e necrose, porem raramente evolui para esse excesso absurdo de potássio)

Caso essa isquemia perdure de maneira aguda e total iremos evoluir para o infarto que é quando cessa totalmente o estoque de oxigênio local e a célula começa a sofrer lesões e deformações na sua estrutura celular, dependendo

da região afetada o paciente evolui a óbito, imagine o coração ou o cérebro ficando sem oxigênio por minutos, esse cenário é incompatível com a vida, caso o infarto perdure evoluímos para necrose que é a degeneração celular, porem a necrose depende da região afetada, no cérebro por exemplo teremos necrose liquefativa, já que os neurônios possuem principalmente lipídeos dentro de suas células, enquanto no coração por exemplo que é repleto de proteínas estruturais ele consegue manter sua forma por mais tempo, por isso falamos que a necrose nesse local é a necrose coagulativa, pois mesmo depois da célula perder a sua membrana devido ao excesso de proteínas estruturais ainda mantemos uma breve estrutura local que se agrupa em um formato de pseudo coagulo, por isso é chamado de necrose coagulativa.


A depender do vaso e do órgão afetado teremos diferentes cores para a necrose, órgãos com circulação unidirecional, ou seja afetando uma artéria em um órgão que é exclusivamente dependente daquela artéria teremos uma necrose coagulativa branca, caso a oclusão seja de uma veia que drene aquela região a necrose coagulativa terá inicialmente uma cor arroxeada tendendo a uma cor marrom pelo acumulo de hemossiderina, abaixo temos exemplos:



(Necrose Branca)




(Arroxeado tendendo a marrom)




(Necrose liquefativa cerebral, veja como o tecido literalmente ´´derrete´´, em comparação com a área correspondente vemos que a região infartada onde sofreu a necrose está menor, justamente por essa parte de tecido saudável que ´´derreteu´´)

Quando estamos discutindo sobre acidentes vasculares temos duas patologias sendo as mais comuns, a aterosclerose e o aneurisma, falaremos sobre cada uma individualmente, porem iremos falar sobre aneurismas após detalhar o polígono de willis, falaremos primeiro sobre a aterosclerose.



Todo processo de aterosclerose leva a isquemia, nos priores quadros teremos uma isquemia total e persistente, a aterosclerose envolve um processo complexo envolvendo as células do sangue, no geral quando temos lesões vasculares da túnica intima, seja por trauma, tabaco, processos inflamatórios crônicos, etc. Abrimos diversos ´´fragmentos´´ na túnica intima, quando moléculas carregadas de lipídeos como o LDL que é repleto de colesterol passa pela região e adentra essas fenestras, diferente do TAG que é imediatamente utilizado como fonte energética o colesterol que não é quebrado e deveria server para dar fluidez ou processos metabólicos específicos fica preso dentro da túnica intima, as células musculares ao redor tentam quebrar esse LDL porem falham nesse processo e agora temos um LDL oxidado que não consegue sair de dentro do vaso.



O monócito que está passando pela região do vaso ao avistar esse LDL oxidado se transforma em macrófago e libera interleucinas que recrutam mais macrófagos, IL-1, IL-6, TNF-alfa e IFN-gama para tentar combater esse ´´agente agressor´´, porem quando o macrófago adentra a túnica intima através de proteínas ligadoras como a selectina e a integrina ele fagocita o LDL oxidado porem não consegue quebrar aquele colesterol por completo e fica preso dentro da túnica intima perdendo sua função fagocítica e se tornando o que chamamos de célula espumosa, o problema é que quanto mais macrófagos adentram mais eu aumento a placa de ateroma, já que as células espumosas vão dando volume, as células musculares da túnica média ao identificar essa estrutura agressora começa a produzir colágeno e fibrina para envolver toda essa ´´gordura´´ dentro de uma capsula rígida, agora que entendemos o que está acontecendo dentro do vaso vamos falar sobre o meio externo.


Aquela IL-6 liberada no começo estimulou o fígado a liberar PCR, quando a PCR chega ao local ela estimula que ainda mais macrófagos cheguem ao local porem agora estamos com um cenário de uma capsula rica em fibrina, então a PCR vai estimular que os macrófagos produzam mieloperoxidases para destruir aquela capa de fibrina, então agora nossa placa de ateroma está ficando fragilizada, o problema é que o dano persistente contra essa placa de ateroma pode causar o rompimento da mesma, porem imagine o seguinte, estou com um vaso extremamente danificado, expondo suas glicoproteínas internas, muito colesterol acumulado e as células ao redor, ao serem lesadas, produziram muito fator tecidual que não saiu para o meio externo devido a essa capsula que ´´prendeu´´ eles dentro do vaso, ao romper a barreira todos

esses fatores são liberados, as glicoproteínas expostas pela lesão e o fator tecidual acumulado vão iniciar uma cascata de coagulação absurda criando um coagulo enorme que irá ocluir imediatamente todo o lúmen daquela artéria, enquanto o colesterol que estava ali dentro vai sair em formato de fragmentos, os famosos êmbolos, causando oclusões de outras artérias, por isso que o tratamento dessa condição patológica é evitar o rompimento das placas diminuindo a ação da PCR estimular o fígado a conjugar mais HDL, pois o HDL ao passar nessas regiões consegue, como um imã, puxar a gordura que estava dentro do macrófago e fazer com que ele volte a ter função fagocítica e consigamos diminuir aquela placa e em casos de grandes placas colocar o stent, filamentos que dilatam o vaso, já que o precursor para vasodilatação que o óxido nítrico fica inibido pois ele é produzido na túnica intima mediante a lesão, onde está tendo o acumulo da placa e assim impedindo o vazamento do mesmo.




(Representação do stent, uma malha fina que é colocada para aumentar o lúmen do vaso novamente)

Agora que entendemos sobre a aterosclerose iremos entender sobre o polígono de Willis e as artérias de cada região.



(Representação do polígono de Willis)




Falaremos do problema da oclusão de cada artéria ou do impedimento do fluxo, seja por aterosclerose ou por alguma hemorragia que impede o fluxo de chegar até a região mais distal que aquela artéria deveria irrigar.

A.Cerebelar Inferior Posterior: no geral a oclusão de qualquer artéria que irrigue o cerebelo vai causar ataxia, que é a marcha do bêbado, o paciente vai ter dificuldade para deambular e irá cair para o lado afetado, por isso que além da ataxia que as três cerebelares causam irei explicar como diferenciar cada uma, nesse caso a oclusão da posterior vai causar muita vertigem por afetar os núcleos internos e o paciente vai cursar com disfagia, disartria, **soluços** e a sindrome de **Horner ipsilateral**, que é miose (pupila contrai), ptose palpebral e anidriase (não produz suor)

A.Cerebelar Inferior Anterior: no ramo anterior o que vai nos diferenciar é que aqui teremos na extremidade o ramo da artéria labiríntica, então além de vertigem o paciente vai apresentar surdez e a famosa paralisia facial periférica.

A.Cerebelar Superior: já no ramo superior o paciente não costuma apresentar vertigem, disfagia, etc. Aqui ele costuma apresentar ataxia severa de marcha, dismetria de membros e, dependendo da oclusão podemos obstruir o trato espinotalâmico e assim o paciente perde a sensibilidade a dor e temperatura.




A.Cerebral Posterior: chegamos nas cerebrais, a artéria cerebral posterior cursa principalmente com perda de visão, porem aqui temos alguns casos curiosos, no meio da artéria cerebral posterior temos as artérias talâmicas, caso elas sejam ocluídas por completo teremos uma isquemia parcial no tálamo, onde o paciente irá desenvolver uma sindrome que cursa com uma dor crônica excruciante por todo o corpo que não passa com opioides, por isso temos que tratar com moduladores, chamada de sindrome talâmica, caso tambem tenhamos oclusão de ambas as cerebrais posteriores o paciente vai apresentar uma sindrome clássica onde ele fica cego porem nega a cegueira, o cérebro inventa imagens do que ele estaria vendo porem ele está cego.
A.Hipofisárias: as artérias hipofisárias, juntas das hipotalamicas, saem da parte central da artéria cerebral média, logo após a carótida interna se tornar cerebral média, caso tenhamos oclusão das hipofisárias, que é comum principalmente em gestantes, teremos a sindrome de Sheehan, que é o processo de necrose da hipófise, que já falamos das suas funções, então aqui podemos esperar um paciente com variações absurdas de temperatura, pressão, hormônios, etc. Um quadro extremamente dificil de manejar.
A.Hipotalamicas: já nas hipotalamicas a maior característica pela necrose do

hipotálamo seria a amnesia anterógrada, ou seja a função do hipotálamo de guardar brevemente as memorias de curto prazo é perdida, então o paciente perde a capacidade de formar novas memorias.




A.Coroidea: caso tenhamos uma oclusão dessa artéria teremos uma tríade curiosa, a artéria coroidea direita (principal ramo direto daqui) irriga a região da capsula interna, trato óptico e tálamo, então vamos ter literalmente uma perda motora pura, sensitiva pura e visual pura, porem mesmo que o paciente perca a sensibilidade e a atividade motora contralateral inteira ele não vai ter nenhuma alteração emocional ou cortical, no máximo nos piores casos podemos ter perda de consciência por conta de afetar o tálamo, mas no geral é perda de visão, déficit motor e sensitivo puro, já que na capsula interna passa o trato corticoespinhal responsável pelo movimento motor do corpo.
A.Cerebral Media: caso tenhamos uma oclusão da cerebral media vão ser os famosos sintomas de AVC, pois como ela é ramo da carótida interna acabada sendo a artéria mais comum de ser acometida no geral, então pode-se esperar alterações na fala, como falas arrastadas, perda de motricidade nos membros superiores e desvio de rima lateral. Lembrando que o desvio de rima é ipsilateral a lesão, no caso falamos que é contralateral no sentido de qual musculo fica paralisado, mas o sinal semiológico é ipsilateral, então se for a cerebral media direita afetada teremos desvio de rima para a direita, já que o sintoma de paralisia contra lateral vai fazer com que os músculos faciais do lado esquerdo percam suas forças e assim desviando a rima labial para o lado que não foi acometido pela paralisia.




A.Lenticuloestriadas: outro caso de déficit motor puro, as artérias lenticuloestridas tambem irrigam a capsula interna, porém é uma região diferente da artéria coroidea, então oclusão tambem vai apresentar déficit motor puro por afetar o trato corticoespinhal, porem para conseguirmos diferenciar uma da outra vamos nos lembrar que na coroidea o paciente vai ter perda de sensibilidade e visão, enquanto aqui teremos apatia severa, pois as lenticuloestriadas tambem irrigam a cabeça do núcleo caudado, que atua na via emocional, mesolimbica dopaminérgica, por isso além do déficit motor teremos uma apatia severa no paciente.


A.Transversal de Heubner: já a transversal de Heubner mesmo que seja um ramo da cerebral anterior a paralisia aqui é de predomínio facial e de membros superiores, poupando na maioria das vezes os membros superiores,

a maneira para diferenciarmos a transversal da cerebral média é que na média temos disartria severa, muitas vezes o paciente literalmente evolui de fala arrastada para parar de falar, por afetar a área de Broca e Wernicke, já na de Heubner temos apenas fala arrastada, além de que na cerebral média o paciente nega toda a região contralateral a visão, heminegligencia e anosognosia, então é comum que caso seja lesado o lado direito o paciente esbarre o lado esquerdo do corpo nas estruturas ao seu redor sem perceber, mas realmente, conseguir diferenciar ambas é um desafio clinico pois mesmo que falemos sobre a distinção de ambas existem casos onde os sintomas se sobrepõem o que dificulta o diagnóstico.




A.Cerebral Anterior: para finalizarmos falaremos sobre a cerebral anterior, aqui teremos sintomas principalmente motores, então o paciente vai apresentar principalmente déficit motor de membros inferiores e em casos mais graves pode apresentar incontinência urinária.






A drenagem o cérebro é fantástica, primeiro temos o seio sagital superior, sagital inferior e reto desembocando na confluência dos seios, nessa região eles partem através do seio transversal até chegaram no seio sigmoideo, lembrando que o seio petroso superior vai até o seio transverso enquanto o inferior já desemboca direto no sigmoideo, do seio sigmoideo partem rumo ao

forame jugular desembocando na veia jugular interna e chegam na cava superior.




Já a drenagem do tronco encefálico não chega direto ao seio sigmoideo, na realidade eles vão desembocar primeiro no seio reto através da veia cerebral magna que invagina para dentro das estruturas do mesencéfalo, cerebelo, ponte e bulbo, onde ela encontra diversos ramos venosos para fazer a drenagem local.




Agora que já falamos sobre o sistema vascular vamos finalizar esse capítulo falando sobre aneurismas, no geral os aneurismas cerebrais podem ser divididos em dois grandes grupos, **os fusiformes** que dilatam todo o diâmetro do vaso e **os saculares** onde apenas uma região é dilatada, no geral o conceito de aneurisma é um enfraquecimento da parede vascular onde eu perco a resistência do vaso, além dessas duas categorias podemos classificar o aneurisma sacular quanto a um aneurisma gigante caso o diâmetro dele seja maior do que 2,5cm. A importância de saber sobre os aneurismas é justamente saber quando encaminhar para cirurgia e quando manter em observação, no geral devemos operar quando o crescimento do aneurisma for extremamente rápido, como esse livro foca em neuro não iremos nos aprofundar em aneurismas de aorta abdominal, focaremos nos cerebrais.


As causas de aneurismas são diversas, podem ser por alterações genéticas como a **Doença de Marfan** onde eu tenho uma deficiência de colágeno e

elastina na túnica média do vaso, assim ele perde sua resistência e força de complacência, nosso vaso fica parecendo um ´´balão´´, onde ele consegue se expandir e crescer, porém não tem força pela falta de elastina e colágeno para voltar a sua forma inicial, então fica uma região acumulando sangue sem conseguir voltar ao seu tamanho natural.






O maior perigo dos aneurismas não é a deformidade do vaso, mas sim o fato da parede estar enfraquecida, claro que a deformidade do vaso dependendo da região pode comprimir um grupo de neurônios e ter algumas alterações neurais, porem o problema são casos de hemorragias, rompimento de aneurismas saculares são extremamente difíceis de se resolverem, pois imagine o seguinte caso, você está com uma hemorragia subaracnóidea pelo rompimento da ´´bolsa de sangue´´ que está ocupando grande espaço de toda cavidade cerebral, se você tentar diminuir a pressão do paciente para diminuir a hemorragia você corta a irrigação até regiões de extremidade, levando a isquemia e necrose, se você aumenta a pressão do paciente ´´jorra´´ ainda mais sangue dentro da cavidade cerebral comprimindo ainda mais o cérebro e causando lesões irreversíveis.




No geral, até que aja rompimento, os aneurismas são descobertos de maneira secundaria ao realizar exames de rotina e apenas vigiados ao longo do tempo, tentamos através de hábitos de vida segurar aquele aneurisma por mais tempo, porem vale uma curiosidade aqui, a Diabetes Mellitus é um fator positivo para aneurismas, o que isso quer dizer, quer dizer que pacientes que possuem diabetes estão ´´protegidos´´ contra aneurismas, já que essa patologia, pela presença de AGEs , tem a capacidade de se ligar a proteínas estruturais do vasos e formar complexos que estimulam as estruturas ao redor a depositarem cálcio nessa região do vaso em que o AGE se ligou, pois vão reconhecer como agente estranho e tentar calcificar, então se o aneurisma é causado por enfraquecimento dos vasos, aqui eles ficam super rígidos pela deposição de cálcio, o que acaba protegendo os aneurismas de se romperem, mas em contra partida os AGEs causam diversos problemas como neuropatia periférica, pois eles se ligam a bainha de mielina dos neurônios e quebram a estrutura dela, tornando-a inútil e iniciando um processo de desmielinização periferia, por isso o paciente diabético perde sensibilidade de membros inferiores, retinopatia, pressão arterial alta, entre outros fatores.


TRATAMENTOS CIRÚRGICOS
Clip
Aneurisma
Artéria
Fluxo sanguíneo
Aneurisma
Artéria
Stent
Fluxo sanguíneo
Opção 1
Como se fosse um pequeno pregador (chamado de clip) de roupa. Imagine um pequeno pregador com menos de 2 milímetros que, implantado, age fechando as paredes do aneurisma, permitindo que o fluxo sanguíneo seja preservado no interior da artéria, impedindo que ocorra uma ruptura com consequente hemorragia dentro das cavidades cerebrais.
Opção 2
Um pequeno cateter adentra o aneurisma e o enche com pequenos fios de metal muito flexíveis, que vão se aglomerando e impedindo que o sangue entre, podendo ou não se associar a um stent. O objetivo nesse caso é que o aneurisma não se rompa.

Capítulo 3 | Encefalopatias.

No geral o conceito de encefalopatia vai ser toda patologia que vai afetar o encéfalo, então abuso de fármacos, toxinas, hipoxia, falência de órgãos, tudo isso são fatores que direta ou indiretamente afetam o funcionamento do encéfalo, por isso são chamadas de encefalopatias, nesse capítulo dividiremos em seis principais categorias, sendo elas as Encefalopatias Metabólicas e Sistêmicas, Encefalopatias Tóxicas e Nutricionais, Encefalopatias Infecciosas e Transmissíveis, Encefalopatias Traumáticas e Vasculares, Encefalopatias Imunomediadas e Autoimunes, Encefalopatias Genéticas e Congênitas, vale uma ressalva que teremos alguns capítulos mais a frente onde elas podem voltar a ser citadas brevemente.





(Tomografia de crânio padrão para comparações com as encefalopatias)

Encefalopatias Metabólicas e Sistêmicas

. Encefalopatia Hepática: A encefalopatia hepática é um quadro relativamente comum em pacientes com perfis de falência hepática, tanto é que quadros de hepatite fulminante aguda é classificada quanto a presença de encefalopatia, o mecanismo fisiológico é fenomenal, no geral as bactérias do nosso sistema digestório tem como subproduto a amônia, que é um subproduto tóxico para o nosso corpo, porem durante a circulação porta-hepática a amônia é convertida em ureia que enfim é excretada pelos rins na urina, porem em pacientes onde os hepatócitos estão fragilizados eu perco a capacidade de transformação de amônia em ureia e começo a acumular amônia na circulação, o problema é que a amônia é toxica para o cérebro, ela tem a capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica, ao atravessar os astrócitos tentam ´´amenizar´´, eles utilizam glutamato para converter a amônia em glutamina e conseguir conte-la internamente, o problema é que a glutamina tem grande peso iônico e


atrai água para dentro dos astrócitos fazendo com que aumentem de tamanho exponencialmente, porem como os astrócitos estão responsáveis pela sustentação dos neurônios o seu enchimento rápido acaba comprimindo os corpos neurais ao redor causando inibição dos circuitos de sinalização cerebral, além disso como os astrócitos utilizam o glutamato para converter o excesso de amônia vamos ter uma queda geral do estoque de glutamato, predominando GABA, que no geral é depressor do sistema nervoso central, por isso o paciente rapidamente pode entrar em coma, além disso assim que acabar o estoque de glutamato começa a ter excesso de amônia que começa a degradar os neurônios.






. Encefalopatia Urêmica: O mecanismo fisiológico para a encefalopatia urêmica é fascinante, mostra como que mesmo um subproduto que imaginamos ser inofensivo pode ser letal, agora o nosso problema não é a falha de conversão de amônia em ureia, mas sim o acumulo de ureia por falência renal ou por algum problema que esteja impedindo a excreção de ureia pelos rins, como na diabetes por exemplo, o excesso de ureia se acumula no sangue e começa a se ´´quebrar´´ em dois compostos, o cianato e o isocianato, o maior problema

aqui é que ambos possuem a capacidade de carbamilação proteica, ou seja, eles conseguem se ligar a proteínas estruturais e iniciar um processo de carbamilação que altera aquela proteína e a deixa inutilizada, para piorar o cenário além do cianato causar danos gerais no corpo pois começa literalmente a ´´quebrar´´ vários pedaços do corpo já que ele ´´desmonta´´ as proteínas estruturais, ele tem capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica e até mesmo fragmenta-la, ao entrar dentro da cavidade cerebral ele começa a alterar as bainhas de mielina dos neurônios, causando danos neurais severos, em quadros de UTI e de pior prognóstico essa ureia em excesso no sangue além de formar cianato ela pode voltar para o sistema digestório onde as bactérias a transformam novamente em amônia e agora eu vou ter um aumento drástico e extremamente rápido de amônia no sangue ao ponto que os hepatócitos não conseguem conjuga-la com a mesma velocidade que está chegando, então agora evoluímos de uma encefalopatia urêmica para uma encefalopatia mista, esse cenário é extremo porem pode acontecer nos piores cenários.




. Encefalopatia Hipóxica Isquêmica: Esse tipo de encefalopatia é comum principalmente em recém nascidos, podemos ter em traumas, hemorragias, diabéticos, no geral qualquer paciente que ficar com falta de suprimento de oxigênio durante muito tempo para o encéfalo vai desenvolver esse encefalopatia, o mecanismo fisiológico dela é mediado principalmente por íons de cálcio, no cenário onde tenho falta de oxigênio durante muito tempo os neurônios começam a ´´sufocar´´, pela falta de oxigênio começam a fazer processos de respiração anaeróbica que causa um acidose severa local, essa acidose inibe as bombas de sódio e potássio (que já citei anteriormente o processo detalhado) e começamos a ter um influxo de íons de cálcio para dentro dos neurônios devido a acidose, o cálcio em excesso ativa caspases que iniciam processo de morte celular, apoptose, no geral esse quadro de

encefalopatia é comum em recém nascidos cujo o cordão umbilical se enrolou ao redor do pescoço e causou hipóxia, abaixo temos algumas tomografias de recém nascidos que sofreram de hipoxia, veja como começa a ter lacunas, pois são áreas que sofreram isquemia então temos morte neuronal, o mais curioso é que no recém nascido veremos áreas de calcificação, o motivo disso é que devido a grande oferta de cálcio na circulação de crianças justamente para o desenvolvimento ósseo acaba aumentando a oferta local na micro circulação, então lesões que em adultos deixariam fragmentos por todo o encéfalo, na criança veremos fragmentos de cálcio que literalmente estão ali para ´´taparem´´ o buraco formado, se fossemos fazer uma autopsia desse cérebro ao quebrarmos a camada externa de cálcio veríamos restos de neurônios mortos, micróglia e astrócitos.



. Encefalopatia Hipoglicêmica: Aqui o mecanismo é o mesmo da hipóxica isquêmica porem o problema não vai ser a falta de oxigênio mas sim a falta de glicose, que é precursora para a geração de ATP, no final o mecanismo vai resultar em inibição da bomba de sódio e potássio, influxo massivo de cálcio e processo de apoptose, porem na tomografia abaixo foi colocado um cérebro de adulto, então não teremos processos de calcificação e sim necrose liquefativa direto, por isso é possivel ver regiões ´´vazias´´, a necrose Hipoglicêmica é o motivo que pacientes ao ficarem muito tempo sem se alimentar morrem, as famosas mortes por desnutrição vem daqui, pois começa a faltar energia para todos os órgãos do indivíduo, e o principal deles é o cérebro.



. Encefalopatia por Desmielinização Osmótica: A encefalopatia mais temida em quadros de reposição por hiponatremia, vamos entender a fisiologia antes de entender essa encefalopatia, quando temos um quadro de hiponatremia, ou seja, pouco sódio na corrente sanguínea os neurônios e astrócitos se adaptam a esse meio com pouco sódio e começam a excretar os seus ´´salva vidas´´ que são basicamente íons de grande carga molecular para poder balancear o meio externo e evitar que íons de sódio vazem deles e assim eles ´´murchem´´ e fiquem na forma crenada, então aqui podemos imaginar pacientes que estão com hiponatremia de 24 – 72hrs, porem quando fazemos a reposição rápida e exacerbada de sódio acaba sendo fatal, pois agora os neurônios e astrócitos estão sem as suas ´´salva vidas´´ que são as moléculas de grande peso e até eles as produzirem novamente leva dias, então o que vai acontecer é que nos primeiros dois dias após a correção do sódio o paciente vai melhorar e ficar estável, porem depois de quatro a sete dias após a correção o paciente desaba na hora, levando a um quadro de lesão irreversível por dano celular, já que o sódio vai estar ´´invadindo´´ os neurônios e astrócitos durante todo esse tempo e além deles não conseguirem balancear o meio a agua vai acompanhar o sódio para dentro dessas células, inchando-as e após um tempo, causando lise celular.

Encefalopatias Tóxicas e Nutricionais

. Encefalopatia de Wernicke: A encefalopatia de Wernicke é associada a falta de B1, Tiamina, pois a mesma é cofator para enzimas como a piruvato desoxigenase no ciclo de Krebs, com a falta dela eu perco a capacidade de conversão de glicose em energia, então aqui o paciente já vai começar a ficar letárgico, além disso devido a falta de tiamina eu começo a ter falha mitocondrial e estresse oxidativo de áreas mais sensíveis como os corpos mamilares, tálamo e assolhado do IV ventrículo, por isso que o quadro inicial desses pacientes além da letargia é a marcha atáxica (já que falta de B1 está associada fortemente ao alcoolismo) e a falta prolongada de B1 pode evoluir para a síndrome de Korsakoff que falaremos abaixo.





Figura 1 – Ressonância magnética em corte axial, sequência FLAIR: hipersinal intenso e simétrico nos tálamos, predominando na região mesial (seta grossa) e nos estriados (setas finas).

. Encefalopatia Alcoólica Crônica (Síndrome de Korsakoff): A síndrome de Korsakoff é basicamente uma encefalopatia de Wernicke mal tratada, agora além de lesar ainda mais essas áreas (lembrando que no processo de lesão dessas áreas as mesmas ficarão inchadas, por isso na tomo elas aparecem de cor diferente e levemente aumentadas) eu estou tendo falta geral de B1 para todo o encéfalo, então agora os neurônios estão entrando em apoptose por estresse oxidativo e falta de energia, nesse quadro desenvolvemos lesões permanentes pois saímos de uma ´´leve´´ lesão inflamatória por estresse oxidativo para um dano permanente devido à falta prolongada de B1 para gerar energia, iniciando cascatas de sinalização que levam a apoptose neuronal, veja a seguir uma tomografia de Korsakoff e perceba como o cérebro já está mais ´´murcho´´ devido a apoptose neuronal, e as áreas mais sensíveis como os corpos mamilares e o tálamo estão ainda mais ´´inchadas´´.




. Encefalopatia por Metais Pesados (Chumbo / Saturnismo): O chumbo possui capacidade de mimetizar e substituir o cálcio em processos celulares nos neurônios, o perigo é devido a capacidade do chumbo de atravessar a barreira hematoencefálica e inibir canais iônicos e enzimas antioxidantes, ao inibir os canais iônicos temos falha na troca entre líquidos extra e intra celulares, essa falha leva a edema cerebral difuso, a inibição de enzimas antioxidantes ocasiona em desmielinização focal e a ação de mimetização de íons de cálcio vai ocasionar em disfunção sináptica generalizada, então aqui teremos um paciente com o cérebro ´´inchado´´ onde os neurônios não conseguem fazer uma sinalização apropriada, alguns estão entrando em apoptose pois o chumbo ao mimetizar o cálcio ativa caspases que iniciam apoptose neural e a falta de enzimas antioxidantes impede que os neurônios se protejam dos processos oxidativos advindos do estresse oxidativo que é subproduto de diversos processos metabólicos naturais do nosso corpo, no geral podemos esperar um apagamento dos sulcos cerebrais, justamente devido a esse edema e o paciente terá um raciocínio lentificado, justamente por essa falha na sinapse, então podemos esperar movimentos lentos, fala arrastada, dificuldade na fala em si, apatia, etc. Abaixo é possivel notar na quarta imagem da tomografia o apagamento dos sulcos cerebrais,



. Encefalopatia Medicamentosa (Ex: Intoxicação por Lítio): Ocorre quando fármacos atingem níveis terapêuticos tóxicos ou em superdosagens. No caso do lítio, o acúmulo celular interfere em bombas de sódio-potássio, alterando diretamente a excitabilidade neuronal deforma difusa, no geral essa encefalopatia foi mencionada apenas para nos alertarmos sobre como fármacos em excesso afetam o cérebro, no capítulo sobre acidentes farmacológicos citarei os principais fármacos que em excesso afetam o cérebro.


. Encefalopatia por Deficiência de Cobalamina (B12): A Cobalamina possui uma função extremamente importante além da síntese de DNA na medula, ela é precursora para conversão de alguns compostos, a Taurina que é utilizada para a conversão de ácidos biliares, Glutationa que é o principal agente antioxidante do nosso corpo e Sulfeto de Hidrogênio que é vasomodulador, porem a falta da mesma ocasiona (além da falta desses compostos) o acumulo de ácido metil malonil que causa desmielinização por ser extremamente tóxico para a bainha de mielina do sistema nervoso e o acumulo de homocisteína que causa no paciente quadros de aterosclerose por disfunção endotelial (então aqui já podemos pensar em evolução para possivel isquemia caso comece a desenvolver placas de aterosclerose no polígono de Willis por exemplo)

estados pró trombóticos por ativação da cascata de coagulação de maneira descontrolada (o que é extremamente perigoso já que podemos formar um trombo e ocluir o lúmen das artérias cerebrais), excitotoxicidade neural por mimetizar a ação do glutamato, aumentando o influxo de cargas positivas para dentro dos neurônios e uma dessas cargas é o cálcio que dependendo da intensidade pode ativar a via das caspases e iniciar processos de apoptose levando a morte de neurônios e fragilidade óssea por ser ligar ao colágeno e quebrar a sua estrutura proteica (o perigo da fragilidade óssea é o facil rompimento ósseo e que acaba expondo o seu conteúdo interno, podendo levar a uma embolia gordurosa sendo potencialmente fatal).



Encefalopatias Infecciosas e Transmissíveis:

. Encefalopatia Espongiforme: Essa encefalopatia é causada por príons, que são basicamente proteínas com dobramento anormal que induzem as proteínas normais do hospedeiro a mudarem de conformação, o nome popular da doença é a famosa ´´doença da vaca louca´´, uma encefalopatia que ficou famosa por acometer os bovinos e que tambem tem capacidade de afetar os seres humanos, os príons ao alterarem as proteínas normais geram um acúmulo proteico insolúvel, a famosa degeneração hialina, levando a uma perda neuronal massiva e vacuolização do tecido cerebral, que assume um aspecto microscópico de "esponja´´, por isso que na tomografia e até na dissecação de indivíduos com essa patologia podemos identificar que o cérebro está relativamente menor em comparação com o espaço interno do crânio, infelizmente é uma patologia irreversível que apenas fazemos o tratamento paliativo dos sintomas e evitamos que ela evolua.




. Encefalopatia Séptica: Teremos aqui uma disfunção cerebral difusa desencadeada pela sepse, sem que haja infecção direta (meningite ou encefalite) no sistema nervoso central, pois a cascata inflamatória sistêmica causada por citocinas como TNF-alfa e IL-1 possuem a capacidade de quebrar a integridade da barreira hematoencefálica, gerando assim uma disfunção microvascular, pois são os astrócitos ao redor dos capilares que formam a barreira, causando assim uma isquemia local, podendo alterar no balanço de neurotransmissores e causar o mesmo quadro que já vimos da encefalopatia hipóxica isquêmica, acaba que no final as duas possuem praticamente a mesma fisiologia, no quesito de falta de aporte de oxigênio.
. Encefalopatia por HIV: Ocorre nas fases avançadas da infecção pelo HIV em que não temos o tratamento adequado. O vírus consegue penetrar o parênquima cerebral logo no início da infecção através de monócitos e macrófagos, famoso "mecanismo de cavalo de Troia". Durante o processo de replicação viral crônica em macrófagos e micróglia temos a liberação de neurotoxinas virais e citocinas inflamatórias, resultando em desmielinização difusa da substância branca e atrofia subcortical caso o HIV não seja tratado e

continue a se multiplicar e produzir suas toxinas, abaixo é possivel ver como o cérebro ´´murcha´´ devido a atrofia mediada pelas neurotoxinas.



. Encefalopatia Pós-Infecciosa:

Aqui temos um distúrbio desmielinizante agudo do sistema nervoso central, de natureza imunomediada. Ocorre dias a poucas semanas após uma infecção viral/bacteriana comum ou, mais raramente, vacinação. Ocorre devido ao mecanismo de mimetismo molecular, onde a resposta imune direcionada ao patógeno ataca erroneamente as proteínas da bainha de mielina cerebral, esse quadro onde o nosso sistema imune erroneamente ataca tecido saudável é visto na febre reumática por exemplo.



Encefalopatias Traumáticas e Vasculares:

. Encefalopatia Traumática Crônica: Chamada tambem de encefalopatia do pugilista ela é uma doença neurodegenerativa progressiva desencadeada por impactos repetitivos na cabeça (mesmo concussões leves ou impactos subconcussivos frequentes em esportes de contato físico).O trauma mecânico repetido induz o estiramento axonal e ativa cascatas patológicas que levam à hiperfosforilação e ao acúmulo perivascular da proteína Tau nos sulcos corticais, a proteína Tau ´´trava´´ a saída de neurotransmissores nas sinapses, então os microtúbulos onde temos o processamento e liberação de neurotransmissores ficarão travados, por isso que nessas patologias é comum termos labilidades emocionais e até parkinsonismo, já que o sistema nervoso começa a ter dificuldade em fazer uma modulação rápida e sensível dos sinais nervosos, pois a proteína vai atuar como se fosse uma ´´cola´´ atrasando ou até mesmo impedindo a saída dos neurotransmissores.




. Encefalopatia Hipertensiva: Ocorre no contexto de uma emergência hipertensiva (elevação abrupta e grave da pressão arterial, geralmente

quando a pressão diastólica ultrapassa 120). Nesse cenário a pressão ultrapassa o limite superior da autorregulação cerebrovascular, causando vasodilatação forçada das arteríolas, hiperperfusão transmural (aumento abrupto de fluxo sanguíneo para os tecidos do corpo) e quebra da barreira hematoencefálica, resultando em edema cerebral vasogênico difuso (frequentemente com predomínio parieto-occipital, sindrome de PRES)



(Veja como eu tenho apagamento dos sulcos cerebrais devido ao edema cerebral).

. Encefalopatia por Hipoperfusão Crônica (Demência Vascular Subcortical): Aqui será o contrário, se na encefalopatia hipertensiva o problema é hiperperfusão aguda, aqui a hipoperfusão crônica será causada por doença de pequenos vasos cerebrais (microangiopatia relacionada à hipertensão e diabetes, ou processos de placas de ateromas na aterosclerose por exemplo). Há um estreitamento crônico do lúmen das artérias penetrantes profundas, levando assim à uma hipoperfusão, que ao persistir por um tempo leva a uma isquemia incompleta crônica da substância branca periventricular e dos núcleos da base, essa degeneração progressiva leva a famosa demência vascular em que falaremos mais no capítulo sobre demências, veja abaixo na tomografia os pequenos sinais de isquemia incompleta crônica:



Encefalopatias Autoimunes e Imunomediadas:

. Encefalopatia de Hashimoto (Encefalopatia Responsiva a Corticosteroides Associada à Tireoidite Autoimune): Condição neuropsiquiátrica autoimune rara, apesar do nome, não decorre do hipotireoidismo em si, mas sim de um processo inflamatório/vasculítico imunomediado cerebral associado a níveis muito elevados de anticorpos antitireoidianos (como anti-TPO ou anti-tireoglobulina). O paciente pode estar inclusive em estado eutireoidiano (hormônios tireoidianos normais) mas apresentar a encefalopatia, uma condição rara onde a causa em si ainda está sendo estudada, porem acredita-se que os anticorpos antitireoidianos tenham receptores de antígenos que se ligam nos neurônios e astrócitos e assim começa a ataca-los, veja na tomografia como o cérebro começa a ´´definhar´´ pois o sistema imune está tentando extermina-lo.





Fig 1. MRI of the brain, axial section of a patient diagnosed with Hashimoto's encephalopathy.


. Encefalite Autoimune Anti-NMDA: Nessa encefalite temos a produção de autoanticorpos específicos direcionados contra a subunidade GluN1 dos receptores NMDA de glutamato no cérebro. Isso causa a internalização e perda desses receptores na fenda sináptica, quebrando o balanço entre vias excitatórias e inibitórias, tendo um predomínio de GABA. É fortemente associada a síndromes paraneoplásicas, especialmente ao teratoma de ovário em mulheres jovens, no geral o maior perigo dessa encefalopatia é o estado pró inflamatório e o predomínio de sinalizações de cargas negativas para dentro dos neurônios.



(Imagem de um teratoma de ovário, pacientes com teratoma que apresentem rebaixamento de consciência é preciso pensar nessa encefalite, pacientes com síndromes paraneoplásicas no geral é preocupante que desenvolvam essa encefalopatia).

. Encefalopatia Paraneoplásica Límbica: Nessa encefalopatia que tambem está relacionada a síndromes paraneoplásicas teremos uma reação autoimune desencadeada por antígenos onconeuronais expressos por um tumor sistêmico oculto (frequentemente o carcinoma de pulmão de pequenas células ou tumores de células germinativas) onde o sistema imune irá atacar as estruturas do sistema límbico (hipocampo, amígdala), gerando inflamação, perda neuronal crônica e gliose focal, então a maneira para sabermos

diferenciar é que na encefalite autoimune anti-nmda o problema são os receptores de glutamato, aqui teremos ataque direto a estruturas da via límbica.



. Encefalopatia associada ao Lúpus Eritematoso Sistêmico (Neuro-LES): Teremos um envolvimento difuso do SNC no Lúpus, onde irão ocorrer mecanismos multifatoriais: vasculopatia de pequenos vasos (induzindo microinfartos), quebra imunomediada da barreira hematoencefálica por autoanticorpos e produção local de citocinas inflamatórias que causarão um edema cerebral, igual nas outras encefalopatias cerebrais podemos esperar na tomografia um apagamento dos sulcos cerebrais e pequenos microinfartos (os ´´pontos´´ brancos no cérebro).





Figura 2
RM-T2/FLAIR de crânio mostrando hiperintensidade subcortical sem impregnação em lobos parieto-occipitais antes do tratamento.

(Veja como temos regiões focais de microinfartos associado a apagamento dos sulcos neurais, abaixo colocarei uma tomografia que possui apenas microinfartos para ficar facil a diferenciação do apagamento dos sulcos)



Encefalopatias Congênitas e Genéticas:

. Encefalopatia Bilirrubínica (Kernicterus): Uma encefalopatia que ocorre em recém-nascidos com hiperbilirrubinemia severa. A bilirrubina indireta (lipossolúvel e livre) ultrapassa a barreira hematoencefálica ainda imatura e deposita-se seletivamente em estruturas do SNC, com predileção pelos núcleos da base (especialmente o globo pálido) e núcleos auditivos no tronco cerebral, causando toxicidade mitocondrial e necrose neuronal, então aqui podemos esperar que na tomografia vá aparecer regiões esbranquiçadas, pois é a mesma lógica pela qual falamos antes, no recém nascido temos uma grande oferta de cálcio pela circulação, ocasionando em calcificação dessas regiões necrosadas.




(por conta da oferta de cálcio que na tomografia podemos ver diversas regiões esbranquiçadas, principalmente nos núcleos da base, veja na ponta da seta como temos dois ´´cones´´ brancos)


Síndrome de MELAS (Encefalopatia Mitocondrial): Sigla em inglês para Mitochondrial Encephalomyopathy, Lactic Acidosis, and Stroke-like episodes, basicamente é uma desordem genética de herança materna causada por mutações no DNA mitocondrial onde irá, basicamente, afetar a cadeia de transporte de elétrons para gerar energia nos tecidos que mais demandar energia, sendo eles o cérebro e os músculos, então podemos esperar uma acidose lática, estresse oxidativo exacerbado, podemos ter casos de isquemia crônica parcial, levando a lesões na substancia branca e no geral a tomografia vai depender muito, esse tipo de paciente já tem histórico na família, se ficar durante muito tempo com falta de metabolitos podemos ver processos de necrose extensos, caso seja pouco temo veremos pequenos pontos de infartos lacunares, depende do quadro, por isso a tomografia de crânio irá varia bastante.

. Síndrome de West (Encefalopatia Epiléptica da Infância): Uma encefalopatia epiléptica grave idade-dependente que surge tipicamente no primeiro ano de vida (pico entre 4-7 meses), devido a atividade elétrica epileptiforme contínua e anômala durante o período crítico de plasticidade cerebral teremos uma


interrupção direta no desenvolvimento neurocognitivo global da criança, podendo ser idiopática ou secundária a lesões cerebrais prévias (como anóxia neonatal, que foi um dos exemplos de encefalopatia hipóxica isquêmica que já fora detalhada) no geral o perigo da Síndrome de West é que esse tipo de atividade elétrica epileptiforme contínua causa morte neuronal e para a criança que está em fase de desenvolvimento é extremamente perigoso já que pode causar sequelas para o resto da vida, porem uma coisa fascinante do cérebro é que devido à alta capacidade de neuroplasticidade nos dois primeiros anos de vida pode ser que esses pacientes não tenham sequelas pois neurônios ao redor da área afetada conseguem formar novas sinapses e literalmente ´´substituir´´ a região afetada e a pessoa seguir sem uma região do cérebro para o resto da vida sem sequelas.



(As regiões apagas são áreas que sofreram morte neuronal devido à alta atividade epileptiforme, o mecanismo por trás dessa morte é basicamente o neurônio recebendo uma onda de choque tão intensa que ele não consegue lidar com toda essa carga e literalmente sofre apoptose).



Veja que nessa tomografia a lesão já é ´´menor´´ e está sofrendo processos de calcificação, já lesões extensas tendem a não calcificar por conta da grande extensão lesão, porem lesões pequenas como essa demonstrada podem sim calcificar, ainda mais nesse periodo de vida que a sindrome de West afeta).




(Veja como temos alterações no encéfalo, devido as crises epilépticas tambem temos focos de necrose neuronal, veja tambem as alterações na substancia cinzenta e substancia branca)

Capítulo 4 | Oncologia.

Capítulo 4.1 | Medular.

Nesse capitulo iremos detalhar as 20 principais oncologias que afetam a medula, para isso precisamos entender o que é o conceito de oncologia e qual será a divisão utilizada nesse capitulo para explicar sobre esse tópico complexo, primeiramente não falaremos sobre clinica ou tratamento, o foco desse capitulo é entender a fisiopatologia por trás do câncer especifico, tratamento farmacológico deixaremos para a segunda edição do livro. O tema ´´medula´´ será dividido em duas categorias, aqueles que estão relacionado a medula óssea e aqueles que estão relacionados com a medula espinhal, dentre essas duas categorias foi separado os 10 principais canceres.


Quando falamos sobre oncologia precisamos entender o que é esse tópico tão complexo, o câncer em si nada mais é do que uma falha celular, onde a célula começa a se replicar sem controle e começa a ter predomínio de células ´´inúteis´´ que não conseguem exercer sua função corretamente e nem entrar em apoptose para dar lugar para outras células novas, saudáveis e funcionais. Falaremos agora dos canceres relacionadas a função hematológica da medula óssea.



O princípio central aqui é a quebra da homeostase da hematopoese, onde clones celulares sofrem mutações que bloqueiam sua diferenciação, impedem sua apoptose ou geram superprodução autônoma o que acaba resultando na ocupação física do espaço medular e na supressão das linhagens saudáveis,

dentre essa categoria temos:


. Leucemia Mieloide Aguda (LMA): Teremos aqui uma falha genética em uma célula progenitora mieloide precoce. Essa falha causa um bloqueio de maturação na fase de blasto, que no geral é a fase prematura das células, simultaneamente, ocorrem mutações que conferem vantagem proliferativa, então teremos uma ativação enorme dessa via porem com células prematuras que ainda não tem capacidade de cumprir suas funções, na teoria até que não parece tão perigoso já que estamos aumentando ainda mais a função hematopoiética da medula, o problema é que esses clones de fase inicial das células da via mieloide, ou seja dos blastos, perde a sua capacidade de se diferenciar em hemácia e plaquetas, mas se multiplica de forma descontrolada. O acúmulo físico desses blastos volumosos no estroma medular consome os nutrientes locais, já que o clone fica fixo na fase que mais consome nutrientes, que seria basicamente a ´´infância´´ das células e promove o esmagamento físico e a apoptose das células-tronco saudáveis vizinhas, então aqui podemos esperar que o paciente tenha uma queda absurda no nivel de plaquetas e hemácias, diminuindo a oferta de oxigênio geral do corpo e diminuindo a capacidade de coagulação, um quadro extremamente perigoso, veja abaixo as células oriundas da linhagem mieloide:




. Leucemia Linfoide Aguda (LLA): Análoga à LMA, mas o alvo é o progenitor linfoide, então aqui a lógica é a mesma, teremos multiplicação clonal

descontrolada mediante a alterações genéticas que além de criar células indiferenciadas linfoides tambem irão desregular fatores de transcrição essenciais para a maturação dos linfócitos. Os linfoblastos resultantes acumulam-se progressivamente e à medida que a pressão intramedular aumenta pela massa tumoral, essas células rompem as barreiras sinusoidais da medula óssea, chegando à circulação sistêmica e infiltrando tecidos distantes com afinidade por células linfoides, no geral essa infiltração não é nem tão problemática já que acabam sendo disfuncionais, o maior problema é o mesmo que o LMA, esmagamento de células vizinhas promovendo a apoptose.

. Mieloma Múltiplo: Agora o evento central ocorre no linfócito B terminalmente diferenciado: o plasmócito, um linfócito T CD4+ ativado. Uma alteração pós-centro germinativa que gera um clone de plasmócitos ´´imortais´´ no estroma medular. Esses plasmócitos secretam uma única imunoglobulina intacta ou cadeia leve defeituosa em massa (Proteína M), o problema aqui é a ocupação local e função inútil. Além disso, os plasmócitos tumorais expressam um ligante que se liga aos osteoclastos, ativando-os agressivamente e essa ativação descontrolada que é o problema, pois agora estamos com um meio em que a reabsorção óssea mediada pelos osteoclastos está descontrolada, levando a um aumento de cálcio no meio extracelular, esse cálcio em excesso na circulação (hipercalcemia) é tóxico para o nosso corpo, ele possui capacidade de se ligar a órgão e iniciar processos de calcificações ou iniciar processos de apoptose descontrolados, a ativação descontrolada dos osteoclastos tambem causarão fragilidade óssea.




. Leucemia Mieloide Crônica (LMC): O gatilho agora é a translocação recíproca t(9;22), que funde o gene BCR ao gene ABL1, formando o Cromossomo Philadelphia. Esse gene híbrido codifica uma proteína que possui capacidade de enviar um sinal mitogênico contínuo e intracelular para o núcleo da célula-mãe da linhagem mieloide, simulando a presença constante de fatores de crescimento. Diferente das leucemias agudas, não há bloqueio de maturação; as células se diferenciam normalmente, resultando em uma superprodução massiva de toda a linhagem granulocítica funcional (linhagem dos bastonetes no geral), então diferente da LMA, na LMC nos exames podemos esperar um aumento, ao invés de queda na contagem de células granulocíticas advindas da linhagem dos bastonetes, tais como neutrófilos, basófilos, eosinófilos e monócitos, veja como na lamina abaixo eu tenho um aumento massivo dessa linhagem.



. Leucemia Linfocítica Crônica (LLC): O mecanismo dela é o mesmo que o da LLA, onde caracteriza-se pela falha nos mecanismos de morte celular programada dos linfócitos maduros, onde o acumulo de linfócitos B gerais que sofreram mutações que os tornaram metabolicamente ´´inúteis´´, mas virtualmente imortais, porem eles não se multiplicam rapidamente; em vez disso, acumulam-se progressivamente durante anos por incapacidade de morrer e esse acúmulo passivo satura o espaço da medula óssea e dos tecidos linfoides ao longo de anos, ou seja, a crônica possui basicamente a mesma fisiologia que a aguda, porem a principal diferença é que aqui a


multiplicação é um pouco mais lenta do que a aguda, por isso o paciente se mantem assintomático durante bastante tempo e temos diferenciação, porem mesmo que nos exames o paciente tenha uma alta de linfócitos, por serem inúteis ele está imunologicamente comprometido.



. Policitemia Vera (PV): Uma mutação que altera a região inibidora da enzima Janus Quinase 2 em um progenitor hematopoiético multipotente, o que isso quer dizer, quer dizer que esta mutação torna a via de sinalização intracelular intracitoplasmática permanentemente ligada, independentemente de estímulos externos, o que consequentemente faz com que os receptores celulares de eritropoetina (EPO) atuem como se estivessem constantemente saturados, promovendo uma proliferação autônoma, massiva e descontrolada exclusivamente de precursores da linhagem eritroide (glóbulos vermelhos), então aqui iremos esperar um paciente que tenha um aumento da quantidade de hemácias no sangue, tornando-o mais viscoso e na maioria dos casos veremos alterações cutâneas devido ao aumento de sangue:




. Trombocitemia Essencial (TE): Semelhante à Policitemia Vera, envolve mutações clonais somáticas nos genes JAK2 porem aqui o defeito molecular irá mimetizar uma estimulação contínua do receptor de trombopoetina onde esse estimulo contínuo irá ativar uma cascata de sinalização intracelular que vai causar uma hiperplasia e a hipersegmentação dos megacariócitos na medula óssea, já que são eles os precursores para as plaquetas, o nome em si é autoexplicativo, trombocitemia está relacionado a uma alteração genética onde tenho uma ativação incessante dos megacariócitos para que liberem mais plaquetas no sangue, no geral não é uma patologia extremamente preocupante já que está relacionada apenas as plaquetas, mas obviamente o paciente ficará com um perfil de trombofilia e estará predisposto a formar pequenos trombos.



(Nos piores dos casos podemos ter uma oclusão mediante a esse estado pró


trombótico)

. Mielofibrose Primária: Teremos uma proliferação clonal de megacariócitos, igual na trombocitemia essencial porem tambem teremos granulócitos anômalos (também mediada por mutações como JAK2), o ponto crítico dessa patologia é que esses megacariócitos tumorais sofrem morte intramedular prematura, então enquanto na trombocitemia primaria o problema era uma superativação desses megacariócitos aumentando exacerbadamente a quantidade de plaquetas, aqui eles nem sequer são ativados para liberarem as plaquetas, eles já sofrem apoptose intramedular e liberam grandes quantidades de citocinas profibróticas no estroma da medula, principalmente o Fator de Crescimento Transformador Beta (TGFb) e o Fator de Crescimento Derivado de Plaquetas (PDGF), essas citocinas estimulam os fibroblastos não clonais (saudáveis) da medula a secretarem colágeno excessivamente, ocasionando com que o parênquima hematopoiético da medula óssea seja gradualmente substituído por uma rede densa de fibrose reticulínica e colágena, destruindo o nicho onde o sangue é fabricado.



. Síndrome Mielodisplásica (SMD): Resulta de danos genéticos acumulados (mutações epigenéticas ou de splicing de RNA) em uma célula-tronco hematopoiética onde o clone resultante apresenta um defeito intrínseco de maturação: as células se dividem, mas sua arquitetura molecular e morfológica é aberrante (displasia). Esse defeito estrutural ativa os mecanismos internos de controle de qualidade celular, disparando uma taxa

altíssima de apoptose intramedular precoce. Assim as células morrem dentro da própria medula antes de completarem o ciclo de maturação (hematopoese ineficaz), veja no esquema abaixo as principais células que são afetadas na sindrome mielodisplásica:




. Linfoma de Hodgkin (Infiltração Medular Secundária): De todas as patologias citadas até agora essa é a única onde o problema não se origina na medula óssea e é advinda do último estágio de uma patologia, aqui o tumor tem origem nos linfonodos periféricos, onde um linfócito B do centro germinativo sofre mutações que evitam a apoptose e alteram sua morfologia, transformando-se na célula de **Reed-Sternberg**. Na progressão da doença (Estágio IV), essas células adquirem a capacidade de quebrar a matriz extracelular via metaloproteinases e expressam receptores de quimiocinas que se ligam ao estroma da medula óssea. Ao conseguirem colonizar o tecido medular, elas secretam interleucinas (como IL-5 e IL-6) que recrutam uma intensa reação inflamatória reativa local, inibindo fisicamente a produção da medula, já que agora estamos em um meio inflamado repleto de células de Reed-Sternberg que impedem o funcionamento saudável da medula, no caso esse impedimento, para ficar facil de imaginar, imagine uma fábrica que foi invadida por assaltantes, nesse estágio todos os funcionários param de trabalhar e se rendem, logo após isso a polícia (sistema inflamatório) invade o local para tentar combater os assaltantes, nesse meio caótico é impossível que os trabalhadores voltem as suas funções na fábrica.



Falaremos agora sobre os canceres que acometem a Medula Espinhal, saímos dos ossos e focaremos na coluna e sistema nervoso propriamente dito, princípio central dessas patologias baseiam-se na neuroanatomia mecânica e vascular, pois como o canal vertebral é uma estrutura rígida e óssea inextensível, qualquer crescimento de massa (seja por infiltração celular direta ou por compressão extrínseca) resulta no aumento da pressão local, gerando esmagamento axonal, interrupção de sinapses e isquemia capilar por colapso do fluxo microvascular.


. Ependimoma Intramedular: Como o próprio nome já revela ele se origina das células ependimárias que revestem o canal central da medula espinhal, esse tumor se desenvolve no centro do cordão medular e cresce de forma expansiva e concêntrica (de dentro para fora). Esse crescimento empurra e estira progressivamente as vias longas adjacentes: primeiro as fibras que cruzam a comissura anterior (vias espinotalâmicas de dor e temperatura) e, posteriormente, os tratos motores corticoespinhais localizados na periferia, então inicialmente o paciente irá apresentar perda de sensibilidade e nos piores quadros ele irá começar a ter perda de motricidade

---




(O fato de afetar inicialmente a comissura anterior e posteriormente os tratos motores é simplesmente por proximidade, já que na anatomia os tratos espinotalâmicos cruzam próximos ao centro medular, enquanto os motores se localizam nas periferias)

. Astrocitoma Intramedular: São a segunda neoplasia de medula espinhal mais comum, a primeira são os ependimomas intramedulares, se formos classificar seriam 60% dos casos ependimomas, 30% astrocitomas e 10% se divide entre os que serão citados a seguir, esse tumor acomete os astrócitos do parênquima medular. Diferente do ependimoma, seu padrão de crescimento é infiltrativo e difuso onde as células tumorais invadem o interstício entre os neurônios e os axônios, mimetizando a matriz normal. A fisiopatologia envolve a destruição direta da integridade axonal por invasão tumoral, destruição da barreira hemato-medular local (gerando edema vasogênico intrínseco) e alteração na recaptação de neurotransmissores como o glutamato, gaba, entre outros, promovendo excitotoxicidade neuronal local na medula, porem caso esse tumor se prolifere pode sim chegar a acometer o sistema nervoso central, porem são casos raros, no geral o intramedular raramente acomete o cérebro, porém é possivel sim que o astrocitoma se origine diretamente no encéfalo e falaremos sobre ele no capítulo mais à frente.




(Veja conforme vai chegando próximo a T2 que é o local do tumor a região intramedular vai ficando esbranquiçada devido ao contrates para localizar o tumor)


. Metástase Epidural com Compressão Medular Aguda: Teremos aqui células tumorais de uma neoplasia sólida sistêmica chegando ao corpo vertebral por via hematogênica (plexo venoso vertebral) onde o tumor corrói a trabécula óssea da vértebra e se expande em direção ao canal vertebral através do espaço epidural anterior. À medida que a massa cresce, ela exerce uma força mecânica extrínseca direta contra o cordão medular onde o ponto crítico ocorre quando a pressão da massa ultrapassa a pressão de perfusão das veias epidurais e das artérias espinhais anteriores, gerando uma isquemia medular aguda por hipóxia tecidual e infarto secundário do tecido nervoso.



. Schwannoma Espinhal: Tumor originado das células de Schwann que envolvem as raízes nervosas (geralmente a raiz dorsal/sensitiva) no ponto em que elas emergem da medula espinhal, dentro do espaço intradural extramedular. O tumor cresce como uma massa nodular bem delimitada e excêntrica, fisiopatologicamente, ele promove o estiramento crônico das fibras nervosas da própria raiz de onde nasceu e, conforme ganha volume, passa a empurrar e deslocar lateralmente o cordão medular vizinho, deformando a sua anatomia e comprimindo os tratos ipsilaterais.



(Dissecação de um Schawnnoma pós-mortem)



. Meningioma Espinhal: Seguindo a lógica das outras patologias origina-se das células capsulares aracnoideas que se fixam na dura-máter que reveste o canal espinhal. É uma massa histologicamente benigna de crescimento lento, localizada no espaço intradural extramedular. O mecanismo de lesão é puramente mecânico por compressão lenta, extrínseca e focal do parênquima medular. Devido à extrema lentidão do crescimento, a medula espinhal sofre uma adaptação plástica inicial, mas eventualmente ocorre isquemia crônica local pela compressão persistente da microcirculação pial superficial, no geral esse paciente que irá procurar atendimento especializado será após anos de desenvolvimento desse tumor, veja abaixo um quadro mais avançado onde o meningioma cresce tanto a ponto de desviar o canal medular:




. Hemangioblastoma Medular: Diferente dos outros que afetam diretamente as células relacionadas a glia, aqui será um tumor vascular benigno composto por uma rede densa de capilares fenestrados delgados misturados com células estromais vacuoladas. A fisiopatologia baseia-se em dois fatores: a alta permeabilidade desses capilares tumorais, que transudam plasma continuamente para o parênquima medular, gerando grandes cistos composto por fluidos e o efeito de "roubo vascular", onde o fluxo sanguíneo é desviado para o tumor, privando o tecido nervoso adjacente de perfusão adequada levando, em quadros mais avançados a isquemia e necrose do tecido nervoso, veja abaixo como temos uma região focal com ´´roubo vascular´´:




. Ependimoma Mixopapilar: Variante específica de ependimoma que se desenvolve a partir de restos celulares ependimárias localizados no filo terminal (a fita de tecido conjuntivo e glia que ancora o final da medula ao sacro). O tumor se desenvolve abaixo do cone medular, em meio às raízes nervosas da cauda equina onde a sua matriz produz grande quantidade de material mucinoso intercelular. O crescimento dessa massa mucinosa promove o aprisionamento, compressão mecânica e estiramento direto das raízes motoras e sensitivas lombossacras que flutuam no líquor naquela região. Conforme a evolução do tumor o paciente começará a sentir que a coluna está ´´travada´´ e terá dificuldade para inclinar a coluna, nos piores casos o paciente pode desenvolver déficit motor e sensitivo dos membros inferiores, veja abaixo um ependimoma mixopapilar dissecado e como ele é visto no paciente:






. Cordoma da Coluna Vertebral: Um tumor maligno que surge de remanescentes da notocorda, a estrutura embrionária que orienta a formação da coluna, por ser uma estrutura que orienta a formação da coluna ele irá se desenvolver nos ossos da coluna (com predileção pelo sacro já que é a última estrutura a ser formada da coluna) e exibe um comportamento localmente destrutivo e invasivo. O tumor secreta enzimas proteolíticas que digerem a matriz óssea mineralizada, destruindo as vértebras e estendendo-se localmente para dentro do canal vertebral onde o dano neural ocorre por essa invasão tumoral direta e destruição das raízes nervosas sacrais e do filamento terminal, um tumor raro mas extremamente perigoso pois mesmo que tenha predileção pelo sacro pode afetar qualquer outra região da coluna.




. Plasmocitoma Solitário Ósseo Vertebral: Aqui voltamos a falar do Mieloma Múltiplo que já foi citado, porem agora para sabermos que ele tambem afeta a medula, então o mecanismo de ação será o mesmo, uma proliferação neoplásica localizada e única de plasmócitos clonais restrita à medula óssea de uma única vértebra onde esses plasmócitos induzem a diferenciação de osteoclastos via citocinas, provocando uma lesão lítica (reabsorção acelerada do osso) na vértebra afetada. E agora que acontece o pior, diferente de um Mieloma Múltiplo que afete uma falange distal por exemplo, a medula está em constate pressão, então a perda da integridade estrutural óssea ocasiona em fratura patológica por compressão (o colapso do corpo vertebral), projetando mecanicamente fragmentos ósseos e o próprio tecido tumoral para dentro do canal espinhal.



. Neurofibroma Espinhal, tambem chamado apenas de neurofibromatose: Um tumor benigno composto por uma mistura heterogênea de células de Schwann, fibroblastos, células perineurais e axônios dispersos em uma matriz rica em colágeno, originando-se ao longo de uma raiz espinhal. Ele cresce de forma difusa envolvendo toda a espessura do nervo e conforme cresce seguindo o trajeto de menor resistência anatômica, ele se expande através do forame de conjugação, assumindo o clássico formato em ampulheta onde a porção interna comprime extrinsecamente a medula na região intradural e a porção externa ocorre a infiltração dos os tecidos paravertebrais, no geral esse tipo de câncer mesmo que seja benigno cursa com escoliose, veja abaixo a famosa ampulheta e como na ampulheta estão passando axônios e por isso a remoção cirurgia não é recomendada já que a chance de lesão neural e déficit subsequente é grande.



(Sinal em ampulheta da neurofibromatose 1)




Capítulo 4.2 | Tronco Cerebral.


Falaremos nesse capítulo sobre as diferentes neoplasias que afetam o tronco cerebral, serão 15 ao todo divididas em Neoplasias Intrínsecas, ou seja, aquelas que afetam diretamente o tronco cerebral e as Neoplasias Extrínsecas que afetam indiretamente o tronco cerebral ao afetar estruturas próximas.

Neoplasias Intrínsecas:

. Glioma Difuso de Linha Média: A neoplasia infiltrativa intrínseca mais agressiva do tronco (com predileção pela ponte) onde as células gliais anômalas migram e infiltram o espaço ao redor dos axônios ao longo de toda a substância branca e cinzenta pontina. O tumor preserva a macroarquitetura inicial, mas rompe a bainha de mielina e desorganiza microscopicamente as sinapses do trato corticoespinhal (via motora) e os núcleos dos nervos abducente (VI) e facial (VII), então podemos esperar que o paciente apresente déficit motor puro, incapacidade de movimentação ocular lateralizada (abdução ocular) e apresente uma paralisia facial central, com perda da mimica facial, porem conforme esse glioma for avançando por se infiltrar na região da ponte podemos esperar tambem uma lesão nos núcleos da ponte, sendo eles o núcleo do N. Abducente, N. Trigêmeo, N. Facial, N. Vestíbulo-Coclear e Complexo Olivar Superior, lembrando que esses núcleos já foram explicados no capítulo 1 sobre neurofisiologia e neuroanatomia, abaixo temos um exemplo, veja como temos um desvio da linha média na ponte, por isso essa neoplasia é chamada de desvio da linha média.




. Astrocitoma Pilocítico do Tronco Cerebral: O tumor glial benigno (Grau I) mais comum da região, seu crescimento é focal, circunscrito e expansivo (frequentemente no mesencéfalo ou bulbo). Ele atua como uma massa mecânica que empurra, compacta e estira as vias axonais adjacentes para a periferia, sem invadir ou digerir o parênquima nervoso na fase inicial, abaixo veremos um grau extremamente avançado, veja como ele se expande abruptamente:




. Metástase Parenquimatosa Intrínseca: É o tumor de tronco mais comum em adultos onde células neoplásicas sistêmicas (pulmão, mama, melanoma)

embolizam pela via arterial para os microvasos do tronco e ocorre a proliferação clonal que quebra localmente a barreira hematoencefálica e dispara a liberação de citocinas inflamatórias, gerando um edema vasogênico peritumoral massivo, esse acúmulo de fluido sob alta pressão no interstício esmaga os feixes nervosos e núcleos vizinhos, sendo então, igual os outros, uma espécie de tumor que o dano em si é por esmagamento e não a liberação de neurotoxinas.




. Linfoma Primário do Sistema Nervoso Central: Neoplasia de células B com alto angiotropismo (afinidade por vasos) onde as células tumorais se aglomeram em formato de manguito/anel ao redor das artérias perfurantes do tronco (como as artérias pontinas e paramedianas). Esse sufocamento perivascular obstrui o fluxo local e impede a difusão gasosa, gerando focos de microinfartos crônicos, isquemia e necrose no parênquima cerebral ao redor.




. Ganglioglioma do Tronco Cerebral: Uma neoplasia mista de baixo grau composta por células gliais neoplásicas, no geral seu crescimento é extremamente lento e indolor, com predileção pelo bulbo ou transição cervicomedular, a sua fisiopatologia envolve a remodelação arquitetônica local crônica e deformação plástica dos tratos ascendentes/descendentes por compressão intrínseca de baixa intensidade, o paciente com essa neoplasia muitas vezes não sabe que a possui, começa a perceber no dia a dia alterações motoras e sensitivas simples apenas quando o tumor já evoluiu, pois no começo temos processos de neuro remodelamento como uma forma de adaptação que consegue mascarar esses sintomas, no geral veremos na tomografia um desvio estrutural do bulbo, igual vimos no glioma de difuso de linha média.

. Tumor Teratóide Rabdoide Atípico: Um tumor embrionário maligno de crescimento devastador na infância, caracterizado pela perda do gene supressor (INI1). Ele possui capacidade de destruição física do parênquima do tronco por invasão celular direta rápida, exaustão metabólica local (isquemia por consumo) e indução de extensas áreas de necrose tecidual e edema inflamatório intratável.



. Ependimoma do IV Ventrículo: Esse tumor nasce nas células ependimárias do assoalho ou teto do IV ventrículo onde seu crescimento da massa gera um duplo efeito mecânico-hidrodinâmico, onde ao bloquear fisicamente o escoamento do líquor em direção aos forames de Luschka e Magendie temos um processo de hidrocefalia crônica compressiva e tambem temos uma pressão compressiva extrínseca direta contra a fossa romboide, esmagando de trás para frente os núcleos dos nervos cranianos e as vias de associação ali localizados, no geral o maior perigo desse tumor é a hidrocefalia, porem a pressão compressiva tambem vai causar déficits motores e sensitivos.





. Meduloblastoma: O tumor embrionário maligno mais comum em crianças e adolescente, ele possui origem cerebelar e devido à sua alta capacidade de proliferação, a massa rompe o espaço ventricular e invade o tegmento posterior da ponte e do bulbo por serem as estruturas mais próximas. Além do dano infiltrativo local, suas células descamam facilmente para o espaço subaracnóideo, gerando implantes piais que mimetizam uma aracnoidite tumoral crônica e assim o tumor consegue se espalhar para a coluna espinhal levando a sintomas como dores nas costas, incontinência urinaria e dificuldade para andar.



. Germinoma Pineal: Localizado dorsalmente ao mesencéfalo temos uma massa que se expande para baixo e para frente, exercendo compressão extrínseca direta sobre a placa tetal (teto do mesencéfalo). Esse esmagamento mecânico interrompe as vias das fibras dos colículos superiores (centros do olhar conjugado vertical) e colapsa o aqueduto cerebral de Sylvius por compressão externa, o detalhe sobre a região tetal, colículos superiores e inferiores foram todos detalhados no capítulo sobre o mesencéfalo.




. Subependimoma do IV Ventrículo: Uma neoplasia ependimária benigna e nodular que cresce fixada ao assoalho ventricular onde sua ação é puramente de obstrução mecânica intermitente ou contínua à hidrodinâmica liquórica já que nódulo atua como uma válvula que eleva a pressão intracraniana conforme se desenvolve, sem infiltrar ou causar destruição biológica primária nas células do tronco cerebral.



Neoplasias Extrínsecas:

. Schwannoma Vestibular (Neuroma do Acústico): O tumor extrínseco mais comum a afetar o tronco no adulto, origina-se no trajeto do VIII par craniano (vestíbulo-coclear) ao expandir-se no ângulo pontocerebelar, ele exerce uma força compressiva crônica lateral contra a ponte, esse esmagamento progressivo de fora para dentro distorce a anatomia pial, desloca o tronco


contra a incisura tentorial e colapsa a microcirculação superficial lateral da ponte, já vimos sobre o Schwannoma porem vimos ele afetando a coluna, agora estamos vendo como ele possui capacidade de afetar o tronco cerebral.




. Meningioma do Clivo / Forame Magno: Nasce na dura-máter aderida às estruturas ósseas anteriores (clivo). Ele se expande para trás, promovendo um esmagamento mecânico direto da face anterior da ponte e do bulbo. Fisiopatologicamente, comprime a base da ponte (onde passam as vias piramidais motoras) contra o IV ventrículo e aprisiona/estira as artérias perfurantes do sistema basilar e vertebral, levando a isquemia e necrose local por lesão vascular.





. Cordoma do Clivos: Mesma região (clivo) porem agora é um tumor ósseo maligno derivado de remanescentes da notocorda e diferente do meningioma do clivo onde tenho apenas obstrução, esse tumor possui a capacidade de destruição a matriz mineralizada do clivo via enzimas proteolíticas, rompendo a cortical óssea e a duramáter posterior, invadindo o espaço intradural assim causando compressão extrínseca destrutiva anterior de toda a transição pontobulbar, frequentemente englobando, deslocando e aprisionando a artéria basilar dentro da massa tumoral.






. Carcinomatose Leptomeníngea (Infiltração Cisternal): Nesse tumor temos a disseminação difusa de células tumorais metastáticas líquidas (leucemias/linfomas) ou sólidas no espaço subaracnoide, formando um "manto" tumoral que envelopa o tronco cerebral, a fisiopatologia ocorre pelo aprisionamento e estrangulamento mecânico das raízes de saída de todos os nervos cranianos e pela infiltração celular ao longo dos espaços perivasculares de Virchow-Robin, o espaço de Virchow nada mais é do que um pequeno espaço que acompanha os vasos conforme adentram as regiões mais profundas do cérebro que é repleto por líquido, a infiltração ao longo desses espaços gera microinfartos corticais por sufocamento vascular superficial.





. Paraganglioma (Tumor Glômico Jugular com Extensão Intracraniana): Um tumor neuroendócrino hipervascular que nasce no forame jugular destruindo o osso temporal e invadindo a fossa posterior lateralmente, sua massa volumosa exerce compressão extrínseca lateral destrutiva diretamente contra


o bulbo (medula oblonga) e a transição pontobulbar, além de estirar e esmagar fisicamente os nervos cranianos (IX, X e XI) no seu ponto de emergência do tronco, já que esses nervos cranianos passam no forame jugular.




Capítulo 4.3 | Encéfalo.

Finalizaremos agora falando sobre as principais oncologias que afetam o encéfalo, ao terminarmos esse capítulo teremos abordado as 50 oncologias que mais afetam o sistema nervoso, uma quantidade excelente, agora falaremos sobre as 15 principais neoplasias do encéfalo:

. Glioblastoma Multiforme (GBM): É o tumor cerebral primário maligno mais comum e agressivo em adultos (Grau IV da OMS, que por sinal é o último estágio do astrocitoma que vimos no capítulo anterior, porem agora estamos vendo na perspectiva do encéfalo). Caracteriza-se por uma proliferação astrocitária caótica, com áreas de necrose induzidas por hipóxia e intensa proliferação endotelial/vascular anômala (neovascularização neoplásica). As células tumorais expressam metaloproteinases que destroem a matriz extracelular, permitindo que elas infiltrem microscopicamente a substância branca profunda ao longo dos tratos axonais, cruzando frequentemente o corpo caloso em direção ao outro hemisfério. Os novos vasos formados são bizarros e carecem de junções oclusivas sadias, gerando uma quebra severa da barreira hemato encefálica e um edema vasogênico massivo ao redor da massa.




. Astrocitoma Difuso (IDH-mutado / Baixo grau): Uma neoplasia glial infiltrativa de crescimento lento (Grau II, lembrando que o glioblastoma é o Grau IV dessa patologia), cuja base molecular envolve quase sempre a mutação, que promove modificações epigenéticas aberrantes. As células tumorais infiltram silenciosamente o córtex e a substância branca subcortical, mimetizando a glia normal, inicialmente, a BHE permanece intacta (sem edema visível), mas a infiltração celular altera a recaptação astrocitária de glutamato na fenda sináptica, gerando um estado local de hiperexcitabilidade e excitotoxicidade neuronal (gatilho molecular para crises epilépticas).




. Oligodendroglioma: Tumor derivado de precursores de oligodendrócitos, possui predileção pelo córtex e substância branca dos lobos frontais especificamente, conseguindo infiltrar o parênquima cerebral envolvendo os corpos neuronais (fenômeno de satelitose perineuronal) exibindo


microscopicamente uma rede de capilares delicados em "fio de galinheiro" que, embora propensos a micro hemorragias focais e calcificações intratumorais, mantêm uma taxa de infiltração mais delimitada e progressiva quando comparados aos astrocitomas puros.




. Metástases Cerebrais de Tumores Sólidos: É a neoplasia intracraniana mais comum no adulto (vinda de câncer de pulmão, mama, rim, cólon ou melanoma). Células tumorais desprendem-se do sítio primário, viajam pela circulação arterial e colonizam a junção entre a substância cinzenta e a substância branca, onde os microvasos sofrem estreitamento abrupto e as células tumorais ficam presas. Elas quebram as junções de oclusão do endotélio cerebral e invadem o interstício onde a proliferação desse nódulo metastático dispara uma resposta inflamatória local violenta com liberação massiva de VEGF. Isso resulta em uma falência catastrófica da BHE, gerando o clássico quadro de um pequeno nódulo tumoral esférico cercado por uma massa gigante de edema vasogênico digitiforme.



. Meningioma Convexo / Parassagital: Origina-se das células capsulares aracnóideas da membrana aracnoide (frequentemente associado à perda do gene supressor NF2). É um tumor benigno (Grau I) de crescimento lento, localizado no espaço subdural extracelular. Sua fisiopatologia baseia-se estritamente na compressão extrínseca focal e lenta do córtex cerebral onde devido à extrema lentidão do crescimento, os hemisférios cerebrais sofrem uma acomodação mecânica plástica notável, no entanto, quando o tumor ultrapassa a capacidade de complacência local, ele colapsa as veias corticais superficiais e piais, gerando isquemia crônica local, edema no parênquima subjacente e erosão ou hiperostose (espessamento) do osso craniano vizinho, um fator positivo é que ele é o mais facil de ser acessado e removido cirurgicamente.



. Papiloma do Plexo Coroide: Uma neoplasia neuroepitelial benigna intraventricular que nasce diretamente das células epiteliais do plexo coroide (comum nos ventrículos laterais em crianças). Sua fisiopatologia é puramente hidrodinâmica e baseia-se em dois eixos: o tumor hiperproduz ativamente líquido cefalorraquidiano (LCR) em taxas que superam em até quatro vezes a capacidade de reabsorção das granulações aracnóideas, e a própria massa vegetante bloqueia fisicamente os forames interventriculares (forames de Monro). O resultado molecular e físico é uma hidrocefalia comunicante ou obstrutiva severa por superpopulação hídrica intracraniana.



. Linfoma Primário do Sistema Nervoso Central (LPSNC): Neoplasia maligna de células B grandes que ocorre de forma restrita ao eixo cranioespinhal (altamente ligada à infecção pelo vírus Epstein-Barr em pacientes imunocomprometidos). Exibe um comportamento biológico estrito de angiotropismo/infiltração perivascular onde as células linfomatosas migram e se organizam em camadas concêntricas (manguitos) ao redor do espaço de Virchow-Robin das artérias cerebrais profundas, acometendo a substância branca periventricular e os núcleos da base. Esse acúmulo celular denso estrangula a microcirculação local, bloqueando o aporte de oxigênio e glicose, gerando extensas áreas de desmielinização e necrose tecidual isquêmica secundária, estou falando sobre essa patologia novamente pois ela afeta tanto o tronco quanto o encéfalo, porem agora falando um pouco mais sobre ela e correlacionando com o vírus Epstein-Barr (dito por leigos como a ´´doença do beijo´´)






Figura 4. Paciente do sexo feminino, 32 anos, HIV positivo. RM axial T1 pré-contraste (**A**) evidencia lesão parietotemporal direita, com componentes de hipersinal (hemorrágicos). **B,C:** Axial e coronal T1 após contraste demonstram impregnação periférica pelo contraste e moderado edema vasogênico perilesional. O componente central hipocaptante corresponde à necrose.


. Tumores Neuroepiteliais Embrionários do Encéfalo: Categoria que engloba tumores malignos altamente agressivos da infância compostos por células azuis, pequenas e redondas, indiferenciadas, de origem neuroectodérmica. Crescem nos hemisférios cerebrais de forma explosiva e a sua fisiopatologia envolve uma altíssima taxa mitótica que consome os recursos energéticos locais (glicose e oxigênio) em velocidade geométrica, induzindo focos extensos de necrose por exaustão metabólica, hemorragia intratumoral por fragilidade capilar e destruição mecânica invasiva direta dos circuitos neuronais corticais.
. Adenoma Hipofisário (Macroadenoma): Neoplasia benigna que nasce nas células epiteliais da adeno-hipófise dentro da sela túrcica. Quando ultrapassa 10 mm (macroadenoma), o tumor rompe o diafragma da sela e expande-se verticalmente para o espaço supraselar, a fisiopatologia central é a compressão mecânica extrínseca direta sobre o Quiasma Óptico, localizado imediatamente acima da glândula. A força compressiva esmaga especificamente as fibras nervosas que cruzam pelo centro do quiasma (vindas da retina nasal de ambos os olhos), bloqueando a condução dos potenciais de ação visuais periféricos levando ao sintoma clássico de cegueira.




. Craniofaringioma: Tumor epitelial benigno mas localmente agressivo (Grau I) que se desenvolve a partir de remanescentes celulares da Bolsa de Rathke na região supraselar/infundibular. Caracteriza-se por uma morfologia mista: onde temos nódulos sólidos e grandes cistos preenchidos por um fluido denso, rico em cristais de colesterol. A fisiopatologia combina o efeito de massa compressivo contra o hipotálamo, a haste hipofisária e o quiasma óptico, associado a um componente inflamatório químico severo se o conteúdo do cisto vazar, gerando aracnoidite química crônica nas cisternas da base.




. Pineocitoma vs. Pineoblastoma: Tumores que nascem no parênquima da glândula pineal. O pineocitoma é a versão ´´básica´´ (Grau I), pelo seu crescimento ser lento, já o pineoblastoma é um tumor embrionário (Grau IV) altamente agressivo, fisiopatologicamente, a expansão dessa massa na linha média posterior exerce uma força compressiva anterior contra o teto do mesencéfalo (placa tectal). Isso esmaga os colículos superiores (bloqueando as vias do olhar conjugado vertical) e colapsa mecanicamente o Aqueduto de Sylvius, impedindo a passagem do LCR do III para o IV ventrículo, resultando em hidrocefalia obstrutiva aguda.




. Astrocitoma Subependimário de Células Gigantes: Tumor astrocitário benigno (Grau I) que cresce na parede dos ventrículos laterais, quase exclusivamente em pacientes com Esclerose Tuberosa (devido a mutações nos genes). O tumor se desenvolve próximo ao Forame de Monro e a sua fisiopatologia é estritamente de obstrução mecânica luminal: conforme o nódulo cresce, ele atua como uma rolha física que bloqueia a drenagem do LCR de um ou de ambos os ventrículos laterais para o III ventrículo, desencadeando hidrocefalia assimétrica hipertensiva.




. Tumor Neuroepitelial Disembrioplásico (DNET): Lesão neuroglial benigna (Grau I), de origem predominantemente devido à má formação, localizada quase sempre na substância cinzenta cortical do lobo temporal. Caracteriza-se por uma arquitetura em colunas específicas preenchidas por um "balde" de muco (matriz mixoide) contendo neurônios flutuantes. Sua fisiopatologia não envolve efeito de massa ou edema, mas sim uma remodelação epileptogênica focal crônica: a presença crônica da lesão altera os circuitos elétricos corticais locais e a modulação gabaérgica, transformando o córtex temporal vizinho em um foco gerador permanente de descargas elétricas síncronas anômalas que impedem que a córtex envie os sinais motores, nesse quadro eu tenho um caos de sinalização aleatória que impede a passagem da sinalização específica do córtex.




. Xantoastrocitoma Pleomórfico: Tumor astrocitário de baixo grau (Grau II ou III) com predileção pelo lobo temporal ou parietal, acometendo o córtex de forma superficial e as meninges sobrejacentes. Apresenta-se tipicamente como um grande cisto com um nódulo mural impregnante que possui células tumorais cheias de lipídios (vacuolizadas) que infiltram a pia-máter, o dano ocorre pela compressão cortical focal direta e pelo desenvolvimento de uma intensa reação astrocítica reativa ao redor, o que altera os limiares de despolarização neuronal locais.



. Cordoma do Clivo (Extensão Supratentorial): Embora já tenhamos falado sobre ele afetando a ponte, quando sua expansão é superior e anterior, o tumor destrói o dorso da sela túrcica e invade o espaço supratentorial encefálico onde ele secreta proteases que digerem a matriz óssea mineralizada e avança mecanicamente empurrando as estruturas da base do cérebro. A fisiopatologia envolve o aprisionamento, deslocamento e estrangulamento extrínseco do Polígono de Willis (artérias carótidas internas e cerebrais anteriores) e a compressão direta do lobo frontal basal e estruturas hipotalâmicas, no momento em que ocorre o estrangulamento é necessário a intervenção cirúrgica imediata pois o tempo do paciente é curto, já que irá evoluir para um quadro de isquemia e necrose gigantesca.






(Imagem de um cordoma do Clivus, pre e pós remoção cirúrgica)

Capítulo 5 | Anemias.

Nesse capítulo seremos mais técnicos pois não tem muitas imagens para detalhar, ao abordarmos sobre anemias vou aproveitar para já detalhar a importância das vitaminas, falaremos primeiros sobre a ação de cada vitamina e após detalhar a função de cada uma especificamente falaremos sobre as anemias que podem ser desenvolvidas/adquiridas e possuem capacidade de afetar o sistema nervoso central.

. Vitamina B1 (Tiamina) – Podemos falar que é o combustível geral do sistema nervoso central, a tiamina é convertida em pirofosfato de tiamina (TDP), um cofator obrigatório para três complexos enzimáticos mitocôndriais cruciais: a **piruvato desidrogenase** (que insere o piruvato no ciclo de Krebs), a alfa-cetoglutarato desidrogenase e a transcetolase (via das pentoses-fosfato).Cascata Fisiopatológica da Deficiência: Sem B1, as células com altíssima demanda metabólica (neurônios e cardiomiócitos) perdem a capacidade de produzir ATP por fosforilação oxidativa. O acúmulo de piruvato e lactato gera acidose tecidual local. No cérebro, ocorre uma falência das bombas de sódio potássio ATPase, levando a edema citotóxico, influxo massivo de cálcio e morte neuronal por excitotoxicidade. No geral a falta de B1 cursa com a Encefalopatia de Wernicke que já falamos sobre o mecanismo, falaremos agora a clínica, se trata de uma lesão simétrica e necrose por estresse oxidativo nos corpos mamilares e assoalho do IV ventrículo, manifestando a tríade clássica de ataxia, confusão mental e oftalmoplegia.




. Vitamina B3 (Niacina / Ácido Nicotínico): Precursora direta das coenzimas NAD+ e NADH+, que funcionam como os principais transportadores de elétrons em reações de catabolismo (glicólise, oxidação de ácidos graxos) e principalmente em processos de burst oxidativo, que é quando o macrófago utiliza muita energia para fagocitar e ´´destruir´´ um agente invasor. Além

disso, o NAD+ é consumido pela enzima PARP para o reparo contínuo de quebras no DNA, por isso que podemos falar sobre a B3 ser responsável pelo controle cancerígeno, já que ela promove um reparo do DNA, porem a carência crônica paralisa a respiração celular profunda, tecidos com altíssima taxa de renovação celular (pele e trato gastrointestinal) sofrem apoptose em massa por incapacidade de divisão e reparo de DNA enquanto no sistema nervoso, a falta de ATP gera disfunção sináptica cortical difusa. Manifestações Clínicas (Doença dos 3 Ds):Dermatite: Lesões hiperqueratósicas e simétricas em áreas expostas ao sol (colar de Casal) geradas pela incapacidade de reparo ao dano actínico induzido por UV. Diarreia: Atrofia severa das vilosidades absortivas intestinais por falha na descamação/renovação celular epitelial. Demência: Encefalopatia subaguda com perda neuronal cortical progressiva, insônia e quadros psicóticos.



. Vitamina B6 (Piridoxina) – A Linha de Montagem de Neurotransmissores. Sua forma convertida de atuação é o fosfato de piridoxal (PLP), cofator essencial para transaminações, descarboxilações e racemizações de aminoácidos. É o cofator obrigatório da L-aminoácido aromático descarboxilase (**sintetiza Dopamina e Serotonina**) e da glutamato descarboxilase (**que converte o glutamato excitatório no neurotransmissor inibitório GABA**). A falta de B6 faz com que a taxa de conversão de glutamato em GABA despenque drasticamente no córtex cerebral, o cérebro perde seu principal freio inibitório químico, resultando em um estado crônico de hiperexcitabilidade de membrana, que se manifesta clinicamente através de crises epilépticas refratárias (especialmente em neonatos). Adicionalmente, ocorre acúmulo de **homocisteína** sérica por bloqueio da via de **transulfuração para cisteín**a, por sinal falamos sobre os problemas da homocisteína no capítulo sobre encefalopatias, na sessão de encefalopatias por deficiência de B12
.Vitamina B9 (Ácido Fólico) e Vitamina B12 (Cobalamina): Ambas atuam em

sintonia fina na síntese de DNA (timidina) e na metilação de proteínas estruturais do cérebro. Diferença Fisiopatológica: B9 (Folato) atua diretamente na transferência de carbonos para bases purínicas e pirimidínicas. Sua falta gera interrupção da mitose (causando **anemia megaloblástica** e defeitos no **tubo neural,** por isso a importância de suplementação com Folato durante a gravidez). A B12 atua na integridade lipídica da mielina; sua falta acumula o Ácido Metilmalônico (ou metilmalonil), que deforma a bainha de mielina e causa a degeneração combinada subaguda da medula, mais detalhes sobre a lesão causada mediante a falta de B12 voltar ao capítulo sobre encefalopatias. . Vitamina C (Ácido Ascórbico) – A Hidroxilação do Colágeno: Funciona como um agente redutor (doador de elétrons) cuja sua função mais nobre é manter o íon ferro em seu estado reduzido dentro das enzimas prolil e lisil hidroxilases. Estas enzimas modificam os resíduos de prolina e lisina na cadeia de pro-colágeno, permitindo o entrelaçamento e a estabilização mecânica da tripla hélice de colágeno estável. Cascata Fisiopatológica da Deficiência (Escorbuto): Sem hidroxilação, as cadeias de colágeno produzidas pelos fibroblastos são termolábeis e desmoronam estruturalmente. A matriz extracelular do tecido conjuntivo perde sua resistência mecânica. O endotélio capilar e as membranas basais vasculares tornam-se extremamente frágeis e propensos a roturas espontâneas sob pressão hidrostática normal, gerando hemorragias perifoliculares (petéquias) sangramento gengival maciço e falha na cicatrização de feridas por incapacidade de deposição fibrilar.



. Vitamina A (Retinol) – Fototransdução e Diferenciação Epitelial: Possui dois

destinos moleculares. No sistema visual, converte-se em cis-retinal, que se liga à opsina para formar a rodopsina nos bastonetes. Nos tecidos periféricos, converte-se em ácido retinóico, que se liga a receptores nucleares (RAR e RXR) atuando como um fator de transcrição genômica para a diferenciação de células epiteliais. Cascata Fisiopatológica da Deficiência: No Olho: A falta de cis-retinal impede a ativação da transducina sob baixos níveis de luz, bloqueando o potencial de ação hiperpolarizante do nervo óptico, gerando a cegueira noturna. No Epitélio: Sem o sinal do ácido retinoico, o epitélio colunar secretor de muco do trato respiratório, ocular e gastrointestinal sofre **metaplasia escamosa queratinizante**. O epitélio torna-se seco, espessado e perde os cílios e o muco protetor. Nos olhos, isso causa xerofalmia e manchas de Bitot; nas vias aéreas, elimina a depuração mucociliar, disparando infecções bacterianas massivas.

 (Manchas de Bitot)

. Vitamina D (Calcitriol) – O Hormônio Regulador do Cálcio: A vitamina D3 (colecalciferol), após hidroxilação hepática (25-hidroxilase) e renal (1-alfa-hidroxilase), torna-se o hormônio ativo Calcitriol. O calcitriol viaja até o núcleo das células intestinais (enterócitos) e estimula a transcrição gênica de proteínas de transporte de cálcio, como a calbindina. Cascata Fisiopatológica da Deficiência: Sem calcitriol, a absorção intestinal de cálcio despenca. A queda no cálcio ionizado sérico dispara a secreção crônica de Hormônio Paratireoidiano (PTH) pelas paratireoides. O PTH atua ativando osteoclastos para reabsorver a matriz óssea e secretar fosfato na urina para tentar normalizar o cálcio do sangue. Manifestações Clínicas: Raquitismo (Crianças): Falha crônica na mineralização do osteoide nas placas de crescimento epifisárias, resultando em ossos moles que se curvam sob o peso do corpo e alargamento das junções costocondrais (rosário raquítico). Osteomalácia (Adultos): Remodelação óssea defeituosa, onde a matriz de colágeno nova não consegue ser mineralizada com cristais de hidroxiapatita, gerando dor óssea difusa e extrema fragilidade a fraturas.




. Vitamina E (Alfa-Tocoferol) – O Escudo Antioxidante de Membrana: É o segundo antioxidante mais potente do organismo, ficando atrás apenas da Glutationa que é subproduto da B12. Ele se aloja fisicamente no interior hidrofóbico das bicamadas lipídicas das membranas celulares, com foco especial na mielina e nas membranas dos eritrócitos, interceptando e neutralizando espécies reativas de oxigênio (radicais livres) antes que destruam os ácidos graxos poli-insaturados da membrana (peroxidação lipídica). Cascata Fisiopatológica da Deficiência: Sem vitamina E, o estresse oxidativo basal promove uma peroxidação lipídica em cadeia nas membranas das células com alta exposição ao oxigênio ou atividade elétrica. Consequências pela falta: Hemólise, causando rompimento da membrana dos glóbulos vermelhos por fragilidade oxidativa (anemia hemolítica). Ataxia Espinocerebelar, devido a destruição progressiva por estresse oxidativo dos axônios de grande calibre dos cordões posteriores da medula e dos tratos espinocerebelares, mimetizando neurologicamente o padrão de sintomas da ataxia de Friedreich e da deficiência de B12, mas com preservação dos níveis de AMM e homocisteína.


. Vitamina K (Filoquinona / Menaquinona) – A Ativação da Hemostasia: Atua como um cofator obrigatório para a enzima microssomal gama-glutamil carboxilase. Esta enzima adiciona um grupo carboxila (COOH) aos resíduos de ácido glutâmico situados na extremidade N-terminal dos fatores de coagulação II (Protrombina), VII, IX e X, além das proteínas anticoagulantes C e S. A introdução desse grupo carboxila confere uma carga negativa líquida a essas proteínas, essa carga negativa permite que os fatores de coagulação se liguem quimicamente aos íons de Cálcio e, através do cálcio, fixem-se aos fosfolipídios de membrana das plaquetas ativadas no sítio da lesão vascular, montando os complexos tenase e protrombinase, por isso falamos que a vitamina K é pro coagulante, já que ela estimula essa fixação dos fatore de coagulação as plaquetas. Cascata Fisiopatológica da Deficiência: Sem vitamina K, os fatores II, VII, IX e X são sintetizados pelo fígado de forma incompleta (conhecidos como PIVKA - proteínas induzidas pela ausência de vitamina K). Essas proteínas não carboxiladas circulam no plasma, mas são biologicamente inertes por serem incapazes de se ligar ao cálcio e às

plaquetas. Ocorre um colapso completo nas vias intrínseca, extrínseca e comum da cascata de coagulação, resultando em diátese hemorrágica severa, manifestada por prolongamento marcante do Tempo de Protrombina (TP/RNI), sangramentos espontâneos e, criticamente, a Doença Hemorrágica do Recém-Nascido (por baixa transferência placentária e ausência de microbiota colonizadora produtora de K no cólon).

Agora que detalhamos sobre todas as vitaminas falaremos das principais anemias que possuem capacidade de afetar o sistema nervoso central.


. Anemia Perniciosa / Deficiência de Vitamina B12 (Cobalamina): A ausência de B12 paralisa duas vias enzimáticas vitais nos neurônios e na glia. Primeiro, inibe a metionina sintase, impedindo a conversão de homocisteína em metionina, essencial para a metilação da proteína básica da mielina. Segundo, bloqueia a metilmalonil-CoA mutase, acumulando ácido metilmalônico (AMM). O AMM acumulado força a síntese de ácidos graxos anômalos que se incorporam à bainha de mielina, tornando-a frágil. O resultado é a Degeneração Combinada Subaguda, caracterizada pela desmielinização e destruição axonal progressiva dos funículos posteriores (via da propriocepção/vibração) e cordões laterais (trato corticospinal motor) da medula espinhal, além de neuropatia periférica e demência megaloblástica.





. Anemia por Deficiência de Folato (Vitamina B9): O folato é o cofator essencial para a síntese de purinas e pirimidinas (DNA). No sistema nervoso adulto, sua deficiência severa mimetiza a neurotoxicidade da B12 por interromper o ciclo de metilação (via 5-metiltetrahidrofolato), elevando os níveis de homocisteína. A hiperhomocisteinemia induz estresse oxidativo endotelial direto e ativa receptores NMDA de glutamato nos neurônios, gerando excitotoxicidade, disfunção cognitiva ("psicose do folato") e polineuropatia axonal simétrica. Vale uma ressalva na embriogênese já que a falha de fechamento do tubo neural ocorre porque a escassez de folato impede a rápida divisão celular necessária no neuroectoderma.


. Anemia Falciforme (Doença HbSS): Sob condições de hipóxia, desidratação ou acidose, a hemoglobina mutante (HbS) polimeriza-se, distorcendo o eritrócito no formato de foice. Essas células perdem a maleabilidade e expressam moléculas de adesão que grudam no endotélio dos microvasos cerebrais. Esse processo de vaso-oclusão ativa uma cascata inflamatória e pró-trombótica na circulação cerebral, colapsando o fluxo sanguíneo local. Fisiopatologicamente, isso desencadeia Acidentes Vasculares Cerebrais (AVCs) isquêmicos e hemorrágicos repetidos, além de infartos silenciosos na substância branca profunda e crises de dor excruciante por isquemia periosteal/óssea no crânio e coluna.




. Talassemia Maior (Beta-Talassemia): A ausência severa de cadeias beta da hemoglobina gera uma eritropoiese ineficaz e hemólise maciça. Para tentar compensar a anemia crônica extrema, o corpo dispara níveis massivos de eritropoietina, estimulando uma hiperplasia eritroide expansiva na medula óssea de ossos planos. No crânio e na coluna vertebral, essa expansão óssea destrói a camada cortical e invade o canal medular. Fisiopatologicamente, o dano neurológico ocorre por síndromes de compressão medular extrínseca crônica, onde o próprio osso hiperplásico e focos de hematopoiese extramedular epidural esmagam mecanicamente a medula espinhal, gerando paraparesia e déficits sensitivos.



. Anemia Ferropriva Severa (Deficiência de Ferro): O ferro não serve apenas para carregar oxigênio na hemoglobina; ele é um cofator obrigatório para enzimas mitocôndriais da cadeia transportadora de elétrons (citocromos) e para a tirosina hidroxilase (enzima limitante na **síntese de dopamina**). Na deficiência de ferro severa e crônica, mesmo antes da queda drástica da hemoglobina, ocorre uma disfunção metabólica nos núcleos da base (estriado). A depleção de ferro altera a densidade de **receptores D2 de dopamina**, o que desregula as vias motoras e sensitivas subcorticais. É essa disfunção dopaminérgica central que dispara a fisiopatologia da Síndrome das Pernas Inquietas e alterações cognitivo-comportamentais: alotriofagia (vontade irresistível de comer coisas que não são comestíveis e que ele sabe que não deveria comer) e déficit de atenção.



. Anemia da Doença Crônica / Inflamatória: Citocinas inflamatórias sistêmicas (como IL-6, IL-1 e TNF-alfa) estimulam o fígado a produzir hepcidina, um hormônio que degrada a ferroportina (bloqueando a absorção e o aprisionamento do ferro nos macrófagos). Esse estado inflamatório persistente quebra a homeostase do ferro cerebral. Paralelamente, essas mesmas citocinas cruzam a barreira hematoencefálica e ativam a microglia. A microglia ativada passa a consumir o oxigênio local já escasso pela anemia para produzir espécies reativas de nitrogênio e oxigênio. O resultado fisiopatológico é a encefalopatia inflamatória subclínica, manifestada clinicamente como fadiga central extrema (fadiga relacionada à anemia) e lentificação do processamento cognitivo.



(Representação fisiológica da ação da Hepcidina em diferentes células)


Capítulo 6 | Venenos/Acidentes.

Capítulo 6.1 | Animais.

Falaremos durante todo o capítulo 6 sobre venenos no geral, ao falarmos sobre venenos de animais vamos perceber que a maioria possui o mesmo tratamento, soro AntiOfídico, então por qual motivo eu resolvi escrever esse capítulo se a conduta é a mesma para a maioria? Pois eu acredito que entender sobre a fisiopatologia de diversas doenças ajuda a desenvolver um raciocínio clinico e uma visão do corpo como um todo de uma maneira fenomenal, o que é essencial para fechar diagnósticos extremamente complexos no futuro.


. Crotalus durissus (**cascavel**): O colapso da vesícula pré-sináptica.

A crotoxina, principal componente do **veneno crotálico**, é uma neurotoxina pré-sináptica formada pela associação de uma **fosfolipase A2** (crotoxina B) com uma proteína **chaperona** (crotapotina). Ao se ligar à membrana do terminal axonal na junção neuromuscular, ela hidrolisa os fosfolipídios de membrana, desestabilizando-a e promovendo um influxo descontrolado de cálcio para dentro do terminal. Numa primeira fase, esse excesso de cálcio provoca liberação maciça de acetilcolina, por isso alguns pacientes relatam fasciculações discretas nas primeiras horas. Mas essa fase é enganosa: o mesmo processo leva à depleção irreversível das vesículas sinápticas e à degeneração estrutural do terminal nervoso. Diferente de um bloqueio farmacológico reversível, aqui há destruição anatômica, a recuperação depende de brotamento axonal (axonal sprouting), um processo que leva dias a semanas, e não de anticolinesterásicos. Clinicamente, isso se traduz na fácies miastênica: ptose palpebral bilateral, oftalmoplegia, diplopia e, nos casos graves, insuficiência respiratória por acometimento da musculatura intercostal e diafragmática. Some-se a isso a ação miotóxica direta da crotoxina sobre a fibra muscular esquelética, responsável por rabdomiólise, mioglobinúria e risco de lesão renal aguda, um lembrete de que o mesmo veneno pode agredir o nervo e o músculo por vias distintas e simultâneas.




. Micrurus spp. (**corais verdadeiras**) Dois mecanismos, uma falência respiratória.

O **veneno elapídico** ensina uma lição de farmacologia de receptor que vale a pena carregar para a vida clínica: existem bloqueios competitivos e bloqueios estruturais, e eles respondem de forma completamente diferente ao tratamento. As toxinas de Micrurus atuam por dois mecanismos concomitantes. Primeiro, α-neurotoxinas pós-sinápticas competem diretamente com a **acetilcolina** pelo **receptor nicotínico** da placa motora, de forma análoga ao curare, um bloqueio competitivo, teoricamente reversível pelo aumento da concentração de acetilcolina na fenda sináptica. Segundo, **fosfolipases A2** pré-sinápticas replicam o mecanismo já descrito para a crotoxina, promovendo dano estrutural irreversível ao terminal nervoso. Essa dualidade explica por que a neostigmina (anticolinesterásico) pode oferecer algum benefício parcial e transitório no acidente elapídico — algo que não ocorre no acidente crotálico. Clinicamente, chama atenção a rapidez de progressão: em poucas horas, o paciente evolui de ptose discreta para disfagia, sialorreia e paralisia flácida ascendente, culminando em insuficiência respiratória. Como o veneno elapídico é pouco proteolítico, a dor e o edema local costumam ser mínimos, um paciente com quadro sistêmico grave e sinais locais discretos deve sempre levantar a suspeita de acidente elapídico.



. Tityus spp. (**escorpiões**) A tempestade autonômica pelo canal de sódio. Enquanto os venenos ofídicos que vimos atuam por bloqueio (destrutivo ou competitivo), o veneno escorpiônico trabalha pelo mecanismo oposto: hiperexcitação. As toxinas de Tityus são peptídeos de baixo peso molecular que se ligam ao canal de sódio voltagem-dependente e retardam sua inativação. Na prática, isso significa que o canal permanece aberto por mais tempo do que deveria, prolongando a despolarização da membrana e gerando disparos repetitivos do potencial de ação. O resultado é uma liberação descontrolada de neurotransmissores em todo o sistema nervoso autônomo simpático, parassimpático e medula adrenal simultaneamente. É esse "tudo ao mesmo tempo" que explica o quadro clínico aparentemente contraditório do escorpionismo grave: sinais colinérgicos (sudorese profusa, sialorreia, bradicardia, vômitos) coexistindo com sinais adrenérgicos (taquicardia, hipertensão, agitação). Nas crianças, a descarga catecolaminérgica maciça sobre o miocárdio pode gerar toxicidade miocárdica direta, evoluindo para edema agudo de pulmão e choque cardiogênico não por falência estrutural da bomba cardíaca, mas por toxicidade catecolaminérgica sobre um coração ainda saudável. Esse detalhe muda a lógica terapêutica: o suporte hemodinâmico visa conter o excesso de estímulo adrenérgico, não compensar uma bomba doente.




(Edema agudo de pulmão no Raio-X)

. Phoneutria nigriventer (**armadeira**) Dor, autonomia e um desfecho inesperado.

O mecanismo é primo próximo do escorpiônico: as toxinas PhTx atrasam a inativação de canais de sódio e modulam canais de cálcio, gerando despolarização repetitiva de fibras autonômicas e sensoriais. A diferença está na intensidade da resposta nociceptiva local, a **ativação maciça de nociceptores** explica a dor imediata e desproporcional ao aspecto da lesão, um dos achados mais característicos do acidente por Phoneutria. Sistemicamente, o quadro autonômico se sobrepõe ao do escorpionismo: sudorese, sialorreia, taquicardia, hipertensão, podendo evoluir para choque em crianças pequenas. Mas há um achado que costuma ser cobrado exatamente por parecer bizarro à primeira vista: o priapismo. Ele decorre da liberação de óxido nítrico induzida pela toxina no tecido cavernoso, promovendo vasodilatação local e ereção dolorosa e prolongada. É um dos raros exemplos de toxina animal atuando

sobre a via do NO-GMPc, a mesma via farmacológica explorada pelos inibidores da fosfodiesterase-5 no tratamento da disfunção erétil, só que aqui de forma descontrolada e patológica.




. Latrodectus spp. (viúva-negra) O esgotamento vesicular pela força bruta. Presente também no Brasil, embora menos lembrada que as anteriores, a viúva-negra produz a **alfa-latrotoxina**, uma toxina com mecanismo singular: ela forma poros na membrana pré-sináptica e, através deles, permite um influxo massivo e sustentado de cálcio para dentro do terminal nervoso, independente da presença de canais de cálcio voltagem-dependentes, já que a própria toxina cria a via de entrada. O resultado é uma exocitose maciça e contínua de acetilcolina na junção neuromuscular, seguida de depleção vesicular completa. Clinicamente, isso se manifesta como contraturas musculares dolorosas e generalizadas (o quadro clássico é dor abdominal em tábua, que pode simular abdome agudo cirúrgico), rigidez muscular, sudorese e hipertensão por ativação simpática concomitante, **a alfa-latrotoxina** não poupa terminações autonômicas. É um ótimo contraponto didático à crotoxina: ambas destroem a capacidade de reserva vesicular do terminal pré-sináptico, mas uma o faz por degradação enzimática de membrana (**fosfolipase A2**) e a outra por **formação física de poro**.

. Tetrodotoxina (baiacu) O bloqueio puro do canal de sódio.


Aqui muda completamente a lógica que vínhamos construindo. Se Tityus e Phoneutria mantêm o canal de sódio aberto por mais tempo (hiperexcitação), a tetrodotoxina faz o oposto: ela se liga com altíssima afinidade à porção

externa do canal de sódio voltagem-dependente (sítio 1) e o bloqueia fisicamente, impedindo a entrada de sódio e, portanto, impedindo a geração e a propagação do potencial de ação. É uma neurotoxina de bloqueio puro, sem componente de liberação de neurotransmissor. Ingerida por contaminação alimentar (o baiacu ainda é consumido em algumas regiões do litoral brasileiro, apesar do risco bem documentado), a tetrodotoxina causa um quadro de progressão previsível e didática: primeiro parestesias periorais e de extremidades, depois paralisia flácida ascendente simétrica, e por fim insuficiência respiratória por paralisia da musculatura respiratória, tudo isso com o paciente mantendo a consciência preservada até fases avançadas, já que a toxina não atravessa a barreira hematoencefálica de forma significativa. Não existe antídoto específico; o tratamento é inteiramente suportivo, geralmente com ventilação mecânica até que o bloqueio se resolva espontaneamente.



. Saxitoxina (intoxicação paralítica por moluscos) O mesmo alvo, outra origem. Vale colocar a saxitoxina lado a lado com a tetrodotoxina justamente porque ambas convergem para o mesmo sítio de ligação no canal de sódio, apesar de terem origens biológicas completamente diferentes: a saxitoxina é produzida por dinoflagelados (as famosas "marés vermelhas") e se acumula em moluscos filtradores, mexilhões, ostras, mariscos, que, quando ingeridos por humanos, transferem a toxina já concentrada. O mecanismo fisiopatológico é essencialmente idêntico ao da tetrodotoxina: bloqueio do canal de sódio voltagem-dependente, impedindo a despolarização neuronal. A síndrome resultante, chamada de intoxicação paralítica por moluscos, também cursa com parestesia perioral progressiva, ataxia e paralisia flácida ascendente,


podendo matar por parada respiratória em poucas horas se não houver suporte ventilatório. Pedagogicamente, esse par tetrodotoxina/saxitoxina é valioso porque mostra que a fisiopatologia de bloqueio de canal iônico não depende da origem filogenética da toxina, peixe ou dinoflagelado, mas sim da estrutura molecular que se encaixa no mesmo sítio do canal.



. Cnidários (água-viva e caravela-portuguesa) O poro que não escolhe o alvo. Fechando nosso capítulo com um mecanismo mais "bruto" e menos seletivo, os nematocistos de cnidários como a caravela-portuguesa (Physalia physalis) injetam um coquetel de toxinas formadoras de poro, que se inserem diretamente na membrana celular de qualquer tecido excitável com o qual entrem em contato (nervoso, muscular e cardíaco). Esses poros permitem influxo descontrolado de cálcio e sódio, gerando despolarização espontânea e repetitiva. O resultado clínico é uma combinação de dor local intensa e imediata (por despolarização direta de fibras nociceptivas), podendo evoluir, em envenenamentos maciços, para arritmias cardíacas e comprometimento neuromuscular sistêmico. A diferença conceitual em relação a todos os venenos anteriores é a falta de seletividade molecular: enquanto a crotoxina "escolhe" a membrana pré-sináptica e a tetrodotoxina "escolhe" o canal de sódio, as toxinas de cnidários simplesmente perfuram qualquer membrana excitável que encontrem pela frente, um mecanismo mais primitivo do ponto de vista evolutivo, mas ainda assim capaz de gerar toxicidade sistêmica grave.

Se você organizar esses oito venenos por mecanismo, em vez de por espécie, surge uma lógica muito mais útil para o raciocínio clínico do que qualquer lista decorada: Destruição estrutural pré-sináptica, crotoxina **(fosfolipase A2)** e **alfa-latrotoxina** (formação de poro) destroem a capacidade de reserva vesicular do terminal nervoso, cada uma por um caminho molecular diferente,

mas com o mesmo desfecho: falência de liberação de acetilcolina. Bloqueio competitivo pós-sináptico, as **α-neurotoxinas elapídicas** competem pelo receptor nicotínico, um mecanismo parcialmente reversível por anticolinesterásicos. Hiperexcitação por retardo de inativação do canal de sódio: **Tityus e Phoneutria** mantêm o canal aberto, gerando disparo autonômico descontrolado. Bloqueio puro do canal de sódio, **tetrodotoxina e saxitoxina** fecham o canal, impedindo qualquer despolarização, gerando paralisia flácida com consciência preservada. Perfuração inespecífica de membrana, os cnidários lesam qualquer tecido excitável ao alcance, sem discriminação molecular. Essa classificação por mecanismo, mais do que por taxonomia do animal, é o tipo de raciocínio que separa quem decorou o soro de quem realmente entende por que aquele soro funciona e é exatamente esse tipo de estrutura mental que vai te ajudar quando, no futuro, você estiver diante de uma intoxicação por fármaco, e não por veneno animal, mas com uma fisiopatologia de canal iônico igualmente reconhecível.




Capítulo 6.2 | Farmacológicos.

Falaremos agora sobre os principais medicamentos que podem causar lesões neurológicas devido à altas doses, serão discutidos apenas 15 medicamentos nessa primeira edição.

. Lítio: mimetismo iônico e disfunção do Purkinje cerebelar.

O lítio tem janela terapêutica estreita e seu mecanismo de neurotoxicidade é elegante: ele tem raio iônico parecido ao do sódio e do potássio, então em concentrações altas consegue atravessar canais de Na^+ voltagem-

dependentes e interferir na bomba Na^+/K^+-ATPase, alterando o potencial de repouso de membrana de neurônios especialmente sensíveis como as células de Purkinje do cerebelo. Além disso, o lítio inibe a enzima inositol-monofosfatase, depletando o inositol livre necessário para a sinalização via fosfatidilinositol, o que compromete a neurotransmissão em várias vias. Clinicamente isso explica por que a intoxicação lítica tem uma progressão tão característica: tremor fino → ataxia e disartria (cerebelo) → confusão → em casos graves, convulsões e coma. Um detalhe importante: diferente de outros fármacos, a neurotoxicidade lítica pode deixar sequela permanente (a chamada SILENT — Syndrome of Irreversible Lithium-Effectuated Neurotoxicity), justamente porque há dano estrutural às células de Purkinje, não só disfunção transitória.



. Fenitoína: saturação do canal de sódio e disfunção cerebelo-vestibular.
A fenitoína terapêutica bloqueia canais de Na^+ voltagem-dependentes de forma uso-dependente (por isso é boa anticonvulsivante). Em superdose, esse bloqueio deixa de ser seletivo para neurônios hiperexcitados e passa a comprometer a condução em circuitos normais, principalmente no cerebelo que é particularmente rico em canais de Na^+ e sensível a flutuações de excitabilidade. O resultado é nistagmo (geralmente o primeiro sinal), ataxia,


disartria e, em concentrações muito altas, rebaixamento do nível de consciência. Interessante notar que a cinética da fenitoína é não linear (saturação enzimática do CYP2C9), então pequenos aumentos de dose podem gerar elevações desproporcionais dos níveis séricos, é por isso que a toxicidade por fenitoína costuma ser mais previsível pelo nível sérico do que pela dose administrada.



. Isoniazida: depleção de piridoxina(B6) e falência da síntese de GABA.
Este é um dos mecanismos mais bonitos de entender, porque conecta bioquímica de vitamina com neurotransmissão diretamente. A isoniazida se liga estruturalmente à piridoxina (vitamina B6) e à piridoxal-fosfato, inativando-as e também inibindo a enzima piridoxina-quinase, o resultado final é uma depleção funcional de B6 ativa. Como a piridoxal-fosfato é cofator essencial da glutamato-descarboxilase (GAD), enzima que converte glutamato (excitatório) em GABA (inibitório), a intoxicação por isoniazida gera uma queda abrupta da produção de GABA cerebral. Menos inibição = hiperexcitabilidade cortical descontrolada = convulsões refratárias a benzodiazepínicos convencionais (que dependem de receptor GABA-A funcional, mas o problema aqui é a falta do próprio neurotransmissor). É exatamente por essa lógica fisiopatológica que o antídoto é a piridoxina em altas doses — repor o substrato que está sendo consumido, e não apenas tentar potencializar um sistema GABAérgico que está sem "combustível".

. Antidepressivos tricíclicos: bloqueio de canal de sódio cardíaco e cerebral combinado.
Os tricíclicos (amitriptilina, imipramina) têm três mecanismos tóxicos que se somam, o que os torna particularmente perigosos em superdose. Primeiro, bloqueiam canais de Na^+ rápidos no miocárdio e no SNC (por isso QRS


alargado no ECG e convulsões andam juntos). Segundo, têm efeito anticolinérgico central intenso (bloqueio muscarínico), gerando delirium, agitação e hipertermia. Terceiro, bloqueiam receptores histamínicos H1 e alfa-1 adrenérgicos, contribuindo para rebaixamento do nível de consciência e hipotensão. A convulsão nesse contexto não é por hiperexcitação glutamatérgica pura como na isoniazida, mas sim por instabilidade de membrana secundária ao bloqueio de canal de sódio, o que explica por que bicarbonato de sódio (que desloca o equilíbrio do fármaco e melhora a condução cardíaca) é parte do tratamento tanto para a arritmia quanto, indiretamente, para estabilizar o quadro neurológico.



. Opioides: depressão respiratória e encefalopatia hipóxico-isquêmica secundária.

Aqui o dano neurológico não é por toxicidade direta de neurônio, mas por um mecanismo indireto que vale a pena destacar: os opioides agonizam

receptores muscarínicos no tronco encefálico (núcleo do trato solitário e complexo pré-Bötzinger), suprimindo a resposta ventilatória ao CO_2. A hipoventilação progressiva leva a hipóxia e hipercapnia, e se prolongada o suficiente, causa encefalopatia hipóxico-isquêmica, dano neuronal por privação de oxigênio, com predileção por áreas de alta demanda metabólica (hipocampo, globo pálido, córtex). Esse é o motivo pelo qual a **naloxona** precisa ser administrada rapidamente: ela não protege contra o dano hipóxico já instalado, apenas reverte a causa (depressão respiratória) antes que o dano ocorra ou progrida.




(Encefalopatia Hipóxica-Isquemica)

. Salicilatos (AAS): desacoplamento mitocondrial e edema cerebral.
O ácido acetilsalicílico em dose tóxica desacopla a fosforilação oxidativa mitocondrial, o gradiente de prótons que deveria gerar ATP via ATP-sintase é dissipado como calor, forçando o metabolismo celular a acelerar (daí a hipertermia e a hiperventilação compensatória, que gera alcalose respiratória inicial). Com o tempo, a demanda metabólica ultrapassa a oferta energética, levando a acidose metabólica progressiva com ânion-gap aumentado (acúmulo de lactato e cetoácidos). O cérebro é extremamente sensível a esse desacoplamento energético por sua altíssima demanda de ATP, o resultado é **edema cerebral citotóxico**, convulsões e coma, tipicamente em intoxicações graves com salicilemia muito elevada.


 (Edema Cerebral)

. Metanol: metabólito tóxico com tropismo pelo nervo óptico e núcleos da base. O metanol em si é relativamente inócuo; o problema é seu metabolismo pela álcool desidrogenase, que o converte em formaldeído e depois, pela aldeído desidrogenase, em ácido fórmico. **O ácido fórmico** inibe a citocromo c oxidase (complexo IV da cadeia respiratória mitocondrial), bloqueando a fosforilação oxidativa, de forma semelhante ao cianeto. Isso gera acidose metabólica grave e um dano seletivo a tecidos de altíssimo consumo de oxigênio: o nervo óptico (explicando a cegueira característica da intoxicação metílica) e os núcleos da base, especialmente o putamen, onde pode ocorrer necrose hemorrágica. É por esse mecanismo mitocondrial que o tratamento inclui **fomepizol** ou **etanol** (que competem pela álcool desidrogenase, bloqueando a formação do metabólito tóxico) e hemodiálise para remover o ácido fórmico já formado.



. Aminoglicosídeos: ototoxicidade e vestibulotoxicidade por estresse oxidativo coclear.

Diferente dos anteriores, aqui o alvo não é o SNC central, mas o VIII par craniano. Os aminoglicosídeos (gentamicina, amicacina) se acumulam seletivamente **nas células ciliadas da cóclea e do sistema vestibular**, onde geram formação de radicais livres (espécies reativas de oxigênio) ao interagir com o ferro intracelular, causando **apoptose** dessas células. O dano costuma começar pelas frequências agudas na cóclea (por isso a perda auditiva inicial pode passar despercebida na conversação normal) e é cumulativo e frequentemente irreversível, já que as células ciliadas cocleares não se regeneram em mamíferos. É por isso que o monitoramento de níveis séricos (vale e pico) é mandatório em uso prolongado, a toxicidade não depende só da dose única, mas da exposição acumulada ao longo do tempo.



. Ácido valproico: encefalopatia hiperamonêmica sem hepatopatia.
Esse é o contraponto mecanístico perfeito para fechar o raciocínio: aqui o dano não é por canal iônico nem por receptor de neurotransmissor, mas por bioquímica mitocondrial e do **ciclo da ureia**. O valproato consome **carnitina** livre (necessária para betaoxidação de ácidos graxos) e inibe a carbamoil-fosfato-sintetase I, enzima limitante do ciclo da ureia. O resultado é hiperamonemia mesmo com transaminases normais, um detalhe que costuma pegar quem só pensa em "amônia alta = fígado ruim". A amônia em excesso atravessa a barreira hematoencefálica, é captada pelos astrócitos e convertida em glutamina pela glutamina-sintetase; o acúmulo intracelular de glutamina gera efeito osmótico direto, causando edema astrocitário, mecanismo semelhante ao da encefalopatia hepática clássica, mas aqui por bloqueio enzimático farmacológico, não por insuficiência hepática de base.
Clinicamente: confusão, letargia, podendo progredir a coma, geralmente com amônia sérica elevada e valproato em nível tóxico ou até **terapêutico** (em pacientes com deficiência de **carnitina** de base).





Figura 1. Signos de edema cerebral con borramiento generalizado de surcos.


. Digoxina: inibição da bomba Na^+/K^+-ATPase e toxicidade vagal-central.
O digitálico bloqueia a Na^+/K^+-ATPase de membrana, o que no miocárdio aumenta a força contrátil (mecanismo terapêutico), mas em superdose o mesmo bloqueio afeta neurônios do sistema nervoso central e autônomo. No tronco encefálico, a digoxina aumenta o tônus vagal central, contribuindo para bradiarritmias, e no córtex visual gera uma toxicidade bem característica: alterações de percepção de cor, classicamente xantopsia (visão amarelada), além de confusão mental, delirium e, em idosos, quadros que podem ser confundidos com demência aguda. O mecanismo visual está ligado à inibição da mesma bomba Na^+/K^+-ATPase nos fotorreceptores da retina, que dependem dela para manter o gradiente iônico necessário à fototransdução.
. Baclofeno: agonismo GABA-B excessivo e depressão do tronco encefálico.
O baclofeno é agonista do receptor GABA-B, que normalmente reduz a liberação pré-sináptica de neurotransmissores excitatórios via inibição de canais de cálcio e ativação de canais de potássio (hiperpolarização). Em

superdose, esse efeito inibitório generalizado no SNC leva a depressão progressiva do nível de consciência, hipotonia muscular importante (contraste interessante, já que o baclofeno é usado justamente para espasticidade) e, em casos graves, depressão do centro respiratório bulbar. Um achado curioso e útil na prova: mioclonias podem ocorrer mesmo com o paciente profundamente sedado, provavelmente por desinibição de vias competidoras, um lembrete de que "inibição excessiva" nem sempre significa ausência total de atividade motora anômala.



. Teofilina: bloqueio de adenosina e acúmulo de AMPc.
A teofilina tem dois mecanismos convergentes para gerar neurotoxicidade: inibe a fosfodiesterase (aumentando AMPc intracelular, o que eleva excitabilidade neuronal) e antagoniza receptores de adenosina A1, que normalmente têm efeito inibitório/neuroprotetor no SNC ao reduzir a liberação de glutamato. Bloquear a adenosina remove esse "freio" fisiológico, favorecendo hiperexcitabilidade cortical. O resultado prático é que a teofilina em superdose causa convulsões refratárias, muitas vezes sem sinais premonitórios claros (diferente de outras intoxicações que evoluem de forma mais gradual) e essas convulsões costumam responder mal a benzodiazepínicos isoladamente, exigindo às vezes fenobarbital, justamente porque o mecanismo de hiperexcitação não é puramente GABAérgico.
. Síndrome serotoninérgica (ISRS, IMAO, tramadol, associações): excesso de serotonina em receptor 5-HT2A.

Diferente dos anteriores, aqui a neurotoxicidade não vem de um único fármaco em dose alta, mas classicamente da combinação de agentes serotoninérgicos (ex: ISRS + IMAO, ou ISRS + tramadol). O excesso de serotonina na fenda sináptica, atuando principalmente sobre receptores 5-HT2A, gera uma tríade clássica: alteração do estado mental (agitação, confusão), hiperatividade neuromuscular (clônus, hiper-reflexia, tremor classicamente mais pronunciado em membros inferiores) e disautonomia (hipertermia, taquicardia, diaforese). A hipertermia aqui não é central hipotalâmica pura, mas decorre em grande parte da atividade muscular excessiva e sustentada gerada pelo clônus, por isso o tratamento inclui benzodiazepínicos (para reduzir a atividade neuromuscular) e, em casos graves, ciproeptadina, um antagonista serotoninérgico direto.




. Antipsicóticos (síndrome neuroléptica maligna): bloqueio dopaminérgico D2 hipotalâmico e nigroestriatal.

Mecanismo quase espelhado ao da síndrome serotoninérgica, e por isso são frequentemente comparados em prova. O bloqueio excessivo de receptores D2 no hipotálamo compromete a termorregulação central, enquanto o bloqueio D2 na via nigroestriatal gera rigidez muscular extrapiramidal intensa (rigidez "em cano de chumbo"). Diferente do clônus da síndrome serotoninérgica, aqui a rigidez é constante e **não há hiper-reflexia** proeminente, na verdade os reflexos costumam estar normais ou reduzidos. A rigidez muscular sustentada, assim como na serotoninérgica, contribui para hipertermia por geração excessiva de calor muscular, além de risco de rabdomiólise. O tratamento com dantroleno (que bloqueia liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático muscular) e bromocriptina (agonista dopaminérgico, repondo o que foi bloqueado) reflete diretamente essa lógica fisiopatológica dupla, central e muscular.

. Cocaína: bloqueio de canal de sódio e vasoconstrição cerebral por excesso catecolaminérgico.

A cocaína tem dupla ação neurotóxica que vale a pena separar com clareza.

No terminal nervoso, ela bloqueia a recaptação de dopamina, noradrenalina e serotonina, gerando excesso desses neurotransmissores na fenda sináptica, isso por si só já contribui para agitação, convulsões e um estado hiperadrenérgico sistêmico (taquicardia, hipertensão, hipertermia). Paralelamente, a cocaína também bloqueia canais de sódio voltagem-dependentes (efeito anestésico local, mecanismo compartilhado com os tricíclicos), o que explica convulsões e arritmias cardíacas concomitantes. Mas o achado mais grave e específico é vascular: o excesso catecolaminérgico gera vaso espasmo cerebral intenso, que pode causar isquemia focal, e em vasos já fragilizados, hemorragia intracraniana, a cocaína é causa reconhecida de AVC isquêmico e hemorrágico em pacientes jovens sem fatores de risco tradicionais, achado que sempre vale lembrar na prática clínica.



Capítulo 6.3 | Metais Pesados.


Continuando na saga de intoxicações falaremos sobre os metais pesados e como eles são extremamente perigosos.

. Chumbo (Pb): Bloqueio de canais de cálcio e interferência na síntese de heme.

O chumbo tem afinidade por grupos sulfidrila (-SH) de proteínas e consegue mimetizar o cálcio, atravessando canais de Ca^{2+} voltagem-dependentes e se acumulando dentro do neurônio. Ali, interfere na liberação de neurotransmissores dependente de cálcio e inibe a ácido delta-amino levulínico desidratase (ALA-desidratase), uma enzima da síntese do heme, daí a associação clássica com anemia sideroblástica e pontilhado basófilo nas

hemácias. No SNC, o chumbo tem tropismo especial pelo hipocampo e cerebelo em crianças, comprometendo a formação de sinapses e a mielinização em desenvolvimento, por isso a intoxicação crônica infantil causa déficit cognitivo e comportamental muitas vezes irreversível, mesmo após a quelação. Em adultos, o quadro mais clássico é a neuropatia periférica motora pura, classicamente afetando extensores de punho ("mão caída", wrist drop), por degeneração axonal preferencial de fibras motoras de rápida condução.





. Mercúrio (Hg): Inibição enzimática por grupos sulfidrila e disfunção cerebelar. O mecanismo central do mercúrio, seja na forma inorgânica ou orgânica (metilmercúrio, a forma mais neurotóxica, presente em peixes contaminados),

também passa pela ligação a grupos sulfidrila de enzimas essenciais, comprometendo o metabolismo energético neuronal e a estabilidade do citoesqueleto (interfere na polimerização de microtúbulos, prejudicando o transporte axonal). O metilmercúrio atravessa a barreira hematoencefálica com facilidade e se concentra preferencialmente no córtex occipital (visual) e no cerebelo, explicando a tríade clássica de intoxicação crônica: ataxia, disartria e constrição do campo visual (visão em túnel). Um detalhe importante do ponto de vista de saúde pública: o feto é muito mais vulnerável que o adulto, porque o metilmercúrio atravessa a placenta livremente e se acumula em concentração ainda maior no SNC fetal em desenvolvimento, é a base da recomendação de restrição de consumo de peixes com mercúrio em gestantes.

 (sinal de intoxicação por mercúrio)

. Arsênio (As): Desacoplamento mitocondrial e neuropatia periférica sensitivo-motora.

O arsênio inorgânico também se liga a grupos sulfidrila, mas seu alvo preferencial é o complexo piruvato-desidrogenase, essencial para a entrada do piruvato no ciclo de Krebs. Ao inibir essa enzima, o arsênio bloqueia a produção mitocondrial de ATP, forçando o metabolismo celular para a via glicolítica anaeróbica, mecanismo que lembra o desacoplamento visto na intoxicação por salicilatos, mas aqui por inibição enzimática direta, não por dissipação do gradiente de prótons. No sistema nervoso periférico, essa falência energética afeta primeiro os axônios mais longos já que o axônio mais longo do corpo é o mais vulnerável a qualquer processo que comprometa a produção de energia ou o transporte axonal, porque ele depende do soma neuronal (localizado próximo à medula) para nutrir e manter toda a sua extensão através de transporte axonal, um processo que consome muito ATP

e precisa percorrer distâncias enormes até a porção mais distal do axônio. (por isso é uma **neuropatia comprimento-dependente**), gerando uma **polineuropatia sensitivo-motora simétrica e ascendente** que pode, na fase aguda, mimetizar clinicamente a síndrome de Guillain-Barré, uma das principais pegadinhas de prova envolvendo esse metal.




. Manganês (Mn): Acúmulo nos núcleos da base e disfunção dopaminérgica. Diferente dos anteriores, o manganês não age por bloqueio enzimático generalizado, mas por acúmulo seletivo nos núcleos da base, principalmente no globo pálido e no estriado, onde interfere no metabolismo mitocondrial dos neurônios dopaminérgicos e favorece estresse oxidativo local. O resultado clínico é um quadro parkinsoniano, bradicinesia, rigidez, instabilidade postural mas com uma diferença fisiopatológica importante em relação à doença de Parkinson idiopática: aqui o problema não é degeneração primária da substância negra, mas toxicidade direta sobre os núcleos da base como um todo, e por isso a resposta à levodopa costuma ser pobre ou ausente. É classicamente associado à exposição ocupacional crônica (mineração, soldagem) e, de forma pouco lembrada, a **nutrição parenteral prolongada** sem ajuste adequado de manganês na formulação.




. Tálio (Tl) Mimetismo do potássio e bloqueio da fosforilação oxidativa.
O tálio tem raio iônico semelhante ao do potássio, permitindo que ele seja transportado para dentro da célula pelos mesmos mecanismos (incluindo a bomba Na^+/K^+-ATPase), mas uma vez dentro, não consegue substituir funcionalmente o potássio nos processos que dependem dele, um "impostor iônico" que se acumula sem cumprir a função. Ele também se liga a grupos sulfidrila mitocondriais, comprometendo a fosforilação oxidativa. O achado clínico mais característico, e um dos mais cobrados em prova toxicológica, é a combinação de neuropatia periférica dolorosa de início rápido com alopecia que surge cerca de duas a três semanas após a exposição, a queda de cabelo ocorre porque o tálio também compromete a queratinização do folículo piloso, um efeito paralelo ao dano neural, não uma consequência dele.
. Alumínio (Al): Interferência na neurotransmissão colinérgica e encefalopatia dialítica.
O alumínio raramente causa intoxicação por exposição ambiental isolada, sendo classicamente associado a pacientes em diálise crônica expostos a **água de diálise contaminada** ou ao uso prolongado de quelantes de fósforo à base de alumínio. Ele se acumula no SNC e interfere na atividade da colina-acetiltransferase, comprometendo a síntese de acetilcolina, além de se ligar à cromatina neuronal e alterar a transcrição gênica em neurônios corticais. O quadro clássico, a encefalopatia dialítica, cursa com disartria progressiva,

mioclonias, alterações comportamentais e, se não identificado a tempo, demência e convulsões, um diagnóstico que se tornou raro depois que os quelantes de fósforo à base de alumínio foram amplamente substituídos por outros à base de cálcio ou sevelamer.



Reparando no padrão dos seis: chumbo e mercúrio convergem por ligação a grupos sulfidrila com tropismo neurológico específico (hipocampo/cerebelo vs. occipital/cerebelo), arsênio e alumínio comprometem energia mitocondrial ou colinérgica, e manganês e tálio têm mecanismos de mimetismo/acúmulo seletivo, mais uma vez a mesma lógica de organizar por mecanismo, não por metal, ajuda a fixar o raciocínio em vez de decorar seis quadros clínicos isolados.




Capítulo 6.4 | Pesticidas.

Para encerrarmos esse capítulo falaremos sobre os pesticidas, no geral o mais comum é a intoxicação por organofosforados, porem é possivel achar outras intoxicações no dia a dia em regiões que sejam focadas no meio agrícola, falaremos dos principais abaixo.

. Organofosforados: Inibição irreversível da acetilcolinesterase.


O mecanismo clássico e mais cobrado: os organofosforados se ligam covalentemente ao sítio ativo (serina) da acetilcolinesterase, inativando-a de forma praticamente irreversível através de um processo chamado "envelhecimento" (aging), no qual a ligação enzima-inibidor sofre uma alteração conformacional que a torna resistente até mesmo à reativação por antídoto após algumas horas. Sem a enzima funcional, a acetilcolina se acumula na fenda sináptica de forma descontrolada, hiperestimulando tanto receptores muscarínicos quanto nicotínicos. Isso explica a tríade toxicológica clássica: sinais muscarínicos (miose, sialorreia, broncorreia, bradicardia, diarreia), sinais nicotínicos (fasciculações, fraqueza muscular, taquicardia paradoxal) e sinais centrais (confusão, convulsões, coma). É por essa lógica de "envelhecimento" que a pralidoxima só funciona se administrada precocemente já que ela reativa a enzima removendo o organofosforado, mas depois que a ligação envelhece, a única solução é aguardar síntese de nova enzima.



. Carbamatos: Inibição reversível da acetilcolinesterase.
Mecanismo semelhante ao dos organofosforados, inibição da acetilcolinesterase, mas com uma diferença estrutural crucial: a ligação carbamato-enzima é espontaneamente reversível em poucas horas, sem o fenômeno de envelhecimento. Isso torna o quadro clínico geralmente mais brando e de resolução mais rápida, mas com sintomatologia colinérgica igualmente caracterizável (mesma tríade muscarínica/nicotínica/central). Um detalhe prático importante: como a inibição é reversível, a pralidoxima tem benefício discutível nesse contexto e, por alguns protocolos mais antigos, era até considerada potencialmente prejudicial, hoje o consenso é que o tratamento principal é suporte com atropina (para os sintomas muscarínicos) e observação, já que a **enzima se regenera** por si só.
. Organoclorados (ex: DDT, lindano): Bloqueio de canal de cloro e hiperexcitação por GABA.
A Diferente dos anteriores, os organoclorados não tocam na acetilcolinesterase. Eles se ligam ao canal de cloro associado ao receptor GABA-A, bloqueando o influxo de cloro que normalmente hiperpolariza e inibe o neurônio. Sem esse influxo inibitório, o neurônio fica cronicamente mais excitável, um mecanismo de hiperexcitação por remoção de freio inibitório, parecido conceitualmente com o que vimos na isoniazida (embora ali o

problema fosse produção de GABA, e aqui seja o canal efetor). O resultado clínico é tremor, hiperexcitabilidade e convulsões, muitas vezes com um período de latência maior que o dos organofosforados, já que esses compostos são altamente lipofílicos e se redistribuem lentamente a partir do tecido adiposo, o que também explica intoxicações crônicas de longa duração mesmo após exposição única.

. Piretroides: Retardo da inativação do canal de sódio (com toque alérgico). Aqui o mecanismo já deve soar familiar: os piretroides retardam a inativação de canais de sódio voltagem-dependentes, prolongando a despolarização, o mesmo princípio geral do escorpião e da armadeira que vimos no capítulo dos venenos, embora com afinidade e cinética diferentes (os piretroides tipo II, com o grupo ciano, geram despolarização muito mais prolongada que os tipo I). Isso gera hiperexcitabilidade de fibras sensoriais e motoras, causando parestesias, tremores e, em intoxicações maciças, convulsões. Um achado clínico curioso e bem cobrado: a parestesia facial (sensação de queimação/formigamento sem lesão visível) é comum mesmo em exposições leves, por ação direta sobre terminações sensoriais cutâneas. Além disso, piretroides frequentemente desencadeiam reações de hipersensibilidade (broncoespasmo, urticária), já que muitas formulações comerciais usam solventes e sinergistas (como o butóxido de piperonila) que também têm potencial alergênico.





(Exemplo de Urticaria)

. Paraquat: Ciclo redox e destruição pulmonar seletiva.

O Paraquat é um dos pesticidas mais letais em ingestão intencional, e seu mecanismo é um exemplo clássico de dano por radical livre com tropismo tecidual muito específico. Ele sofre um ciclo de redução-oxidação dentro da célula: é reduzido a um radical cátion, que reage imediatamente com o oxigênio molecular, gerando superóxido e regenerando o paraquat original, um ciclo autossustentado que consome NADPH continuamente e gera estresse oxidativo maciço. O pulmão é o órgão mais afetado porque as células alveolares tipo I e II possuem um sistema de transporte ativo que concentra paraquat preferencialmente ali (contra um gradiente de concentração), tornando a lesão pulmonar desproporcional a qualquer outro órgão. O resultado é edema pulmonar seguido de fibrose pulmonar progressiva e irreversível em poucas semanas, motivo pelo qual, paradoxalmente, oxigenoterapia suplementar é contraindicada nas fases iniciais (exceto se houver hipoxemia significativa), já que mais oxigênio alimenta ainda mais o ciclo redox tóxico.





Figura 2 – Radiografia simples de tórax no 4º (a) e 8º (b) dias após a ingestão. Não há alterações radiológicas em a). Observa-se infiltrado alveolar localizado em b) (seta branca).

. Glifosato: Surfactante como principal determinante de gravidade.
O glifosato em si (inibidor da via do chiquimato, ausente em mamíferos) tem toxicidade intrínseca relativamente baixa para humanos, a maior parte da gravidade clínica nas intoxicações por ingestão vem, na verdade, do surfactante presente nas formulações comerciais (classicamente a polioxietilenoamina, POEA), que rompe membranas celulares por ação detergente direta. Isso causa corrosão de mucosa gastrointestinal, e em ingestões maciças, absorção sistêmica suficiente para gerar choque distributivo por vasodilatação e disfunção miocárdica direta. A neurotoxicidade, quando presente, é mais um reflexo de hipoperfusão e distúrbio metabólico secundário ao choque do que um efeito neuronal direto do glifosato, um bom exemplo de intoxicação em que o "princípio ativo" não é o vilão principal do quadro grave.
. Fosfina (fosfeto de alumínio/zinco): Bloqueio da citocromo c oxidase.
Usados como fumigantes de grãos armazenados, os fosfetos reagem com a umidade (inclusive a umidade gástrica, em ingestões intencionais) liberando gás fosfina (PH_3). A fosfina inibe a citocromo c oxidase (complexo IV mitocondrial), o mesmo alvo final do cianeto e do ácido fórmico do metanol que vimos antes, bloqueando a cadeia respiratória e forçando metabolismo anaeróbico generalizado. O coração é particularmente sensível a essa falência energética abrupta, e a maioria das mortes ocorre por choque cardiogênico refratário e arritmias malignas nas primeiras 24-48 horas, muitas vezes antes que haja tempo hábil para qualquer intervenção, é considerada uma das intoxicações por pesticida com maior letalidade absoluta, justamente pela rapidez do colapso energético celular.
. Rodenticidas anticoagulantes (varfarina e "supervarfarinas"): Depleção de

fatores de coagulação vitamina K-dependentes.
Fechando com um mecanismo puramente hematológico, sem componente neurológico direto, mas didaticamente importante por contraste. Esses compostos inibem a vitamina K epóxido redutase, enzima necessária para regenerar a vitamina K reduzida a partir de sua forma oxidada, que por sua vez é cofator essencial para a gama-carboxilação (ativação) dos fatores II, VII, IX e X. As "superwarfarinas" (brodifacum, bromadiolona) têm afinidade muito maior por essa enzima e meia-vida tecidual extremamente longa, podendo causar coagulopatia grave e prolongada por semanas a meses após uma única exposição, diferente da varfarina medicamentosa, cujo efeito se resolve em dias. Clinicamente, o risco mais temido é justamente a hemorragia intracraniana espontânea, que aqui seria uma manifestação neurológica indireta (por sangramento), e não por toxicidade neuronal direta — um bom lembrete de que "toxicidade neurológica" nem sempre significa dano direto ao neurônio; às vezes o sistema nervoso sofre como órgão-alvo de uma falência sistêmica gerada em outro compartimento.





(Necropsia do encéfalo pós hemorragia intracraniana severa)


Perceba como esses 8 replicam quase todos os mecanismos gerais que já construímos nos capítulos anteriores: inibição enzimática (colinesterase), bloqueio de canal iônico (GABA-A, sódio), estresse oxidativo por ciclo redox (paraquat,), disfunção mitocondrial da cadeia respiratória (fosfina, ecoando metanol e arsênio), e falência sistêmica secundária (glifosato, rodenticidas). Isso reforça bem o fio condutor, a ideia de que, independentemente da origem (veneno animal, fármaco, metal ou pesticida), o número de mecanismos fisiopatológicos fundamentais é limitado, e uma vez dominados, você consegue prever o quadro clínico de qualquer nova substância só entendendo qual desses "botões" ela aperta.

Capítulo 7 | Órgãos Secundários.

Até agora percorremos o sistema nervoso quase sempre olhando de dentro para fora: como uma célula, um vaso ou uma via se comporta quando algo dentro do próprio sistema nervoso falha, seja por um tumor, um veneno, uma deficiência vitamínica ou um fármaco em excesso. Nesse capítulo vamos inverter a lente. O sistema nervoso não vive isolado dentro da caixa craniana, ele depende de um suprimento constante de glicose, oxigênio, um ambiente iônico estável e uma circulação livre de toxinas para funcionar, e quem garante cada um desses requisitos são os outros órgãos do corpo.

Quando um desses órgãos falha, o sistema nervoso quase sempre é uma das primeiras vítimas, porque poucos tecidos no corpo humano são tão dependentes de homeostase perfeita quanto o neurônio. Vamos percorrer cinco órgãos, entendendo primeiro como cada um funciona normalmente e, com essa base fisiológica já estabelecida, entender exatamente qual elo dessa cadeia se rompe quando ele falha.


Fígado: O fígado é provavelmente o órgão extraneural mais intimamente ligado à função cerebral, e não por acaso é praticamente impossível falar de uma encefalopatia metabólica sem esbarrar nele. Para entender por que sua falência é tão devastadora para o sistema nervoso, primeiro precisamos entender o tanto de trabalho que ele faz silenciosamente todos os dias.



O hepatócito mantém a glicemia estável entre as refeições (via glicogenólise e, quando essa reserva se esgota, gliconeogênese a partir de aminoácidos e lactato), sintetiza praticamente todas as proteínas plasmáticas importantes (incluindo a albumina, responsável por boa parte da pressão oncótica do sangue, e a maioria dos fatores de coagulação), e metaboliza e elimina substâncias potencialmente tóxicas absorvidas pelo intestino, incluindo fármacos, como já discutimos a fundo no capítulo sobre o paracetamol, e, o


que mais nos interessa aqui, a amônia.

A amônia é gerada constantemente pelo metabolismo de proteínas, tanto pelo nosso próprio organismo quanto, em quantidade significativa, por bactérias colônicas que degradam proteínas não digeridas e ureia secretada no intestino. Esse nitrogênio livre é tóxico se deixado circular, e o fígado o neutraliza convertendo-o em ureia através do ciclo da ureia, uma via que já mencionamos ao falar sobre o ácido valproico, já que aquele fármaco consegue bloquear justamente uma das enzimas limitantes desse ciclo.




A ureia, ao contrário da amônia, é uma molécula relativamente inofensiva e solúvel, facilmente excretada pelos rins. Repare que já temos aqui dois órgãos trabalhando em sequência, fígado neutralizando e rim eliminando, um bom prenúncio de como a falência de múltiplos órgãos tende a se potencializar mutuamente quando falamos de neurotoxicidade sistêmica. Quando o fígado falha, seja de forma aguda (hepatite fulminante) ou crônica (cirrose), essa capacidade de depuração de amônia despenca, e o excesso de amônia livre atravessa a barreira hematoencefálica com facilidade. Já detalhamos boa parte dessa cascata no capítulo sobre encefalopatias, mas vale reforçar aqui, com o fígado como protagonista, os pontos centrais: dentro do sistema nervoso central, é o astrócito, não o neurônio, quem mais sofre com o excesso

de amônia, porque é o astrócito que expressa a glutamina sintetase, enzima que capta a amônia livre e a combina com glutamato para formar glutamina.



Isso parece uma solução elegante, só que a glutamina acumulada dentro do astrócito se comporta como um osmólito, puxando água para dentro da célula por gradiente osmótico e gerando edema astrocitário, o verdadeiro substrato estrutural do edema cerebral visto na encefalopatia hepática aguda. De forma paralela existe todo um braço adicional dessa fisiopatologia ligado à hipertonia GABAérgica: o próprio GABA de origem bacteriana intestinal, precursores de benzodiazepínicos endógenos também de origem bacteriana que se acumulam por falência de depuração hepática, e neuroesteroides sintetizados pelo próprio astrócito em resposta à hiperamonemia, todos convergindo para o mesmo complexo receptor GABA-A e potencializando a neuroinibição central.




Existe ainda um terceiro fator, menos falado: o **manganês**, normalmente excretado pela bile, se acumula nos núcleos da base de pacientes com hepatopatia crônica pelo mesmo mecanismo tóxico que discutimos no capítulo sobre metais pesados, explicando por que alguns hepatopatas crônicos desenvolvem sinais parkinsonianos mesmo sem qualquer doença neurodegenerativa primária.

Vale ainda destacar duas consequências neurológicas do fígado doente que não são metabólicas, mas estruturais. A primeira é hemorrágica: como o fígado sintetiza a maioria dos fatores de coagulação, a hepatopatia avançada cursa com coagulopatia significativa, aumentando o risco de sangramentos espontâneos, incluindo hemorragia intracraniana, mesmo sem trauma associado. A segunda é energética: na falência hepática fulminante, a incapacidade de manter a glicemia via gliconeogênese pode gerar hipoglicemia grave, e como o neurônio depende quase exclusivamente de glicose como substrato energético, essa hipoglicemia se soma à toxicidade amoniacal e piora ainda mais o quadro neurológico. Ou seja, quando falamos em "encefalopatia hepática", estamos na verdade falando de pelo menos quatro mecanismos neurotóxicos simultâneos, não um único evento isolado.




(tomografia de uma hemorragia intracraniana espontânea)

Coração: O coração se relaciona com o sistema nervoso de uma forma bem diferente do fígado: aqui o problema raramente é uma toxina circulante, e sim uma questão de entrega, já que o cérebro depende de um fluxo sanguíneo contínuo e o coração é literalmente a bomba que gera esse fluxo.




O débito cardíaco, produto do volume sistólico pela frequência cardíaca, determina a pressão arterial média disponível para perfundir todos os órgãos, incluindo o encéfalo. Mas o cérebro não é passivo nessa relação, ele possui um mecanismo de autorregulação que mantém o fluxo sanguíneo cerebral praticamente constante numa ampla faixa de pressão arterial média (aproximadamente 60 a 150 mmHg em um indivíduo saudável), através de ajustes miogênicos e metabólicos no calibre das arteríolas cerebrais. É graças a essa autorregulação que você não desmaia toda vez que se levanta rapidamente da cadeira, mesmo com a queda transitória de pressão que a mudança postural provoca.




O problema aparece quando o coração, por qualquer motivo, deixa de sustentar esse débito de forma adequada. Em estados de baixo débito cardíaco prolongado, como insuficiência cardíaca descompensada ou choque

cardiogênico, mesmo a autorregulação cerebral eventualmente se esgota, e as regiões mais vulneráveis são justamente as zonas de fronteira entre territórios arteriais adjacentes, as chamadas zonas de watershed, entre os territórios da cerebral anterior, média e posterior.




Pense nessas zonas como o final de uma linha de irrigação agrícola: são as últimas a receber água quando a pressão do sistema cai, porque dependem de um fluxo colateral que já chega naturalmente diminuído mesmo em condições normais. Um infarto de watershed bilateral, tipicamente visto em quadros de hipotensão prolongada ou parada cardiorrespiratória revertida, é a assinatura radiológica clássica desse mecanismo.

Mas o coração também ameaça o cérebro por um segundo mecanismo, completamente diferente do primeiro: a embolia. Qualquer situação em que o sangue fique estagnado dentro de uma câmara cardíaca favorece a formação de trombo, sendo a fibrilação atrial o exemplo mais comum na prática clínica, já que a perda da contração atrial coordenada cria estase de fluxo especialmente no apêndice atrial esquerdo.




Esse trombo, uma vez formado, pode se fragmentar e seguir livremente pela circulação arterial até ocluir um vaso cerebral, um evento completamente

distinto fisiopatologicamente de um AVC aterotrombótico local, mas que se apresenta clinicamente da mesma forma, uma das razões pelas quais identificar a fonte cardioembólica muda tanto a conduta terapêutica, como veremos no capítulo sobre farmacologia.




A endocardite infecciosa segue essa mesma lógica, mas soma um componente séptico: êmbolos sépticos podem tanto ocluir vasos cerebrais quanto colonizar a parede vascular e formar aneurismas micóticos, fragilizando o vaso por dentro e criando risco de hemorragia meses depois de resolvida a infecção original, o mesmo vaso que ontem sofria isquemia por oclusão pode amanhã romper por fragilidade estrutural.



Por fim, vale mencionar rapidamente a síncope cardiogênica, que ilustra bem como um mesmo desfecho clínico, perda transitória de consciência, pode ter origens completamente diferentes. Numa arritmia grave que derruba momentaneamente o débito cardíaco, o mecanismo final é idêntico ao de qualquer outra causa de hipoperfusão cerebral global transitória, apenas a causa raiz é elétrica, não vascular ou neurológica primária, um lembrete de que o sistema nervoso muitas vezes só reflete o problema, sem ser ele mesmo a origem.

Pulmão: Se o coração garante o fluxo, o pulmão garante o conteúdo desse fluxo: é ele quem determina quanto oxigênio chega e quanto gás carbônico sai a cada ciclo respiratório. Vale abrir aqui uma exceção interessante em relação aos outros órgãos desse capítulo: o próprio sistema nervoso central é quem comanda a respiração, através dos centros respiratórios bulbares e pontinos, que geram o ritmo respiratório automático, e de quimiorreceptores que ajustam esse ritmo em tempo real.


Os quimiorreceptores centrais, localizados próximos ao bulbo, são sensíveis principalmente ao CO2, mais precisamente à queda do pH do líquor que o CO2 causa ao se difundir e se hidratar em ácido carbônico, enquanto os quimiorreceptores periféricos, nos corpos carotídeos e aórticos, respondem principalmente à queda de oxigênio. Ou seja, o pulmão é ao mesmo tempo órgão efetor e, através desses sensores, parceiro direto de um circuito de controle que se origina no próprio encéfalo, uma relação de mão dupla que nenhum outro órgão desse capítulo tem com o sistema nervoso.



Quando a troca gasosa falha, seja por insuficiência respiratória aguda, obstrução de via aérea ou qualquer causa de hipoventilação prolongada, duas consequências neurológicas se desenrolam por caminhos distintos. A primeira é a hipóxia: o neurônio praticamente não tem reserva energética própria e depende de suprimento constante de oxigênio para manter a fosforilação oxidativa mitocondrial funcionando; sem isso, as bombas iônicas dependentes de ATP falham, o potencial de membrana se dissipa, e ocorre liberação maciça de glutamato para o meio extracelular, o mesmo fenômeno de excitotoxicidade que vamos detalhar melhor no capítulo sobre trauma cranioencefálico, aqui desencadeado por privação de oxigênio em vez de lesão mecânica direta.

As regiões mais sensíveis a esse tipo de insulto são aquelas com maior demanda metabólica basal e maior densidade de receptores glutamatérgicos, classicamente o hipocampo (setor CA1), as células de Purkinje do cerebelo e o córtex nas zonas de watershed que já mencionamos ao falar do coração, e é por isso que uma parada cardiorrespiratória revertida com sucesso ainda

assim pode deixar sequelas de memória proeminentes, mesmo quando a função cardíaca se recupera completamente.




(Tomografia de uma encefalopatia hipóxica-isquêmica)

A segunda consequência é a hipercapnia, e ela afeta o sistema nervoso por uma via completamente mecânica: o CO2 é o vasodilatador cerebral mais potente que existe, e quando ele se acumula no sangue, as arteríolas cerebrais dilatam, aumentando o volume sanguíneo cerebral. Isso é inofensivo num crânio saudável, mas em qualquer situação onde a complacência intracraniana já esteja reduzida, como veremos em detalhe no próximo capítulo sobre trauma, essa vasodilatação adicional pode ser o empurrão final para uma hipertensão intracraniana descompensada. Em quadros crônicos, como na DPOC avançada, a hipercapnia sustentada também pode gerar um quadro de rebaixamento progressivo do nível de consciência conhecido classicamente como narcose por CO2, refletindo o efeito depressor direto da acidose sobre a excitabilidade neuronal central.

Uma última menção vale para a apneia obstrutiva do sono, um quadro menos dramático agudamente, mas que ilustra bem o efeito cumulativo desse mesmo mecanismo hipóxico: os episódios repetidos de hipóxia intermitente ao longo de anos geram disfunção endotelial crônica e provavelmente contribuem para declínio cognitivo e maior risco cardiovascular e cerebrovascular a longo prazo, um bom exemplo de como nem toda lesão neurológica precisa ser aguda e dramática para ser clinicamente relevante.


Rins: Os rins protegem o sistema nervoso por três frentes simultâneas: eliminação de toxinas, controle do ambiente iônico e regulação do equilíbrio

ácido-base, e cada uma dessas frentes, quando falha, tem uma forma própria e reconhecível de agredir o cérebro. Vamos por partes. A primeira frente já apresentamos brevemente no capítulo sobre encefalopatias: a encefalopatia urêmica.




Vista anterior

Vale aprofundar aqui, com o rim como protagonista, o motivo dela ocorrer. Quando a taxa de filtração glomerular cai, toxinas urêmicas, entre elas a própria ureia, compostos guanidínicos e, um ponto pouco lembrado, o próprio paratormônio (PTH), se acumulam no sangue. O PTH costuma ser lembrado só pelo seu papel ósseo e no metabolismo do cálcio, mas em concentrações cronicamente elevadas, como ocorre no hiperparatireoidismo secundário da doença renal crônica, ele próprio se comporta como uma toxina urêmica, favorecendo influxo excessivo de cálcio para dentro do neurônio e comprometendo sua função.



Some-se a isso um comprometimento direto da integridade da barreira hematoencefálica e um estado de estresse oxidativo sistêmico, e temos um quadro multifatorial de disfunção cognitiva progressiva, tipicamente com flutuação de nível de consciência e, em casos avançados, mioclonias e crises convulsivas.

A segunda frente é o distúrbio eletrolítico, e aqui o exemplo mais rico fisiopatologicamente é a hiponatremia. Numa queda aguda e importante do sódio sérico, a água se desloca osmoticamente para dentro das células cerebrais, gerando edema cerebral citotóxico, exatamente como vimos no edema astrocitário da encefalopatia hepática, só que aqui o gatilho é osmótico puro, não amoniacal. O detalhe mais rico, e mais cobrado, está no tratamento: se a hiponatremia for crônica (o que dá tempo para os astrócitos se adaptarem, extrudando osmólitos orgânicos de dentro da célula para reduzir seu próprio volume e se proteger do edema), a **correção rápida** do sódio é perigosa, porque os astrócitos não conseguem recapturar esses osmólitos perdidos rápido o suficiente, e acabam encolhendo de forma reativa e exagerada, um fenômeno que lesiona preferencialmente a ponte, densamente compactada entre substância branca e cinzenta, causando a temida síndrome de desmielinização osmótica (antigamente chamada de mielinólise pontina central).




É um dos raros casos na medicina onde corrigir rápido demais um distúrbio é mais perigoso do que corrigir devagar. Um fenômeno correlato que vale a pena mencionar aqui é a síndrome de desequilíbrio da diálise, que ocorre quando a hemodiálise remove ureia do sangue mais rapidamente do que ela consegue se difundir para fora do encéfalo através da barreira hematoencefálica. Esse gradiente osmótico transitório entre sangue (já "limpo") e encéfalo (ainda com ureia acumulada) puxa água para dentro do parênquima cerebral, gerando edema agudo, tipicamente manifestado como cefaleia, náuseas e, em casos graves, confusão durante ou logo após sessões de diálise, principalmente nas primeiras sessões de um paciente que iniciou tratamento com ureia muito elevada.

A terceira frente, menos dramática mas relevante a longo prazo, é a produção **de eritropoetina** pelas células peritubulares renais, sensíveis à hipóxia tecidual local. Na doença renal crônica, essa produção cai, gerando anemia progressiva, que por sua vez reduz a oferta de oxigênio ao encéfalo de forma crônica e branda, contribuindo para fadiga cognitiva e menor tolerância a esforços mentais prolongados, um mecanismo bem mais silencioso que os anteriores, mas que ajuda a explicar por que pacientes renais crônicos com


anemia mal controlada relatam tanta lentificação cognitiva mesmo fora de qualquer episódio agudo de encefalopatia urêmica franca.



Baço: O baço é, de longe, o órgão mais indireto dessa lista: ele não circula nenhuma toxina neuroativa nem regula diretamente o volume ou a composição do sangue que perfunde o encéfalo, mas isso não significa que sua ausência ou disfunção seja inofensiva para o sistema nervoso, apenas que o caminho até lá é mais longo.




Para entender esse caminho, primeiro vale relembrar o que o baço faz: sua polpa vermelha filtra e remove hemácias senescentes ou danificadas da circulação, e sua polpa branca é um dos principais centros de vigilância imunológica do corpo, especialmente contra bactérias encapsuladas, aquelas que possuem uma cápsula polissacarídica que dificulta o reconhecimento direto por neutrófilos e exige opsonização eficiente, um processo em que o baço, através de linfócitos B da zona marginal, tem papel de protagonista.




Quando o baço é removido cirurgicamente ou perde função, como ocorre progressivamente em pacientes com anemia falciforme por infartos esplênicos repetidos (algo que vamos detalhar melhor no capítulo sobre genética), o paciente fica vulnerável à chamada infecção fulminante pós-

esplenectomia, tipicamente causada por Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis e Haemophilus influenzae tipo b. Repare que esses são exatamente os três principais agentes de meningite bacteriana que vamos detalhar no capítulo sobre bactérias e fungos: o baço não protege o sistema nervoso diretamente, ele protege a via de entrada, e quando essa primeira linha de defesa falha, o mesmo organismo que o baço normalmente conteria na corrente sanguínea consegue seguir até as meninges e causar dano neurológico direto ali.



É um ótimo exemplo de como uma falha em um órgão aparentemente distante do sistema nervoso pode se traduzir em doença neurológica grave, só que por um caminho infeccioso, não metabólico ou hemodinâmico como os órgãos anteriores. Vale mencionar ainda que, na anemia falciforme, o mesmo processo de vaso-oclusão que leva ao infarto esplênico repetido e à autoesplenectomia na infância também acomete diretamente os vasos cerebrais, gerando um risco elevado de acidente vascular cerebral isquêmico em crianças, às vezes silencioso, detectável apenas em exames de imagem de rotina. Ou seja, baço e cérebro nesse contexto não têm uma relação de causa e efeito direta, eles são dois órgãos-alvo diferentes do mesmo processo fisiopatológico de base, a vaso-oclusão por hemácias falcizadas, mais um lembrete de que enxergar mecanismos compartilhados entre órgãos

aparentemente distantes é mais útil clinicamente do que decorar cada doença de forma isolada.




Por fim, existe uma via de comunicação direta e bem mais recente na literatura entre sistema nervoso e baço, que vale a pena mencionar por ser conceitualmente bonita: o chamado reflexo inflamatório, ou via colinérgica anti-inflamatória. Fibras eferentes do nervo vago liberam acetilcolina que atua sobre receptores nicotínicos alfa-7 em macrófagos esplênicos, suprimindo a liberação de citocinas pró-inflamatórias como o TNF-alfa. Diferente de tudo que vimos até aqui nesse capítulo, onde o órgão periférico afeta o cérebro, essa é uma via em que o próprio sistema nervoso autônomo modula ativamente a resposta imune esplênica, uma comunicação de mão dupla genuína entre os dois sistemas, atualmente investigada como possível alvo terapêutico em quadros inflamatórios sistêmicos graves, incluindo sepse.

Fechando esse capítulo, vale notar um padrão que se repete nos cinco órgãos que vimos: o sistema nervoso raramente é agredido por um único mecanismo isolado quando outro órgão falha, quase sempre são múltiplas vias convergindo simultaneamente, metabólica, osmótica, hemodinâmica, imunológica, às vezes todas ao mesmo tempo, como vimos claramente no fígado. Entender o sistema nervoso de forma isolada, sem entender essas interfaces com o resto do corpo, é entender apenas metade da neurologia.

Capítulo 8 | Manejo do TCE.

Saímos do capítulo anterior falando de órgãos que agridem o sistema nervoso por vias bioquímicas, silenciosas e progressivas. Agora mudamos completamente a natureza da agressão: o traumatismo cranioencefálico é uma lesão mecânica, física, muitas vezes instantânea. Mas aqui está o ponto mais importante que você precisa carregar para esse capítulo inteiro: mesmo uma lesão puramente mecânica, no minuto seguinte ao impacto, se transforma numa cascata bioquímica quase idêntica em espírito a tudo que já vimos até aqui, envolvendo canais iônicos, radicais livres e disfunção mitocondrial. A força física é só o gatilho inicial; o que decide o desfecho do paciente na maioria das vezes não é o momento do impacto em si, mas tudo que acontece nas horas e dias seguintes, e é exatamente essa parte que a medicina consegue modificar.




Antes de entrarmos na fisiopatologia propriamente dita, vale estabelecer rapidamente como classificamos um TCE, porque essa classificação vai orientar praticamente toda conduta que discutiremos ao longo do capítulo. Usamos a própria Escala de Coma de Glasgow, que detalharemos melhor na seção de semiologia, para dividir o TCE por gravidade em leve (Glasgow entre treze e quinze), moderado (Glasgow entre nove e doze) e grave (Glasgow igual ou menor que oito). Existe ainda uma segunda forma de classificar, não pela gravidade clínica, mas pelo padrão anatômico da lesão: lesões focais, aquelas concentradas num ponto específico e geralmente visíveis já na tomografia inicial, como os hematomas e as contusões que veremos a seguir, e lesões difusas, espalhadas por múltiplas regiões do encéfalo e frequentemente invisíveis ou sutis na tomografia inicial, como a lesão axonal difusa e o edema cerebral difuso. Essa segunda classificação importa clinicamente porque


lesões focais costumam ter uma correlação mais direta entre o achado de imagem e o exame neurológico, enquanto lesões difusas podem gerar quadros clínicos graves com uma tomografia inicial enganosamente pouco alarmante, um padrão que vamos reencontrar quando falarmos sobre lesão axonal difusa.

Além dessa classificação inicial, precisamos entender dois conceitos que vão sustentar esse capítulo inteiro: a doutrina de Monro-Kellie e a diferença entre lesão primária e lesão secundária.


A doutrina de Monro-Kellie parte de uma premissa simples: o crânio adulto é uma caixa rígida e de volume fixo, contendo três compartimentos, o parênquima cerebral (cerca de 80% do volume), o sangue (cerca de 10%) e o líquor (cerca de 10%). Se o volume de qualquer um desses três componentes aumenta, seja por uma hemorragia, por edema cerebral ou por acúmulo de líquor, os outros dois precisam diminuir proporcionalmente para manter a pressão intracraniana estável, já que o volume total simplesmente não tem para onde se expandir. Esse sistema de compensação, no entanto, tem um limite. No começo, pequenos aumentos de volume são absorvidos sem grande elevação de pressão: o líquor é deslocado para o canal espinhal e o sangue venoso é espremido para fora do crânio. Mas, uma vez esgotada essa reserva de complacência, a curva de pressão-volume deixa de ser praticamente plana e passa a subir de forma exponencial, e pequenos aumentos adicionais de volume geram elevações desproporcionais de pressão intracraniana. É esse ponto de virada que separa um paciente estável de um paciente em franca deterioração neurológica.



O segundo conceito é a diferença entre lesão primária e lesão secundária. A lesão primária é o dano mecânico direto que ocorre no exato momento do trauma, laceração de tecido, ruptura de vasos, cisalhamento axonal, e ela é, na prática, imutável, nenhuma intervenção médica desfaz um axônio já rompido no instante do impacto.



A lesão secundária, por outro lado, é tudo que se desenrola nas horas e dias seguintes como consequência da lesão primária, e é justamente onde a medicina atua. O excesso de glutamato liberado por neurônios lesados hiperativa receptores NMDA, permitindo um influxo maciço de cálcio para dentro da célula; esse cálcio em excesso desencadeia disfunção mitocondrial e produção de radicais livres, num ciclo de dano que lembra bastante o que já vimos no capítulo sobre paraquat e sobre o próprio paracetamol, só que aqui deflagrado por trauma mecânico, não por uma toxina exógena.




Paralelamente, dois tipos de edema se instalam por mecanismos distintos: o edema citotóxico, por falência das bombas iônicas dependentes de ATP e consequente inchaço da própria célula, e o edema vasogênico, por ruptura da barreira hematoencefálica, permitindo que proteínas plasmáticas escapem para o espaço extracelular e puxem água atrás de si por gradiente osmótico. Cada aumento adicional de volume intracraniano, seja por edema ou por sangramento contínuo, empurra o paciente cada vez mais para o lado íngreme da curva de Monro-Kellie que acabamos de descrever, e cada elevação de pressão intracraniana reduz a pressão de perfusão cerebral (a diferença entre a pressão arterial média e a própria pressão intracraniana), ameaçando causar isquemia secundária por baixo fluxo, fechando um círculo vicioso que pode se perpetuar por dias se não for interrompido.



Vale se aprofundar um pouco mais nessa cascata secundária, porque ela não para na disfunção mitocondrial que já descrevemos. Paralelamente ao dano excitotóxico, o próprio tecido lesado ativa a micróglia local, as células imunes residentes do sistema nervoso central, que passam a liberar citocinas pró-inflamatórias como IL-1b, TNF-alfa e IL-6. Essa neuroinflamação tem um papel duplo, ela ajuda a conter e limpar debris celulares, mas quando excessiva e prolongada, amplifica ainda mais o dano ao redor da lesão primária, num padrão que lembra bastante a distinção entre núcleo e penumbra que veremos ao falar de AVC no capítulo sobre farmacologia: existe um núcleo de tecido já morto por necrose, geralmente por dentro da própria lesão primária, e ao redor dele um halo de tecido ainda potencialmente salvável, onde a morte celular, quando ocorre, tende a seguir uma via mais organizada de apoptose, dependente de energia, e portanto teoricamente mais suscetível a ser

interrompida por intervenção médica a tempo.

Mais recentemente, a literatura tem dado atenção a um fenômeno chamado despolarização alastrante cortical, ondas de despolarização quase completa que se propagam lentamente pelo córtex lesado, obrigando os neurônios afetados a gastar quantidades enormes de ATP só para tentar restaurar seus gradientes iônicos normais. Em um tecido que já está metabolicamente no limite, essas ondas repetidas de despolarização podem ser o fator decisivo que converte tecido de penumbra em tecido necrótico, um mecanismo ainda em investigação ativa, mas que ajuda a explicar por que alguns pacientes se deterioram horas ou dias depois do trauma, mesmo sem um novo sangramento identificável na tomografia de controle.




Capítulo 8.1 | Principais achados radiológicos.

Com essa base fisiopatológica em mãos, conseguimos entender os achados de imagem não como padrões a serem decorados, mas como consequência direta da anatomia local e do tipo de força envolvida.

O hematoma epidural se forma entre o crânio e a dura-máter, e como a dura é firmemente aderida ao osso exatamente nas suturas cranianas, o sangue fica fisicamente impedido de ultrapassá-las, criando a clássica imagem biconvexa, em forma de lente, que não cruza linhas de sutura. Classicamente decorre de fratura temporal lacerando a artéria meníngea média; uma origem arterial


explica por que o acúmulo costuma ser rápido, e por que alguns pacientes apresentam o clássico intervalo lúcido, um período de consciência preservada logo após o trauma, antes da rápida deterioração conforme o hematoma se expande.



Já o hematoma subdural se forma entre a dura-máter e a aracnoide, um espaço potencial que não é interrompido pelas suturas, por isso sua imagem clássica é em forma de crescente ou meia-lua, acompanhando livremente a convexidade cerebral. Sua origem também é diferente, tipicamente por ruptura das veias-ponte, pequenas veias que atravessam esse espaço conectando a superfície cortical aos seios venosos durais. Como são veias, e não artérias, o sangramento costuma ser mais lento, o que explica por que hematomas subdurais podem ser agudos, subagudos ou até crônicos, dependendo de quanto tempo o sangue leva para se acumular o suficiente para gerar sintomas, e por que, na tomografia, a densidade do sangue muda ao longo desse tempo, hiperdenso na fase aguda, podendo ficar isodenso e mais difícil de identificar na fase subaguda, e hipodenso na fase crônica, à medida que a hemoglobina se degrada. Pacientes idosos, com maior atrofia cerebral e, portanto, mais espaço para essas veias-ponte se esticarem antes de romper, e lactentes, cujas veias ainda são frágeis, são os grupos classicamente mais vulneráveis a esse tipo de sangramento mesmo com traumas de intensidade aparentemente pequena.



A hemorragia subaracnóidea traumática, sangue dissecando os sulcos corticais e as cisternas da base, é na verdade a causa mais comum de sangue no espaço subaracnóideo, mais até que a ruptura de aneurisma, que costuma receber mais atenção nos livros justamente por ser mais dramática clinicamente. Aqui o mecanismo é a laceração direta de pequenos vasos piais pela força do próprio trauma.


Hemorragias Intracranianas
Crânio
Dura mater
Aracnoide
Pia mater
Tecido cerebral
Hematoma Epidural
1
2
Hematoma Subdural
Hematoma Subaracnoide
3
4
Hematoma Intracerebral



A lesão axonal difusa merece atenção especial, porque é provavelmente o achado mais subestimado pela tomografia comum. Ela ocorre quando forças de aceleração e desaceleração rotacional, não um impacto direto, fazem com que diferentes estruturas do encéfalo, com densidades e inércias diferentes, se movam em velocidades distintas entre si, gerando cisalhamento nas interfaces entre substância branca e cinzenta, no corpo caloso e no tronco encefálico dorsolateral. Esse cisalhamento rompe o citoesqueleto axonal, interrompendo o transporte axoplasmático e gerando pequenos edemas focais ao longo do axônio, e eventual desconexão. O problema é que esse dano é predominantemente microscópico, e a tomografia frequentemente aparenta normal ou mostra apenas pequenos focos hemorrágicos puntiformes, subestimando gravemente a real extensão da lesão. É por isso que pacientes com lesão axonal difusa grave podem permanecer em coma prolongado mesmo com uma tomografia inicial pouco alarmante; a ressonância magnética, principalmente em sequências sensíveis a produtos de degradação da hemoglobina, é muito mais sensível para capturar essa lesão.




Essa limitação da tomografia inicial não se restringe à lesão axonal difusa, vale destacar também o fenômeno de progressão hemorrágica das contusões, às vezes chamado de "blossoming". Uma contusão que aparece pequena e discreta na tomografia feita logo após o trauma pode crescer significativamente nas primeiras vinte e quatro a setenta e duas horas seguintes, à medida que o próprio tecido lesado continua sangrando para dentro da área já contundida, um processo agravado, como veremos mais à frente nesse capítulo, pela coagulopatia que o próprio trauma pode induzir. É por isso que praticamente todo protocolo de TCE moderado a grave inclui uma tomografia de controle dentro das primeiras horas, mesmo que o paciente esteja clinicamente estável: a imagem inicial simplesmente não encerra o processo, ela é uma fotografia de um fenômeno que ainda está evoluindo.



A contusão cerebral segue a clássica lógica de golpe e contragolpe: a lesão no local direto do impacto (golpe) é acompanhada por uma segunda lesão no polo oposto do encéfalo (contragolpe), porque o encéfalo, suspenso no líquor, continua se movendo por inércia mesmo depois que o crânio já parou, colidindo contra a superfície óssea interna do lado oposto. Os lobos frontal e temporal, que repousam sobre superfícies ósseas irregulares na base do crânio (o teto orbitário e a asa do esfenoide), são classicamente os mais afetados por contusão, independentemente de onde o impacto original ocorreu.

As fraturas de base de crânio deixam sinais clínicos característicos que decorrem simplesmente da anatomia por onde o sangue ou o líquor consegue escoar por gravidade. Equimose periorbitária bilateral (olhos de guaxinim)


sugere fratura de fossa anterior, com sangue dissecando os planos faciais até a região periorbitária, enquanto equimose retroauricular (sinal de Battle) sugere fratura de fossa média, com sangue tracejando até a região da mastoide. Quando a fratura rompe também a dura-máter subjacente, pode haver fístula liquórica, manifestada como rinorreia ou otorreia clara, que se confunde facilmente com secreção nasal comum, mas costuma ser identificada pelo sinal do halo (quando pingada em papel filtro, o líquor se difunde mais rápido que o sangue, formando um duplo anel característico) ou confirmada laboratorialmente pela dosagem de beta-2-transferrina, uma proteína praticamente exclusiva do líquor.



Vale ainda mencionar dois achados adicionais, menos comuns, mas didaticamente ricos. A fratura com afundamento ocorre quando um fragmento ósseo é empurrado para dentro em relação à superfície normal do crânio, e sua relevância clínica depende diretamente de um detalhe simples, se a pele sobrejacente está íntegra (fratura fechada) ou rota (fratura aberta ou exposta), porque uma fratura aberta cria comunicação direta entre o ambiente externo e o parênquima cerebral, elevando enormemente o risco de infecção e geralmente exigindo elevação cirúrgica do fragmento. E o pneumoencéfalo, ar dentro da cavidade craniana, ocorre quando uma fratura rompe a dura-máter numa região adjacente a um seio aéreo, como os seios paranasais ou as células mastoides, criando uma via para entrada de ar. Na maioria das vezes é um achado benigno e autolimitado, mas quando esse ar fica represado sob pressão, forma-se o pneumoencéfalo hipertensivo, reconhecível na tomografia

pelo sinal do Monte Fuji, duas coleções de ar frontais comprimindo e separando os lobos frontais na linha média, criando um contorno que lembra o pico duplo característico dessa montanha, e que, assim como qualquer outro aumento de volume dentro da caixa craniana fechada, se encaixa exatamente na mesma lógica de Monro-Kellie que já discutimos.

Por fim, vale registrar que, além de identificar cada lesão individualmente, radiologistas e neurocirurgiões também avaliam o quadro como um todo através de sinais indiretos de gravidade, como o desvio de linha média (o quanto as estruturas centrais do encéfalo foram empurradas para um dos lados) e o apagamento das cisternas basais (espaços preenchidos por líquor ao redor do tronco encefálico que, quando comprimidos ou obliterados, sinalizam hipertensão intracraniana significativa e risco iminente de herniação). Esses dois achados, mais do que o tipo específico de lesão isolada, costumam ser os que mais preocupam à beira do leito, e é por isso que sistemas de classificação prognóstica, como a classificação de Marshall na tomografia, incorporam justamente o desvio de linha média e o estado das cisternas basais como critérios centrais.



(Dissecação de um ferimento por projetil da sela Turca)




Capítulo 8.2 | Semiologia para identificação.

A Escala de Coma de Glasgow avalia três domínios, abertura ocular, resposta verbal e resposta motora, e vale entender que cada domínio reflete um nível funcional diferente do sistema nervoso, não é só uma pontuação a ser somada mecanicamente. A abertura ocular reflete a integridade do sistema reticular ativador ascendente, responsável pelo estado de alerta; a resposta verbal reflete integração cortical superior, envolvendo áreas de linguagem e processamento; e a resposta motora reflete a integridade da via corticospinal, do córtex até a medula. Um paciente que abre os olhos, mas não fala e não obedece a comandos, tem um padrão de dano completamente diferente de um paciente que fala normalmente, mas não move um lado do corpo, mesmo que a pontuação total possa, por coincidência, ser parecida.



Em pacientes que já não conseguem obedecer a comandos, dois reflexos de tronco encefálico ajudam a testar a integridade dessas estruturas mais profundas sem depender de cooperação alguma do paciente. O reflexo oculocefálico, popularmente conhecido como "olhos de boneca", testa-se girando a cabeça do paciente lateralmente e observando os olhos: num tronco encefálico íntegro, os olhos se movem conjugadamente na direção oposta ao movimento da cabeça, como se permanecessem fixos num ponto do espaço, um arco reflexo que conecta os núcleos vestibulares aos núcleos oculomotores através do fascículo longitudinal medial. Esse teste, importante lembrar, é contraindicado até que uma lesão cervical tenha sido descartada, exatamente pela ressalva que já faremos ao falar sobre atendimento inicial. Já o reflexo oculovestibular, ou prova calórica, testa-se irrigando o conduto

auditivo com água fria, o que gera uma corrente de convecção na endolinfa do labirinto e, num tronco encefálico íntegro de um paciente em coma, provoca desvio tônico e conjugado dos olhos em direção ao ouvido irrigado. A ausência desses reflexos, quando esperados, é um sinal preocupante de disfunção mesencefálica ou pontina extensa, não apenas cortical.



Os sinais pupilares merecem atenção redobrada porque ajudam a localizar precisamente onde a herniação está ocorrendo. Uma pupila unilateral fixa e dilatada é o sinal clássico de herniação uncal comprimindo o terceiro par craniano ipsilateral, e o motivo dela aparecer antes de qualquer outro sinal (como ptose ou desvio ocular) tem uma explicação anatômica elegante: as fibras parassimpáticas responsáveis pela constrição pupilar correm na porção mais superficial do nervo oculomotor, exatamente na periferia do nervo, por isso são as primeiras a sofrer quando uma compressão externa, como o úncus empurrando contra o nervo, começa a agir. Isso contrasta com uma paralisia do terceiro par de causa isquêmica (como na diabetes descompensada), onde o dano geralmente atinge primeiro o suprimento sanguíneo interno do nervo, poupando essas fibras parassimpáticas superficiais e, portanto, poupando a pupila, mesmo com ptose e desvio ocular evidentes. É a clássica distinção entre uma paralisia de terceiro par "cirúrgica" (pupila afetada, sugerindo compressão) e uma "clínica" (pupila poupada, sugerindo isquemia).

A postura observada também localiza o nível da lesão ao longo do neuroeixo. A postura de decorticação, flexão dos membros superiores com extensão dos membros inferiores, indica uma lesão acima do núcleo rubro, já que o trato rubroespinal, que facilita predominantemente a flexão dos membros superiores, ainda está funcionalmente íntegro. Já a postura de descerebração, extensão de todos os quatro membros, indica uma lesão no nível do núcleo rubro ou abaixo dele, quando esse trato deixa de atuar e sobra apenas a

influência extensora não balanceada do trato vestibuloespinal e reticuloespinal. Descerebração é, portanto, sinal de uma lesão mais caudal e mais grave que a decorticação, valendo lembrar que já discutimos esses mesmos tratos, com mais detalhe, no capítulo sobre neuroanatomia da medula.


Um último elemento semiológico vale menção, mais sutil que os anteriores, mas com forte valor prognóstico: a amnésia pós-traumática. Ela se refere ao período, que pode durar minutos, horas ou até semanas nos casos mais graves, em que o paciente, mesmo já reorientado e conversando normalmente, não consegue formar novas memórias consistentes sobre o que está acontecendo ao seu redor. A duração dessa amnésia costuma se correlacionar diretamente com a gravidade da lesão, e o substrato anatômico não deveria surpreender, já discutimos exatamente essa mesma vulnerabilidade hipocampal ao falarmos sobre encefalite herpética: o hipocampo, essencial para a consolidação de novas memórias, é uma estrutura relativamente vulnerável às forças de aceleração e desaceleração do trauma, especialmente pela sua localização na porção medial do lobo temporal, próxima às bordas ósseas rígidas da fossa média que já mencionamos ao falar de contusão.

Por fim, a tríade de Cushing, hipertensão arterial, bradicardia e padrão respiratório irregular, é um sinal tardio e ominoso de hipertensão intracraniana grave, não um sinal precoce como muitos assumem por engano. Fisiologicamente, a elevação sustentada da pressão intracraniana reduz a perfusão do próprio tronco encefálico; essa isquemia bulbar dispara uma descarga simpática maciça na tentativa reflexa de elevar a pressão arterial sistêmica o suficiente para restaurar a perfusão cerebral, e essa hipertensão resultante, por sua vez, ativa o reflexo barorreceptor, gerando bradicardia reflexa mediada pelo vago. O padrão respiratório irregular reflete o comprometimento direto dos próprios centros respiratórios bulbares. Quando você identifica essa tríade à beira do leito, o paciente já está muito próximo de uma herniação estabelecida, não é hora de observar, é hora de agir.


Capítulo 8.3 | Possíveis complicações.

As síndromes de herniação são, na prática, o desfecho final para onde toda hipertensão intracraniana não controlada caminha, e vale entender cada uma pela direção específica do deslocamento de tecido. Na herniação uncal, a porção medial do lobo temporal é empurrada através da incisura da tenda do cerebelo, comprimindo o terceiro par craniano e o mesencéfalo lateralmente, gerando o clássico quadro pupilar que já detalhamos. Na herniação central ou transtentorial, o deslocamento é mais simétrico e descendente, comprimindo o diencéfalo e depois o tronco encefálico de forma bilateral, geralmente com sinais pupilares e motores mais simétricos que na uncal. Na herniação

subfalcina, o giro do cíngulo é empurrado sob a foice cerebral, podendo comprimir a artéria cerebral anterior contra a própria foice e gerar isquemia no território medial frontal, manifestada como fraqueza contralateral predominantemente em membro inferior, já que é essa a representação somatotópica que fica na face medial do lobo frontal. E na herniação tonsilar, as tonsilas cerebelares são empurradas através do forame magno, comprimindo diretamente o bulbo, incluindo seus centros respiratório e cardiovascular, sendo por isso a herniação mais rapidamente fatal de todas, e o motivo pelo qual uma punção lombar é contraindicada em qualquer paciente com sinais de hipertensão intracraniana significativa: a retirada súbita de líquor no espaço lombar pode criar um gradiente de pressão que precipita justamente essa herniação.




Crises convulsivas pós-traumáticas também merecem uma distinção temporal importante. As crises precoces, que ocorrem dentro dos primeiros sete dias, refletem irritação cortical aguda pelo próprio sangue e pelos produtos da lesão primária, enquanto crises tardias, após esse período, geralmente refletem a formação de um foco epileptogênico mais permanente, muitas vezes relacionado ao depósito crônico de hemossiderina no tecido cicatricial. Essa distinção importa porque a profilaxia farmacológica, que veremos em detalhe no capítulo sobre farmacologia, reduz o risco de crises precoces, mas não modifica de forma comprovada o risco de epilepsia tardia.



O eixo hipotálamo-hipofisário, frequentemente lesado em fraturas de base de crânio ou em lesão axonal difusa grave, pode gerar dois distúrbios opostos do metabolismo da água, dependendo de qual parte do circuito é afetada. O diabetes insipidus decorre de produção insuficiente de hormônio antidiurético, levando a perda maciça de água livre pela urina e risco de hipernatremia, enquanto a síndrome de secreção inapropriada do hormônio antidiurético (SIADH) decorre do oposto, secreção excessiva e não regulada desse mesmo hormônio, retendo água livre e gerando hiponatremia, com todo aquele risco de edema cerebral e, se corrigida rápido demais, síndrome de desmielinização osmótica, que já detalhamos no capítulo anterior ao falar sobre os rins.


Vale antecipar algo que vamos detalhar melhor ao falar de hemorragia subaracnóidea aneurismática no capítulo sobre farmacologia: sangue no espaço subaracnóideo pode gerar vasoespasmo tardio pela ação de produtos de degradação da hemoglobina sobre a parede vascular. O mesmo mecanismo se aplica quando a hemorragia subaracnóidea é de origem traumática, e não aneurismática, o vasoespasmo pós-traumático é uma complicação real, embora historicamente menos monitorada e tratada com a mesma agressividade que o vasoespasmo aneurismático, apesar de poder contribuir de forma significativa para isquemia secundária nos dias seguintes ao trauma.



A hidrocefalia pós-traumática é outra complicação que se conecta diretamente à presença de sangue dentro do sistema liquórico. O sangue e seus produtos de degradação podem obstruir mecanicamente as granulações aracnoides, responsáveis pela reabsorção do líquor de volta à circulação venosa, ou gerar um processo inflamatório e fibrótico crônico nesse mesmo local, reduzindo progressivamente a capacidade de reabsorção. O resultado é um acúmulo lento e progressivo de líquor, tipicamente semanas após o trauma inicial, manifestando-se como uma deterioração cognitiva e motora insidiosa que pode facilmente ser confundida com sequela definitiva do próprio trauma, quando na verdade representa um processo potencialmente tratável com derivação liquórica.

Quando existe fístula liquórica, que já detalhamos ao falar de fraturas de base de crânio, existe uma via aberta e contínua entre o ambiente externo, através dos seios paranasais ou do ouvido médio, e o espaço subaracnóideo, e essa comunicação cria risco real de meningite pós-traumática, geralmente pelos mesmos patógenos encapsulados que mencionamos no capítulo sobre o baço e que detalharemos melhor no capítulo sobre bactérias e fungos. Vale um comentário importante aqui, porque é um ponto que costuma surpreender quem espera uma lógica direta de "existe risco de infecção, logo devo usar antibiótico profilático": a evidência atual não sustenta de forma consistente o benefício da antibioticoprofilaxia rotineira nesses casos, e o uso indiscriminado carrega o risco de simplesmente selecionar organismos mais


resistentes caso a infecção realmente ocorra. É um bom lembrete de que nem toda lógica fisiopatológica aparentemente óbvia se traduz automaticamente em benefício clínico comprovado, a fisiopatologia explica o risco, mas não substitui a evidência sobre a intervenção.



Vale ainda destacar a coagulopatia induzida pelo trauma, um fenômeno distinto e mais precoce do que a simples diluição de fatores de coagulação por reposição volêmica agressiva. O próprio tecido lesado libera fator tecidual em quantidade, e a hipoperfusão sistêmica que acompanha politraumatismos mais graves ativa a proteína C, que além de inibir os fatores V e VIII, também potencializa a fibrinólise. O resultado é um estado paradoxal em que o corpo, na tentativa de evitar coagulação excessiva em outros territórios, compromete justamente a capacidade de manter a hemostasia intracraniana, alimentando diretamente aquele fenômeno de progressão hemorrágica das contusões que descrevemos na seção de achados radiológicos.

Por fim, vale abrir uma exceção à nossa regra de olhar só para a fase aguda, e mencionar uma complicação de prazo muito mais longo, a encefalopatia traumática crônica. Diferente de tudo que vimos até aqui nesse capítulo, ela não decorre de um único trauma grave, mas de traumatismos repetidos e muitas vezes leves, o cenário clássico sendo atletas de esportes de contato ao longo de anos de carreira. O substrato patológico é o acúmulo perivascular de proteína Tau hiperfosforilada, preferencialmente nas profundezas dos sulcos


corticais. Vale relembrar o papel normal dessa proteína: ela funciona como os dormentes que sustentam o trilho dos microtúbulos, estabilizando essa via de transporte intracelular; quando hiperfosforilada de forma crônica, ela se desprende dos microtúbulos, deixa de cumprir essa função estrutural e passa a se agregar de forma tóxica dentro do neurônio.



É importante destacar que a confirmação diagnóstica definitiva da encefalopatia traumática crônica ainda depende de exame neuropatológico post-mortem; em vida, o quadro clínico sugestivo (alterações de humor, comportamento e cognição, anos após exposição repetida a impactos) recebe o nome de síndrome de encefalopatia traumática, um diagnóstico de suspeita clínica, não de certeza anatômica.

Capítulo 8.4 | Manejo do paciente.

O atendimento inicial segue a lógica ABCDE padrão de qualquer trauma, com uma ressalva neurológica importante: a coluna cervical deve ser imobilizada até que se prove o contrário, porque um paciente com rebaixamento do nível de consciência não pode ser examinado clinicamente de forma confiável para descartar lesão cervical associada, e o mecanismo de trauma que causa TCE significativo frequentemente é o mesmo capaz de lesar a coluna cervical.



A decisão de solicitar tomografia de crânio e de monitorar a pressão intracraniana de forma invasiva segue critérios clínicos bem estabelecidos, mas o racional fisiológico por trás da monitorização invasiva é simples: permite guiar o tratamento por metas objetivas de pressão de perfusão cerebral, em vez de tratar às cegas. Vale diferenciar rapidamente os dois tipos principais de monitor de pressão intracraniana, porque a escolha entre eles não é arbitrária. O cateter intraparenquimatoso, uma fibra óptica fina inserida diretamente no tecido cerebral, mede a pressão com grande precisão, mas serve apenas para monitorização, ele não trata nada por si só. Já o cateter intraventricular, posicionado dentro do próprio ventrículo lateral, além de medir a pressão, permite a drenagem terapêutica direta de líquor sempre que necessário, aplicando de forma literal a lógica de Monro-Kellie que abrimos esse capítulo: ao remover ativamente um dos três componentes do volume intracraniano, reduz-se a pressão imediatamente, sem depender de nenhum fármaco. Por esse motivo, quando existe dilatação ventricular associada, o cateter intraventricular costuma ser preferido, ele é simultaneamente ferramenta diagnóstica e terapêutica.





Figura 2 - Monitorização da pressão intracraniana

Antes mesmo de qualquer intervenção farmacológica mais invasiva, vale lembrar de uma medida simples, mas fisiologicamente sólida: manter a cabeceira do leito elevada a cerca de trinta graus. Essa posição facilita a drenagem venosa cerebral através das veias jugulares, sem comprometer de forma relevante a pressão arterial média que chega ao encéfalo, reduzindo passivamente o volume sanguíneo venoso intracraniano, o componente mais facilmente deslocável dos três que discutimos na doutrina de Monro-Kellie, e por isso costuma ser uma das primeiras medidas adotadas, antes de qualquer fármaco.

A terapia osmótica é a ferramenta farmacológica mais direta contra a hipertensão intracraniana, e funciona criando um gradiente osmótico entre o sangue e o parênquima cerebral, puxando água do encéfalo edemaciado de volta para o compartimento vascular, de onde pode ser eliminada. O manitol, um diurético osmótico, tem esse efeito e ainda reduz a viscosidade sanguínea, melhorando temporariamente o fluxo microcirculatório, mas às custas de um efeito diurético que pode gerar hipovolemia se usado repetidamente. A salina hipertônica gera um gradiente osmótico semelhante sem esse efeito diurético associado, e por depender menos da integridade da barreira hematoencefálica

para manter seu gradiente ao longo do tempo, tende a ter um efeito rebote menor.




A hiperventilação reduz a pressão intracraniana por um mecanismo já conhecido desse capítulo: a hipocapnia induzida causa vasoconstrição cerebral, reduzindo o volume sanguíneo cerebral e, por consequência, a pressão intracraniana. O problema é que essa mesma vasoconstrição reduz o fluxo sanguíneo cerebral global, e se mantida de forma agressiva ou prolongada, pode empurrar regiões já marginalmente perfundidas para isquemia franca, por isso a hiperventilação hoje é reservada como medida temporária de resgate diante de sinais de herniação iminente, não como estratégia de manutenção.

Quando as medidas clínicas se esgotam, a craniectomia descompressiva aplica de forma literal a lógica da doutrina de Monro-Kellie que abrimos esse capítulo, removendo cirurgicamente parte da caixa óssea para que o encéfalo edemaciado tenha para onde se expandir sem se comprimir internamente contra si mesmo ou herniar através das aberturas naturais do crânio.

Por fim, o controle rigoroso de glicemia e de temperatura completa o manejo, e ambos se conectam diretamente à cascata de lesão secundária que descrevemos na abertura do capítulo: tanto a hiperglicemia quanto a hipertermia aumentam a demanda metabólica neuronal e amplificam a

excitotoxicidade e a produção de radicais livres, alimentando exatamente o mesmo ciclo de dano que estamos tentando conter com todas as outras medidas.



Vale fechar essa seção reforçando que, na prática, esse conjunto de medidas costuma ser aplicado de forma escalonada, e não todas de uma vez: começamos pelas intervenções mais simples e menos invasivas (posicionamento adequado, sedação, correção de temperatura, glicemia e, quando disponível, drenagem liquórica pelo cateter intraventricular), avançamos para a terapia osmótica se a pressão intracraniana permanecer elevada, e reservamos hiperventilação agressiva, coma barbitúrico e craniectomia descompressiva para quando as medidas anteriores já se mostraram insuficientes, exatamente a lógica de reserva de complacência que abrimos esse capítulo: quanto mais medidas você precisa somar, mais perto o paciente está do limite daquela curva de pressão-volume. E, dado tudo que vimos sobre coagulopatia induzida pelo trauma, vale reforçar que a correção ativa de qualquer distúrbio de coagulação, seja ele induzido pelo próprio trauma ou por anticoagulação prévia do paciente, corre em paralelo a todas essas medidas, já que nenhuma terapia osmótica ou cirúrgica compensa um sangramento que continua progredindo por falta de hemostasia adequada.

E aqui fica claro o fio condutor desse capítulo: praticamente todo o manejo do TCE grave não trata a lesão primária, que já aconteceu e é irreversível, ele existe inteiramente para interromper a cascata de lesão secundária antes que ela se torne tão extensa quanto a lesão original.


Capítulo 9 | Desenvolvimento Neural.

Até aqui construímos praticamente todo o raciocínio desse livro em cima do sistema nervoso já maduro, seja ele saudável ou doente. Esse capítulo pede um raciocínio diferente, porque o sistema nervoso de uma criança não é simplesmente uma versão menor do sistema nervoso adulto, ele está ativamente se construindo, e boa parte da semiologia pediátrica só faz sentido quando entendemos esse processo de construção em andamento. Vamos deixar a embriologia detalhada e as más formações para os capítulos mais à frente, dedicados especificamente a esse tema, e focar aqui no que todo estudante de medicina precisa carregar na prática: como reconhecer o desenvolvimento neurológico normal, entender por que ele segue essa sequência específica, e identificar quando algo foge do esperado.



Antes de entrarmos nos marcos propriamente ditos, vale estabelecer muito brevemente a origem anatômica de tudo isso. Por volta da terceira e quarta semana de vida embrionária, o tubo neural se fecha e rapidamente se diferencia em três vesículas primárias (prosencéfalo, mesencéfalo e rombencéfalo), que por sua vez originam as cinco vesículas secundárias que já conhecemos das estruturas que discutimos no capítulo 1, telencéfalo e diencéfalo a partir do prosencéfalo, mesencéfalo permanecendo como está, e metencéfalo e mielencéfalo a partir do rombencéfalo. Não vamos nos


aprofundar na genética molecular por trás dessa diferenciação aqui, isso temos reservado para o capítulo sobre genética; o que importa reter agora é que, ao nascimento, essa arquitetura básica já está toda montada, mas ainda está longe de estar funcionalmente pronta. E é exatamente esse "longe de estar pronto" que organiza esse capítulo inteiro, e o conceito central por trás disso é a plasticidade neural.



(Essa imagem mostra um tumor sólido dentro do encéfalo, trouxe essa imagem para mostrar que mesmo essa alteração a sintomatologia será dada pela hidrocefalia compressiva, porem vai afetar muito pouco os neurônios ao redor da massa devido a grande neuroplasticidade infantil).

Já tocamos brevemente nesse tema quando conversamos sobre reorganização hemisférica de linguagem após lesões precoces: uma criança pequena com lesão no hemisfério esquerdo muitas vezes consegue reorganizar a função de linguagem quase inteiramente para o hemisfério direito, com sequela mínima, algo praticamente impossível num adulto com lesão equivalente. Pois bem, esse fenômeno não é uma curiosidade isolada, é a regra durante toda a infância. O cérebro nasce com um excesso de sinapses, muito acima do que será mantido na vida adulta, e ao longo da infância um processo de poda sináptica, guiado pela experiência e pela atividade neuronal, vai eliminando as conexões pouco usadas e fortalecendo as mais utilizadas.

Existem inclusive janelas temporais, chamadas de períodos críticos ou sensíveis, em que determinadas funções (a aquisição de linguagem sendo o exemplo mais estudado) são aprendidas com muito mais eficiência do que em qualquer outro momento da vida, e é justamente esse excesso inicial de plasticidade que permite as recuperações notáveis que vemos em lesões neurológicas pediátricas precoces.



Uma segunda peça fundamental para entender o desenvolvimento neurológico é a mielinização, e aqui existe uma correlação direta e muito cobrada entre o avanço da mielinização e a aquisição dos marcos motores. A mielinização não termina ao nascimento, ela continua de forma intensa ao longo dos primeiros dois anos de vida, e de forma mais lenta, em determinadas áreas associativas e no córtex pré-frontal, até a vida adulta jovem. Ela segue, de forma geral, uma direção proximal antes de distal e central antes de periférica; o trato corticospinal, por exemplo, vai completando sua mielinização progressivamente ao longo dos primeiros dois anos, e isso explica diretamente por que um recém-nascido não tem controle motor fino algum, o "fio" existe anatomicamente, mas ainda não está "isolado" o suficiente para conduzir com a velocidade e precisão necessárias para movimentos voluntários refinados. O exemplo mais didático disso é o sinal de Babinski: em um adulto, a resposta plantar extensora é sinal de lesão de neurônio motor superior, mas em um lactente até aproximadamente doze a vinte e quatro meses de idade, essa mesma resposta é completamente normal,

precisamente porque o trato corticospinal ainda não está mielinizado o suficiente para exercer sua influência inibitória habitual sobre esse reflexo espinhal.

Reflexo de preensão palmar	0 – 4/5 meses	Realiza preensão na região palmar.	Flexão dos dedos.	
Reflexo de preensão plantar	0 – 9/12 meses	Realizar preensão na face plantar dos pés do bebê na região distal dos metatarsos.	Flexão dos dedos dos pés	

Os reflexos primitivos seguem essa mesma lógica de maturação, e valem ser entendidos como um grupo, não como itens soltos para decorar separadamente. Eles são reflexos mediados por circuitos do tronco encefálico e da medula, presentes desde o nascimento, e sua presença nos primeiros meses é normal e esperada, exatamente porque o córtex ainda não amadureceu o suficiente para exercer sua inibição descendente habitual sobre esses circuitos mais primitivos. O reflexo de Moro, provocado por uma sensação súbita de queda ou extensão brusca da cabeça, gera abertura e depois fechamento dos braços num movimento de abraço, e reflete integração vestibular; ele desaparece por volta dos quatro a seis meses. O reflexo de preensão palmar, ativado ao tocar a palma da mão do bebê, desaparece por volta dos cinco a seis meses, à medida que a preensão voluntária vai assumindo esse papel. Os reflexos de busca e sucção, essenciais para a alimentação nos primeiros meses, são mediados por circuitos trigeminais e faciais no tronco encefálico e vão perdendo dominância por volta dos quatro meses. E o reflexo tônico cervical assimétrico, a clássica postura de esgrimista quando a cabeça do bebê é virada para um lado, desaparece por volta dos seis meses.


Reflexo	Idade	Estímulo	Resposta	Imagem
Reflexo de Moro	0 – 4 meses	Barulho próximo, puxar o lençol em que o bebê está deitado (dar susto)	O bebê joga a cabeça para trás, estende os braços e as pernas, chora e depois puxa os braços e as pernas para dentro	
Reflexo de sucção	0 – 3/5 meses	Tocar os lábios e a parte interna da boca.	Movimentos rítmicos, língua em cânula, movimentos ondulatórios. (movimento de sucção)	

O ponto mais importante clinicamente não é decorar cada idade isoladamente, é entender o princípio geral: a persistência de qualquer um desses reflexos além da idade esperada é sinal de alerta para uma falha na maturação do controle cortical inibitório, um achado clássico, por exemplo, em quadros de paralisia cerebral, onde a persistência do reflexo tônico cervical assimétrico especificamente atrapalha o desenvolvimento do uso simétrico e coordenado das mãos na linha média. Com esses dois princípios em mãos, plasticidade e mielinização progressiva, os marcos do desenvolvimento deixam de ser uma lista arbitrária de idades e passam a fazer sentido como consequência direta desses processos. No domínio motor grosseiro, o controle cefálico surge por volta de dois a três meses, à medida que a musculatura extensora cervical se fortalece e a integração vestibular amadurece; sentar sem apoio surge entre seis e oito meses, quando o controle de tronco já é suficiente; e a marcha independente, tipicamente entre doze e quinze meses, exige não só mielinização corticospinal suficiente para permitir movimento alternado e voluntário das pernas, como também integração cerebelar e vestibular madura o bastante para sustentar equilíbrio bípede, e a supressão adequada de reflexos primitivos que, se persistentes, atrapalhariam esse padrão de marcha voluntário.

Reflexo de busca	0 – 3 meses	Tocar região perioral quando o bebê está com fome	Virar a cabeça e os lábios na direção do estímulo	


No domínio motor fino, a evolução também acompanha diretamente o grau de mielinização e refinamento do controle corticospinal distal: a preensão palmar grosseira, ainda dependente de flexão global da mão, aparece por volta de quatro a cinco meses; evolui para uma pinça inferior, entre polegar e lateral do indicador, por volta de sete a nove meses; e só se torna uma pinça superior verdadeira, entre as polpas digitais do polegar e indicador, por volta de nove a doze meses. Essa é, na verdade, uma das habilidades motoras mais exigentes neurologicamente que existem, porque depende de controle isolado e independente de dedos individuais, algo que exige as fibras corticospinais mais distais e mais tardiamente mielinizadas de todas.

No domínio da linguagem, os sons vocálicos simples, o famoso "balbucio", surgem por volta dos seis meses, interessantemente até em bebês surdos congênitos nesse estágio inicial, sugerindo que existe um componente motor inato de geração de padrões vocálicos que antecede qualquer moldagem pelo feedback auditivo; esse feedback só vai se tornar indispensável nas etapas seguintes. As primeiras palavras surgem por volta dos doze meses, e frases de duas palavras entre dezoito e vinte e quatro meses. Esse amadurecimento acompanha a mielinização progressiva do fascículo arqueado, o trato que conecta a área de Wernicke à área de Broca, e se apoia sobre uma base anatômica que, como já discutimos, está estruturalmente presente desde o nascimento, já que o planum temporale costuma ser mensuravelmente maior no hemisfério esquerdo em recém-nascidos, mas a maturação funcional plena dessa arquitetura ainda leva anos para se completar. No domínio social e cognitivo, o sorriso social surge por volta de seis a oito semanas, refletindo maturação do sistema límbico e do córtex orbitofrontal; a ansiedade de estranhos surge por volta de oito a dez meses, refletindo maturação da memória de reconhecimento hipocampal suficiente para que o bebê consiga diferenciar rostos familiares de rostos novos; e a noção de permanência de objeto, entender que um objeto continua existindo mesmo fora do campo de visão, surge nesse mesmo período, refletindo maturação da memória de trabalho pré-frontal.



The parts of the brain involved in memory *(Illustration by Levent Efe)*

Além dos marcos, o próprio crescimento do crânio funciona como um marcador indireto muito útil do crescimento cerebral, e aqui vale uma inversão interessante da lógica de Monro-Kellie que veremos no próximo capítulo: enquanto no adulto o crânio é uma caixa rígida de volume fixo, no lactente as suturas e fontanelas permanecem deliberadamente abertas, exatamente para permitir que o encéfalo, que praticamente quadruplica de volume nos primeiros anos de vida, tenha espaço físico para crescer sem gerar hipertensão intracraniana no processo. A fontanela posterior fecha bem cedo, por volta de dois a três meses, enquanto a fontanela anterior, maior e mais palpável, fecha entre nove e dezoito meses. Uma fontanela abaulada sugere hipertensão intracraniana (hidrocefalia, meningite), enquanto uma fontanela deprimida sugere desidratação, e o perímetro cefálico que cresce de forma desproporcionalmente rápida ou lenta em relação às curvas de referência deve sempre levantar a suspeita de um processo patológico subjacente, seja ele hidrocefalia, seja uma falha primária de neurogênese.



Fechando esse capítulo, existe uma distinção clínica que vale mais do que qualquer marco isolado que você possa decorar: a diferença entre atraso e regressão do desenvolvimento. Uma criança com atraso alcança os marcos mais lentamente que o esperado, mas continua progredindo, sempre na direção certa; isso costuma refletir uma lesão estática, já ocorrida e não progressiva, como uma lesão hipóxico-isquêmica perinatal ou uma síndrome genética estrutural. Já uma criança que perde marcos já conquistados, que falava e para de falar, que andava e para de andar, está sinalizando algo bem mais grave, um processo ativo e em curso, tipicamente uma doença neurodegenerativa ou metabólica progressiva, como as doenças de depósito lisossômico ou distúrbios mitocondriais que vamos detalhar melhor no capítulo sobre genética. Essa distinção, atraso versus regressão, é exatamente o mesmo tipo de raciocínio "estático versus progressivo" que usamos repetidamente em neurologia adulta, só que aplicado num contexto onde o próprio sistema nervoso ainda está em pleno processo de construção, e é esse fio condutor, mais do que qualquer tabela de idades, que espero que você carregue desse capítulo.

Capítulo 10 | Farmacologia.

Todos os capítulos anteriores desse livro foram, de um jeito ou de outro, sobre como as coisas dão errado, um vaso que rompe, uma via que se degenera, uma toxina que bloqueia um canal, um órgão que falha e intoxica o sistema nervoso. Esse capítulo fecha o círculo: agora que entendemos o mecanismo por trás de cada uma dessas doenças, conseguimos entender também por que cada fármaco funciona, ou não funciona, daquele jeito específico. Nenhum medicamento age por mágica, ele sempre se encaixa em algum ponto específico da cascata fisiopatológica que já discutimos, seja restaurando um sinal que está faltando, bloqueando um sinal que está em excesso, corrigindo uma consequência estrutural de um processo já em curso, ou neutralizando diretamente uma molécula nociva antes que ela cause dano.




Vamos percorrer os principais fármacos usados em neurologia organizados pelo contexto clínico em que são usados, sempre voltando para o mecanismo de doença que já construímos nos capítulos anteriores, e dessa vez com mais

fôlego, porque esse é um capítulo que merece profundidade.

Capítulo 10.1 | No tratamento de um AVC.


Para entender a farmacologia do AVC isquêmico, primeiro precisamos relembrar rapidamente um conceito central: dentro da área isquêmica existe um núcleo já irreversivelmente infartado e, ao redor dele, uma zona de penumbra, tecido hipoperfundido mas ainda viável, sustentado por fluxo colateral. Toda a farmacologia do AVC agudo existe para salvar essa penumbra antes que ela também infarte, e é uma corrida contra o tempo. A alteplase, um ativador de plasminogênio tecidual recombinante, converte plasminogênio em plasmina, que por sua vez degrada a rede de fibrina que sustenta o trombo, promovendo sua dissolução e restaurando o fluxo sanguíneo através do vaso ocluído.



A janela terapêutica estreita não é arbitrária, ela reflete diretamente a viabilidade decrescente da penumbra ao longo do tempo e o risco crescente de transformação hemorrágica, porque quanto mais tempo um vaso permanece isquêmico, mais frágil sua parede fica (em boa parte pela ativação de metaloproteinases de matriz que degradam a lâmina basal do próprio vaso), e reperfundir um vaso já estruturalmente comprometido aumenta o risco de sangramento no próprio tecido recém-reperfundido. Mais recentemente, a tenecteplase vem ganhando espaço como alternativa, ela é uma variante

geneticamente modificada da própria alteplase, com maior especificidade pela fibrina do trombo (gerando menos degradação sistêmica de fibrinogênio) e meia-vida mais longa, o que permite administrá-la em bólus único em vez da infusão contínua de uma hora que a alteplase exige, uma vantagem logística relevante quando cada minuto de atraso significa mais penumbra perdida.

Para prevenção secundária, a escolha do antiagregante ou anticoagulante depende diretamente da causa do AVC identificada, mais um motivo pelo qual entender a origem cardioembólica que discutimos no capítulo anterior importa tanto na prática. Em AVCs não cardioembólicos, tipicamente por doença aterosclerótica de pequenos ou grandes vasos, usamos antiagregantes: o ácido acetilsalicílico inibe irreversivelmente a ciclo-oxigenase 1 plaquetária, reduzindo a produção de tromboxano A2 e, consequentemente, a agregação plaquetária, enquanto o clopidogrel bloqueia de forma irreversível o receptor P2Y12, impedindo a ativação plaquetária mediada por ADP. Vale notar que, em AVCs isquêmicos menores ou ataques isquêmicos transitórios de alto risco, as duas classes costumam ser combinadas por um período curto (a chamada dupla antiagregação), já que a plaqueta tem múltiplas vias de ativação convergentes, bloquear apenas uma delas (tromboxano ou ADP) deixa a outra livre para ainda promover alguma agregação, e cobrir as duas simultaneamente reduz o risco de recorrência precoce numa janela em que o risco é maior, sem prolongar essa combinação além do necessário, pelo risco hemorrágico que ela também carrega.




Já quando a origem é cardioembólica, como na fibrilação atrial que já detalhamos, antiagregantes são insuficientes, porque o trombo se formou por estase de fluxo, não por lesão endotelial, e a resposta correta é a anticoagulação plena, seja com varfarina, antagonizando a ativação de fatores de coagulação dependentes de vitamina K, ou com os anticoagulantes orais diretos mais modernos. As estatinas entram na prevenção secundária por um motivo que vai além da simples redução do LDL: elas estabilizam a placa aterosclerótica existente, reduzindo seu conteúdo lipídico e seu infiltrado inflamatório e espessando a capa fibrosa que a recobre, tornando-a menos propensa a romper e formar um novo trombo, um efeito conhecido como pleiotrópico, que se soma, mas não se resume, à simples redução do colesterol circulante.

 (TC Cardioembólico)

Por fim, vale mencionar o manejo pressórico na fase aguda, porque é um dos pontos mais contraintuitivos da farmacologia do AVC: na fase aguda do AVC isquêmico, geralmente se tolera uma pressão arterial mais elevada que o habitual, o que chamamos de hipertensão permissiva. Isso porque, dentro da zona de penumbra, a autorregulação cerebral local está tipicamente perdida, o fluxo sanguíneo ali passa a depender quase diretamente da pressão arterial sistêmica, e reduzir a pressão de forma agressiva nesse momento pode reduzir ainda mais a perfusão da penumbra e converter tecido que ainda poderia ser salvo em infarto definitivo.


Tudo isso que descrevemos até aqui vale para o AVC isquêmico, mas o AVC hemorrágico exige uma lógica farmacológica quase espelhada, e entender esse contraste é tão importante quanto entender cada mecanismo isoladamente.



Aqui não existe penumbra a proteger no mesmo sentido, existe um sangramento ativo dentro de um espaço já fisicamente limitado, então o objetivo deixa de ser "manter pressão para perfundir tecido em risco" e passa a ser "reduzir pressão para limitar a expansão do hematoma", por isso o manejo pressórico no AVC hemorrágico agudo é o oposto do isquêmico, controle intensivo e precoce da pressão arterial, não permissividade. Quando o sangramento ocorre num paciente anticoagulado, a farmacologia se volta para reversão rápida do efeito anticoagulante: na varfarina, usamos vitamina K (repondo o substrato que o fármaco bloqueia) associada a complexo protrombínico (repondo diretamente os próprios fatores de coagulação já ativos, mais rápido do que esperar a vitamina K induzir nova síntese hepática); nos inibidores diretos da trombina como a dabigatrana, existe um antídoto específico, o idarucizumabe, um fragmento de anticorpo que se liga à dabigatrana livre no plasma com afinidade muito maior do que a própria trombina, sequestrando o fármaco e neutralizando seu efeito quase instantaneamente; e nos inibidores do fator Xa, existe o andexanet alfa, uma proteína modificada que imita o fator Xa e funciona como um "chamariz", absorvendo o inibidor e liberando o fator Xa endógeno para retomar a cascata de coagulação normal.

Quando o sangramento subaracnóideo é de origem aneurismática, ligando de volta ao capítulo sobre anatomia vascular, a nimodipina, um bloqueador de canal de cálcio com relativa seletividade pelos vasos cerebrais, é usada rotineiramente para prevenir o vasoespasmo tardio que costuma surgir dias depois do sangramento inicial, reduzindo o influxo de cálcio na musculatura

lisa vascular e mantendo esses vasos mais complacentes durante a janela de maior risco isquêmico secundário.




(TCs de AVC Hemorrágico)

Capítulo 10.2 | No tratamento oncológico.

A dexametasona é provavelmente o fármaco mais usado no manejo sintomático imediato de tumores cerebrais, e seu mecanismo se conecta diretamente ao que já discutimos no capítulo sobre oncologia a respeito da barreira hematoencefálica e dos pericitos: tumores cerebrais frequentemente produzem VEGF em excesso, tornando os vasos ao redor do tumor anormalmente permeáveis e gerando edema vasogênico significativo no tecido


adjacente. Os corticosteroides reduzem essa permeabilidade vascular, ajudando a restaurar parcialmente a integridade das junções entre células endoteliais, e o alívio sintomático que se vê horas depois da administração reflete diretamente essa redução de edema, não qualquer efeito direto sobre o tumor em si.



Em quadros de efeito de massa mais agudo e grave, a mesma terapia osmótica com manitol que já detalhamos no capítulo sobre TCE também tem seu lugar aqui, o mecanismo de gradiente osmótico puxando água do parênquima edemaciado não muda dependendo se a causa do edema é trauma ou tumor.

A temozolomida, um agente alquilante usado principalmente no glioblastoma, atua metilando o DNA tumoral, principalmente na posição O6 da guanina, uma lesão que, se não reparada, leva a erros de pareamento durante a replicação e desencadeia apoptose da célula tumoral. Vale mencionar, sem entrar na genética mais profunda que reservamos para outro capítulo, que a eficácia desse fármaco depende bastante da atividade de uma enzima de reparo específica do próprio tumor, que quando está pouco ativa, torna o tumor mais sensível ao efeito da temozolomida, e quando está muito ativa, confere resistência ao tratamento.


O bevacizumabe, um anticorpo monoclonal anti-VEGF, bloqueia diretamente o mesmo sinal que a dexametasona combate indiretamente, reduzindo a angiogênese tumoral desregulada e, ao menos temporariamente, "normalizando" a arquitetura vascular ao redor do tumor, o que também reduz edema, embora seu impacto real sobre sobrevida global ainda seja um tema debatido na literatura.



Dois pontos adicionais valem menção nesse contexto, menos centrais que os anteriores, mas frequentemente esquecidos. O primeiro é o antiemético de escolha para pacientes em quimioterapia, a ondansetrona, um antagonista do receptor de serotonina 5-HT3. O mecanismo tem um detalhe anatômico bonito: ela age tanto perifericamente, bloqueando aferências vagais do trato gastrointestinal, quanto centralmente, na área postrema, uma das poucas regiões do sistema nervoso central que fica fora da barreira hematoencefálica justamente para funcionar como um sensor direto de toxinas circulantes, incluindo os próprios quimioterápicos. O segundo é a escolha de anticonvulsivante quando há necessidade de profilaxia em paciente oncológico, geralmente preferimos o levetiracetam justamente pelo mecanismo que já vimos no capítulo sobre TCE, ele não depende do sistema microssomal hepático do citocromo P450 para ser metabolizado, evitando interações imprevisíveis com os próprios quimioterápicos, que costumam depender fortemente dessa mesma via.

Por fim, vale registrar que a imunoterapia moderna, os inibidores de checkpoint imunológico usados em diversos tumores sólidos, embora não sejam fármacos oncológicos voltados especificamente ao sistema nervoso, podem gerar como efeito colateral uma resposta autoimune contra o próprio tecido neural, incluindo quadros de encefalite autoimune, o mesmo tipo de


mecanismo que mencionamos ao falar sobre encefalite pós-herpética, só que aqui deflagrado pela remoção artificial dos freios naturais do sistema imune, e não por uma infecção prévia expondo antígenos neuronais.



Capítulo 10.3 | No tratamento de demências.

Os inibidores da acetilcolinesterase, como a donepezila e a rivastigmina, partem de uma observação fisiopatológica central da doença de Alzheimer: a

degeneração precoce e proeminente dos neurônios colinérgicos do núcleo basal de Meynert, uma das principais fontes de acetilcolina para o córtex cerebral e o hipocampo. Ao inibir a enzima que degrada a acetilcolina na fenda sináptica, esses fármacos prolongam a disponibilidade do pouco neurotransmissor que ainda está sendo produzido, numa tentativa de compensar parcialmente esse déficit colinérgico, sem, no entanto, deter a degeneração neuronal de base.




Vale diferenciar rapidamente os dois: a donepezila é seletiva para a acetilcolinesterase, enquanto a rivastigmina inibe tanto a acetilcolinesterase quanto uma segunda enzima, a butirilcolinesterase, que também degrada acetilcolina e cuja atividade relativa tende a aumentar conforme a doença progride, o que na teoria daria à rivastigmina um espectro de ação um pouco mais amplo em fases mais avançadas, ainda que a diferença clínica prática entre as opções seja discreta.

A memantina segue uma lógica completamente diferente: ela é uma antagonista do receptor NMDA, mas de um tipo específico, de baixa afinidade e dependente de voltagem, o que na prática significa que ela bloqueia preferencialmente a ativação tônica e patológica desse receptor por glutamato cronicamente elevado, um mecanismo excitotóxico de baixo grau que contribui para a progressão da doença, sem bloquear de forma relevante a ativação

fásica e fisiológica desse mesmo receptor durante a formação normal de memórias, que depende justamente de sinalização NMDA íntegra.

É um equilíbrio farmacológico elegante, proteger contra o excesso crônico sem eliminar o sinal fisiológico necessário. Mais recentemente, anticorpos monoclonais anti-amiloide, como o lecanemabe, entraram no arsenal terapêutico, atuando diretamente na remoção das placas amiloides extracelulares.



O benefício clínico observado até agora é modesto, e vale destacar um efeito colateral característico desse mecanismo, as chamadas anormalidades de imagem relacionadas ao amiloide (ARIA), essencialmente edema ou microhemorragias que decorrem da própria remoção de amiloide depositado também nas paredes dos vasos cerebrais (angiopatia amiloide), um lembrete de que mesmo tratamentos direcionados ao mecanismo exato da doença carregam seus próprios riscos mecanísticos específicos. Um último ponto nesse tópico é mais um alerta farmacológico do que propriamente um tratamento, mas é extremamente relevante na prática e adora aparecer em prova: pacientes com demência por corpos de Lewy têm uma hipersensibilidade marcante a antipsicóticos, especialmente os típicos ou de alta potência antidopaminérgica.

Como a própria patologia de corpos de Lewy já reduz de forma significativa a transmissão dopaminérgica nigroestriatal, sobrepor um bloqueio farmacológico adicional de receptores D2 pode precipitar um quadro grave, às vezes irreversível, de rigidez extrema, disfunção autonômica e rebaixamento de consciência, muito semelhante à síndrome neuroléptica maligna que já vimos no capítulo sobre fármacos em superdose, mas aqui deflagrada em dose terapêutica habitual, não em excesso. É um dos motivos pelos quais o

uso de antipsicóticos para controlar sintomas comportamentais em qualquer paciente idoso com demência é feito com cautela redobrada, os antipsicóticos atípicos carregam, inclusive, um alerta formal de aumento de mortalidade e de risco cerebrovascular nessa população específica, o que reforça que "sedar o comportamento" nunca deve ser a primeira escolha nesse grupo de pacientes.





Fig 1. SMRI revealed diffuse cortical atrophy, mainly on the temporal lobes, being the left more atrophyc than the right. Hippocampal gyri were normal, specially when they were compared with the temporal lobes.



Capítulo 10.4 | No tratamento de intoxicações.

Já dedicamos boa parte dos capítulos 6.2 e 6.4 a detalhar profundamente a farmacologia dos antídotos específicos para cada toxina, então aqui vale mais consolidar a lógica geral, e acrescentar uma quarta categoria que ainda não tínhamos formalizado, do que repetir o que já foi dito. Praticamente todo antídoto se encaixa em uma de quatro categorias.

A primeira é reversão por competição direta no receptor, como o flumazenil no sítio benzodiazepínico do receptor GABA-A, ou a naloxona nos receptores opioides muscarínicos. A segunda é reativação de uma enzima bloqueada, como a pralidoxima na acetilcolinesterase inibida por organofosforados. A terceira é reposição de um substrato consumido antes que o dano estrutural se instale, como a N-acetilcisteína repondo glutationa no paracetamol, ou o próprio fomepizol competindo pela álcool desidrogenase no metanol. E a quarta, que vale detalhar melhor aqui, é a neutralização molecular direta, o antídoto não age sobre um receptor nem sobre uma enzima do próprio organismo, ele se liga fisicamente à molécula tóxica circulante e a torna inerte.

O exemplo clássico é o fragmento de anticorpo antidigoxina, usado na intoxicação digitálica grave: esses fragmentos se ligam à digoxina livre no plasma com afinidade maior do que a própria bomba Na+/K+-ATPase que ela normalmente bloqueia, criando um gradiente de concentração que puxa a digoxina de volta dos tecidos para o sangue, de onde o complexo antígeno-anticorpo, agora inerte, é eliminado pelos rins.

Vale ainda mencionar um exemplo interessante dentro da própria categoria de competição direta em receptor, porque ele ilustra bem como um pequeno detalhe farmacocinético muda tudo: no manejo da síndrome anticolinérgica central (delirium, agitação, midríase, taquicardia, causado por excesso de bloqueio muscarínico, seja por fármacos anticolinérgicos ou por certas plantas e cogumelos), usamos fisostigmina, e não neostigmina, mesmo as duas sendo inibidoras da acetilcolinesterase. A diferença está na estrutura molecular, a fisostigmina é uma amina terciária, lipossolúvel o suficiente para atravessar a barreira hematoencefálica e reverter o componente central do delirium, enquanto a neostigmina é uma amina quaternária, carregada e hidrossolúvel, que fica restrita ao compartimento periférico, sendo útil para reverter efeitos periféricos, mas inútil para o componente central que é justamente o mais perigoso nesse quadro.

Reconhecer em qual dessas categorias um antídoto se encaixa, e prestar atenção em detalhes farmacocinéticos como esse, mais do que decorar cada nome isoladamente, é o que permite prever, diante de uma intoxicação nova que você nunca estudou especificamente, que tipo de intervenção

provavelmente vai funcionar.


Capítulo 10.5 | No paciente do trauma.

A terapia osmótica com manitol e salina hipertônica já foi detalhada extensamente no capítulo anterior, sobre o manejo do TCE, e o mecanismo se mantém idêntico aqui. A profilaxia anticonvulsivante no paciente de trauma cranioencefálico grave geralmente usa fenitoína ou levetiracetam nos primeiros sete dias, período de maior risco de crises precoces por irritação cortical direta pelo sangue e pelo tecido lesado. A fenitoína bloqueia canais de sódio voltagem-dependentes de forma uso-dependente, estabilizando membranas hiperexcitadas sem suprimir tanto a atividade neuronal normal, enquanto o levetiracetam atua por um mecanismo bem diferente, ligando-se à proteína SV2A das vesículas sinápticas e modulando a liberação de neurotransmissores, com a vantagem prática de menor interação medicamentosa e menor necessidade de monitorização de nível sérico. Vale reforçar que essa profilaxia reduz o risco de crises precoces, mas não reduz o risco de epilepsia tardia, que segue um mecanismo mais relacionado à cicatrização gliótica crônica do que à irritação aguda inicial.



Um fármaco que vale a pena detalhar aqui, e que não tínhamos mencionado antes, é o ácido tranexâmico, cada vez mais usado precocemente no trauma cranioencefálico moderado a grave. Ele é um antifibrinolítico, atua bloqueando os sítios de ligação da lisina no plasminogênio, impedindo que ele se converta

em plasmina e, consequentemente, impedindo a degradação prematura dos coágulos que o próprio organismo está formando para conter o sangramento. Repare que esse mecanismo é o espelho exato do que a alteplase faz no AVC isquêmico, lá queremos degradar um trombo indesejado ativando plasmina, aqui queremos preservar um coágulo desejado inibindo essa mesma via, o mesmo sistema fisiológico sendo manipulado em direções opostas dependendo se o objetivo é dissolver ou preservar um coágulo.



Para sedação em pacientes com hipertensão intracraniana, o propofol é amplamente usado por potencializar a transmissão GABAérgica, o que reduz a taxa metabólica cerebral de consumo de oxigênio, e como o fluxo sanguíneo cerebral acompanha essa demanda metabólica, o resultado indireto é redução do volume sanguíneo cerebral e, portanto, da pressão intracraniana. A cetamina, antagonista do receptor NMDA, foi historicamente evitada nesse contexto por preocupação teórica de elevação da pressão intracraniana, embora evidências mais recentes tenham questionado a magnitude real desse risco, um bom exemplo de como o entendimento farmacológico de um mesmo fármaco pode evoluir com o tempo. Quando a hipertensão intracraniana permanece refratária a todas essas medidas, o coma barbitúrico induzido por tiopental ou pentobarbital entra como recurso de exceção, os barbitúricos

potencializam a transmissão GABAérgica de forma ainda mais intensa que o propofol e suprimem diretamente a taxa metabólica cerebral a níveis muito baixos, mas ao custo de hipotensão significativa e imunossupressão, exigindo suporte hemodinâmico agressivo em paralelo, geralmente com vasopressores como a noradrenalina, cujo papel aqui não é neurológico direto, mas sim garantir uma pressão arterial média suficiente para manter a pressão de perfusão cerebral dentro da meta, voltando exatamente à equação que já vimos no capítulo anterior.





Capítulo 10.6 | De uso contínuo.

No tratamento de manutenção da epilepsia, os principais fármacos seguem, no fundo, dois grandes mecanismos que já vimos se repetir ao longo desse livro: estabilização de membrana por bloqueio de canal de sódio, compartilhado pela carbamazepina e pela lamotrigina, essa última com um efeito adicional de redução da liberação pré-sináptica de glutamato, ou potencialização GABAérgica, como no valproato de sódio, que aumenta a disponibilidade de GABA por múltiplos mecanismos, incluindo a inibição da enzima que o degrada.

No tratamento da doença de Parkinson, a levodopa continua sendo o pilar terapêutico: ela é o precursor direto da dopamina e, diferente da própria dopamina, consegue atravessar a barreira hematoencefálica. Ela é sempre associada a um inibidor periférico da enzima que a converteria em dopamina fora do sistema nervoso central (a carbidopa), justamente para evitar que essa conversão aconteça precocemente na periferia, o que tanto desperdiçaria o fármaco quanto geraria efeitos colaterais sistêmicos indesejados, maximizando assim a quantidade de levodopa que efetivamente chega ao encéfalo para ser convertida em dopamina localmente, exatamente onde ela faz falta.





Figura 3. Ausência de lesão na substância branca. Paciente com diagnóstico de doença de Parkinson. Este foi o achado mais freqüente nos três grupos estudados. Imagem obtida na seqüência de pulso TSE, ponderada em FLAIR (TR: 7.100; TE: 22).

Ao redor desse pilar central gira uma constelação de outras classes, cada uma explorando um ponto diferente da mesma via dopaminérgica. Os agonistas dopaminérgicos diretos, como o pramipexol e o ropinirol, ativam os receptores D2 e D3 diretamente, sem depender de nenhuma conversão enzimática prévia, o que pode ser vantajoso justamente porque a maquinaria enzimática de conversão de levodopa em dopamina também vai se perdendo progressivamente conforme os neurônios dopaminérgicos degeneram. Os inibidores da MAO-B, como a selegilina, reduzem o catabolismo tanto da dopamina endógena remanescente quanto da dopamina gerada a partir da levodopa administrada, prolongando a disponibilidade sináptica do pouco neurotransmissor que ainda circula. E os inibidores da COMT, como a entacapona, bloqueiam uma via alternativa de degradação periférica da própria levodopa antes que ela consiga atravessar a barreira hematoencefálica, prolongando sua meia-vida efetiva e suavizando as flutuações motoras (o fenômeno de "wearing off") que se tornam mais frequentes com o uso prolongado de levodopa isolada.



(Famoso sinal do cavalo marinho)

Por fim, os anticolinérgicos, como o triexifenidil, atacam o problema por um ângulo indireto: no estriado normal existe um equilíbrio entre a atividade dopaminérgica e a atividade colinérgica local, quando a dopamina cai, esse equilíbrio se desloca para um relativo excesso colinérgico, que contribui especificamente para o tremor, bloquear receptores muscarínicos estriatais ajuda a restaurar parcialmente esse equilíbrio, embora esses fármacos sejam usados com cautela em idosos pelo risco de efeitos colaterais cognitivos.

No manejo da dor neuropática crônica, a gabapentina e a pregabalina merecem uma ressalva importante que costuma confundir muita gente pelo próprio nome: apesar do nome remeter ao GABA, elas não atuam diretamente sobre receptores GABAérgicos. Seu mecanismo real é a ligação à subunidade alfa-2-delta de canais de cálcio voltagem-dependentes, reduzindo o influxo de cálcio nos terminais pré-sinápticos de neurônios sensibilizados e, consequentemente, reduzindo a liberação excessiva de neurotransmissores excitatórios envolvidos na transmissão da dor neuropática.

Um segundo grupo importante nesse contexto são os antidepressivos

tricíclicos em dose baixa, classicamente a amitriptilina, que na dor crônica não estão sendo usados pelo efeito antidepressivo, mas pelo bloqueio da recaptação de serotonina e noradrenalina na fenda sináptica medular, reforçando as vias descendentes inibitórias de dor que partem do tronco encefálico em direção ao corno posterior da medula, um mecanismo completamente distinto do bloqueio de canal de cálcio da gabapentina, o que inclusive justifica associar as duas classes em casos refratários.

Ainda dentro de "uso contínuo", vale mencionar rapidamente a profilaxia da enxaqueca crônica, que reúne fármacos de propósitos originalmente bem diferentes reaproveitados por mecanismos convenientes. O topiramato, por exemplo, atua por múltiplos mecanismos simultâneos, potencialização GABAérgica, bloqueio de receptores glutamatérgicos do tipo AMPA/cainato e inibição da anidrase carbônica, uma combinação que reduz a excitabilidade cortical de forma ampla o suficiente para reduzir a frequência de crises.

A toxina botulínica, usada em enxaqueca crônica e também em espasticidade, merece um fechamento especial para esse capítulo, porque seu mecanismo é literalmente o oposto do que vimos com a alfa-latrotoxina da viúva-negra, lá no capítulo sobre venenos: enquanto a alfa-latrotoxina força a fusão descontrolada de vesículas sinápticas formando poros na membrana pré-sináptica, a toxina botulínica cliva proteínas SNARE especificas, as mesmas proteínas que normalmente permitem essa fusão vesicular, impedindo fisicamente a liberação de acetilcolina na junção neuromuscular. Duas toxinas, dois extremos opostos do mesmo maquinário de liberação vesicular, uma forçando a liberação até o esgotamento, outra bloqueando a liberação por completo, e é exatamente esse tipo de simetria mecanística que espero que você continue enxergando conforme for avançando pelo restante do livro.

Capítulo 10.7 | Outros fármacos que afetam o sistema nervoso:

Fechando o capítulo, vale reunir aqui alguns fármacos cujo efeito neurológico não é o objetivo terapêutico principal, mas um efeito colateral relevante, mecanicamente interessante e frequentemente cobrado, diferente da lista de fármacos em superdose que já detalhamos no capítulo 6.2.

A vincristina, um quimioterápico amplamente usado em diversos protocolos oncológicos, causa neuropatia periférica dose-dependente por um mecanismo direto: ela inibe a polimerização de microtúbulos, estruturas essenciais para o transporte axoplasmático ao longo do axônio, o mesmo tipo de dano estrutural que discutimos de forma mais ampla ao falar de metais pesados, só que aqui a causa é farmacológica e previsível, o que explica por que a neuropatia por vincristina tipicamente começa nas extremidades distais: os axônios mais longos e mais dependentes desse transporte são, mais uma vez, os primeiros a sofrer.




A cisplatina, outro quimioterápico de uso amplo, chega num desfecho clínico parecido, neuropatia periférica sensitiva distal, mas por uma rota completamente diferente: ela forma adutos diretamente no DNA das células dos gânglios da raiz dorsal, e esses gânglios, ao contrário da maior parte do sistema nervoso central, não são protegidos por uma barreira equivalente à barreira hematoencefálica, ficando diretamente expostos a qualquer molécula tóxica circulante, o que os torna um alvo relativamente desprotegido para esse tipo de dano genotóxico direto.



Os inibidores de calcineurina, tacrolimo e ciclosporina, amplamente usados em pacientes transplantados, podem causar a síndrome da encefalopatia posterior reversível (PRES), um quadro de disfunção do endotélio vascular cerebral que compromete a autorregulação e favorece edema vasogênico, predominantemente nas regiões occipital e parietal posterior, manifestando-se com cefaleia, alterações visuais e crises convulsivas, geralmente reversível com a redução ou suspensão do fármaco causador. As fluoroquinolonas, uma classe de antibióticos amplamente usada, reduzem o limiar convulsivo ao antagonizar receptores GABA-A, um mecanismo que ganha relevância clínica especialmente em pacientes já predispostos, como epilépticos ou pacientes com insuficiência renal, que acumulam a droga em concentrações mais altas que o esperado.

A amiodarona, um antiarrítmico de uso muito comum e prolongado, merece menção por uma razão pouco lembrada: ela é extremamente lipofílica e se

acumula progressivamente em tecidos ricos em lipídios, incluindo a bainha de mielina dos nervos periféricos, o que pode gerar neuropatia periférica e tremor de início insidioso após meses a anos de uso contínuo, um efeito cumulativo e dose-dependente que reflete literalmente o fármaco "se depositando" onde não deveria.



A isotretinoína, amplamente usada no tratamento da acne grave, também merece nota, ela é uma causa reconhecida de hipertensão intracraniana idiopática, antigamente chamada de pseudotumor cerebral, embora o mecanismo exato ainda não esteja completamente esclarecido, existe a hipótese de que retinoides interfiram na reabsorção normal do líquor pelas granulações aracnoides, e o quadro clínico, cefaleia associada a papiledema, pode mimetizar uma lesão expansiva intracraniana sem que exista de fato uma. Por fim, vale mencionar dois exemplos que retomam mecanismos já vistos nesse mesmo capítulo.

Os imunobiológicos modernos, como o natalizumabe, usado no tratamento da esclerose múltipla, ao suprimir a vigilância imunológica dentro do sistema nervoso central, criam condições para a reativação do vírus JC, normalmente latente e controlado pelo sistema imune, levando à leucoencefalopatia multifocal progressiva, uma infecção oportunista grave do sistema nervoso central que vamos detalhar melhor no capítulo sobre bactérias e fungos.

A metoclopramida, um antiemético e procinético de uso extremamente comum, compartilha o mesmo mecanismo de bloqueio D2 que já discutimos para os antipsicóticos, em doses altas ou uso prolongado pode gerar discinesia tardia, movimentos involuntários repetitivos, geralmente orofaciais, que podem persistir mesmo após a suspensão do fármaco, um lembrete de

que o mesmo receptor, bloqueado pelo mesmo tipo de molécula, gera o mesmo tipo de risco, esteja o fármaco rotulado como "antipsicótico" ou como "antiemético".


Se você reparar bem nesse capítulo inteiro, agora com todos esses exemplos somados, praticamente todo fármaco que discutimos se encaixa em uma de quatro categorias: repõe um sinal que está faltando (levodopa, os inibidores de acetilcolinesterase, a vitamina K), bloqueia um sinal que está em excesso (memantina, os anticonvulsivantes, os antiagregantes, a toxina botulínica), corrige uma consequência estrutural de um processo já em curso (a terapia osmótica, os corticosteroides no edema tumoral, o ácido tranexâmico), ou neutraliza e sequestra diretamente uma molécula nociva circulante (os fragmentos de anticorpo antidigoxina, o idarucizumabe, o andexanet alfa). É a mesma lógica de mecanismo que usamos capítulo após capítulo para entender a doença, agora aplicada de trás para frente, para entender o tratamento, e é esse espelhamento entre fisiopatologia e farmacologia, mais do que qualquer bula decorada, que sustenta o raciocínio clínico de verdade.



Capítulo 11 | Demências.


No capítulo sobre farmacologia já adiantamos boa parte do tratamento das demências antes mesmo de entendermos a fundo cada uma delas, os inibidores da acetilcolinesterase, a memantina, os anticorpos anti-amiloide, tudo isso já foi discutido mecanisticamente no capítulo 10.3. Esse capítulo fecha esse círculo pelo lado contrário: agora vamos entender exatamente qual doença estamos tratando quando usamos cada um desses fármacos e, mais importante, vamos aprender a diferenciar uma demência da outra, porque é isso que decide qual fármaco faz sentido usar, e é exatamente esse raciocínio diferencial que mais cai na prática e nas provas.

Antes de entrarmos em cada doença especificamente, vale estabelecer um conceito central que vai nos acompanhar o capítulo inteiro: demência não é sinônimo de esquecimento, e não é sinônimo de confusão aguda. Demência é, por definição, **um declínio cognitivo adquirido**, progressivo e crônico, que compromete múltiplos domínios cognitivos (memória, linguagem, função executiva, praxia, percepção visuoespacial) o suficiente para interferir na funcionalidade do paciente, e que ocorre com o nível de consciência preservado.



Nota da Revisão Científica: O giro lingual (no lobo occipital) é a continuação do giro occipitotemporal medial (no lobo temporal)


Esse último ponto é o que diferencia a demência do delirium: o delirium tem início agudo, de horas a dias, flutua ao longo do próprio dia, e cursa com rebaixamento ou flutuação do nível de consciência e da atenção, quase sempre por uma causa sistêmica identificável, como uma infecção ou um distúrbio metabólico, enquanto a demência se instala ao longo de meses a anos, com o paciente lúcido e alerta, apenas progressivamente incapaz de raciocinar, lembrar ou se comunicar como antes. É uma diferenciação simples na teoria, mas que na prática clínica real, especialmente em idosos hospitalizados, se confunde o tempo todo, e vale sempre lembrar: um paciente com demência de base pode, e frequentemente desenvolve, um delirium sobreposto quando adoece por qualquer outro motivo, então **a presença de demência não exclui delirium**, ela apenas torna o delirium mais difícil de reconhecer clinicamente.



Uma segunda ferramenta conceitual que vale estabelecer logo no início, porque vai nos ajudar a organizar cada doença que vem a seguir, é a distinção entre padrão cortical e padrão subcortical de demência. Não é uma dicotomia perfeita, existe sobreposição entre elas, mas como ferramenta de raciocínio ela é extremamente útil. Demências corticais, como o Alzheimer e a demência frontotemporal, afetam primariamente o córtex cerebral associativo, e cursam com afasia, apraxia, agnosia e amnésia proeminentes, o paciente esquece nomes, perde a capacidade de reconhecer objetos ou pessoas, perde a fluência de linguagem, tudo isso preservando relativamente a velocidade de processamento e o controle motor por bastante tempo da doença. Demências subcorticais, como as causadas por doença de pequenos vasos ou pela doença de Parkinson avançada, afetam primariamente os núcleos da base, o tálamo e suas conexões com o córtex frontal, e cursam com lentificação cognitiva global, o que chamamos de bradifrenia, déficit de função executiva proeminente, apatia e frequentemente sinais motores associados, como rigidez e lentidão de marcha, enquanto a memória e a linguagem ficam relativamente preservadas até fases mais avançadas da doença.

Essa distinção, cortical versus subcortical, vai reaparecer o tempo todo

enquanto percorremos cada doença a seguir, e vamos fechar o capítulo justamente retomando essa lógica de forma mais sistemática. Antes de entrarmos doença por doença, vale ainda estabelecer um último conceito, o de comprometimento cognitivo leve, porque ele é o estágio que quase sempre precede clinicamente o diagnóstico formal de demência e porque ele ilustra bem a ideia de que a doença neurodegenerativa começa muito antes de ficar clinicamente óbvia.



O comprometimento cognitivo leve é definido por um declínio cognitivo mensurável, geralmente identificado pelo próprio paciente ou por um familiar próximo, que já é maior do que o esperado para a idade e a escolaridade da pessoa, mas que ainda não é suficiente para comprometer a independência funcional nas atividades do dia a dia, a linha que, por definição, separa esse estágio da demência propriamente dita. Do ponto de vista fisiopatológico, isso faz todo sentido dentro do que já vimos sobre o estadiamento de Braak: nas fases iniciais, a patologia ainda está confinada a estruturas límbicas e o cérebro consegue compensar essa perda localizada através de redes neurais alternativas e de reserva cognitiva, até que a extensão do dano ultrapassa a capacidade compensatória do tecido remanescente e o quadro se torna funcionalmente incapacitante.

Nem todo comprometimento cognitivo leve evolui para demência, uma parcela relevante permanece estável ou até melhora, especialmente quando existe uma causa reversível ou parcialmente reversível associada, mas quando a causa de base é neurodegenerativa, esse estágio funciona como uma janela de oportunidade diagnóstica cada vez mais valorizada clinicamente, já que é justamente nesse momento, antes da perda neuronal maciça, que as terapias mais modernas, como os anticorpos anti-amiloide que já comentamos, parecem oferecer o maior benefício relativo.


Doença de Alzheimer:

A causa mais comum de demência em todas as faixas etárias acima dos sessenta e cinco anos, respondendo por algo entre sessenta e setenta por cento dos casos. Para entender sua fisiopatologia, o ponto de partida é uma proteína de membrana chamada proteína precursora amiloide, presente normalmente na membrana de qualquer neurônio saudável. Essa proteína pode ser clivada por duas vias enzimáticas concorrentes. A via não amiloidogênica, considerada a via fisiológica, utiliza uma enzima chamada alfa-secretase, que corta a proteína precursora exatamente no meio da região que formaria o peptídeo beta-amiloide, gerando fragmentos solúveis e inofensivos. A via amiloidogênica, patológica, utiliza duas outras enzimas em sequência, a beta-secretase e depois a gama-secretase, que cortam a proteína precursora em pontos diferentes, preservando intacta a sequência do peptídeo beta-amiloide, especialmente sua forma de quarenta e dois aminoácidos, que é a mais hidrofóbica e a mais propensa a se agregar.



Esse peptídeo beta-amiloide 42 começa então a se acumular no espaço extracelular, primeiro como oligômeros solúveis, que já são a forma mais tóxica para a sinapse por interferirem diretamente na neurotransmissão glutamatérgica e na plasticidade sináptica, e depois como placas insolúveis, os agregados fibrilares extracelulares que dão nome à doença desde sua descrição original. Paralelamente a esse processo extracelular, ocorre um


segundo evento patológico, dessa vez dentro do próprio neurônio, envolvendo a proteína tau, normalmente responsável por estabilizar os microtúbulos do citoesqueleto axonal, funcionando como uma espécie de dormente que mantém os trilhos do transporte axonal alinhados e rígidos.



Na doença de Alzheimer, a tau sofre hiperfosforilação, perde sua afinidade pelo microtúbulo e se solta dele, os microtúbulos perdem sua estabilidade estrutural e o transporte axonal, que depende deles para levar organelas e neurotransmissores da região do corpo celular até a sinapse, entra em colapso progressivo. A tau solta e hiperfosforilada ainda se agrega dentro do citoplasma neuronal formando os emaranhados neurofibrilares, o segundo marco histopatológico clássico da doença. Existe hoje um entendimento razoavelmente consistente de que o acúmulo de amiloide extracelular é o gatilho inicial da cascata, mas é o acúmulo de tau intracelular que se correlaciona mais diretamente com a morte neuronal e com a gravidade clínica observada, um detalhe relevante para entender por que terapias puramente anti-amiloide, como o lecanemabe que já comentamos no capítulo de farmacologia, têm benefício clínico ainda modesto: elas atacam o gatilho, mas não necessariamente revertem o processo já em curso rio abaixo.

Um ponto que vale mencionar sem entrar em genética molecular profunda é o papel de um gene envolvido no transporte de colesterol e lipídeos no sistema nervoso central, cuja variante mais associada à doença reduz a eficiência com que a micróglia e os astrócitos conseguem depurar o peptídeo beta-amiloide do espaço extracelular. Carregar essa variante não determina a doença, mas aumenta substancialmente o risco e antecipa sua idade de início, funcionando essencialmente como um fator que desequilibra a balança entre produção e


depuração de amiloide a favor do acúmulo.



A progressão anatômica dessa patologia segue um padrão notavelmente previsível, conhecido como estadiamento de Braak, e é esse padrão espacial que explica a sequência clínica de sintomas que vemos à beira do leito. As primeiras estruturas afetadas são o córtex entorrinal e o hipocampo, localizados no lobo temporal medial, exatamente as estruturas que já discutimos no capítulo sobre telencéfalo como o portão de entrada para a formação de novas memórias episódicas.

Isso explica por que o primeiro sintoma do Alzheimer típico é quase sempre um déficit de memória anterógrada: o paciente consegue lembrar perfeitamente eventos antigos, consolidados há décadas em redes corticais distribuídas, mas não consegue formar e reter memórias novas, repete a mesma pergunta minutos depois de já ter recebido a resposta, esquece compromissos recentes, perde objetos com frequência crescente. Somente depois dessa fase inicial a patologia se espalha para estruturas límbicas adjacentes e, progressivamente, para o córtex de associação temporal, parietal e frontal, e é nesse momento que surgem os outros domínios cognitivos afetados: afasia, com dificuldade progressiva de encontrar palavras

e de nomear objetos; apraxia, com perda da capacidade de executar sequências motoras aprendidas mesmo com força e coordenação preservadas; agnosia visuoespacial, com desorientação em ambientes antes familiares; e, apenas nas fases mais avançadas da doença, comprometimento das áreas motoras e sensoriais primárias, o que explica por que um paciente com Alzheimer avançado ainda caminha e se movimenta razoavelmente bem por bastante tempo, mesmo já profundamente incapaz de reconhecer familiares ou se comunicar.



Normal

Atividade metabolica presente em todo o cortex cerebral


Doença de Alzheimer

Redução da atividade metabolica nos lobos temporais e parietais

Existe ainda um componente colinérgico bem estabelecido nessa doença, que já antecipamos no capítulo de farmacologia: os neurônios colinérgicos do núcleo basal de Meynert, principal fonte de acetilcolina para o córtex e o hipocampo, degeneram precocemente e de forma desproporcional em relação a outras populações neuronais, o que justifica tanto o uso terapêutico dos inibidores da acetilcolinesterase quanto o fato de que o déficit colinérgico se correlaciona razoavelmente bem com a gravidade dos sintomas cognitivos, ainda que ele seja apenas uma peça de um mosaico patológico muito mais amplo.

Estruturalmente, tudo isso se traduz em atrofia cortical progressiva, visível em exames de imagem primeiro no hipocampo e no lobo temporal medial, e depois de forma mais difusa pelo córtex, acompanhada de alargamento compensatório dos ventrículos e dos sulcos corticais, à medida que o parênquima perdido é substituído por espaço preenchido por líquor. Clinicamente, é útil pensar na doença de Alzheimer em três estágios funcionais amplos, não porque exista um corte biológico abrupto entre eles,

mas porque isso ajuda a orientar conversas com a família sobre prognóstico e cuidado.




(Método para detectar acumulo de peptídeo)

No estágio leve, o paciente ainda mantém boa parte da sua independência, mas já comete erros perceptíveis em tarefas complexas, esquece compromissos, tem dificuldade crescente em administrar finanças ou medicações, e a família costuma minimizar isso como "esquecimento normal da idade" por um bom tempo antes de procurar avaliação médica. No estágio moderado, a independência para atividades instrumentais já está claramente perdida, o paciente precisa de supervisão para se vestir adequadamente, cozinhar com segurança ou sair de casa sozinho, e começam a surgir alterações comportamentais associadas, como irritabilidade, desconfiança ou apatia. No estágio grave, mesmo as atividades básicas de autocuidado, como se alimentar ou controlar esfíncteres, já dependem de assistência integral, a comunicação verbal se reduz a poucas palavras ou desaparece completamente, e é nessa fase que complicações sistêmicas relacionadas à imobilidade e à disfagia, como pneumonia aspirativa, tornam-se a causa mais comum de óbito, não a doença neurológica em si.

Do ponto de vista diagnóstico, embora a confirmação histopatológica definitiva só exista post-mortem, hoje já é possível inferir a presença dessa patologia em vida com razoável confiança através de biomarcadores que refletem diretamente os dois mecanismos moleculares que descrevemos: a dosagem no líquor de peptídeo beta-amiloide 42, que tende a cair conforme mais amiloide fica retido nas placas cerebrais e menos circula livremente no líquor, combinada à dosagem de tau total e tau fosforilada, que tende a subir conforme mais dano axonal e agregação de tau ocorrem, e mais recentemente a tomografia por emissão de pósitrons utilizando marcadores que se ligam especificamente às placas amiloides ou aos emaranhados de tau, permitindo literalmente visualizar a distribuição espacial dessas proteínas anômalas

ainda em vida, uma ferramenta cada vez mais relevante para justificar o uso dos anticorpos anti-amiloide que discutimos no capítulo de farmacologia, já que esses fármacos fazem mais sentido justamente nos pacientes em quem se confirma bioquimicamente a presença de amiloide patológico.




Demência Vascular:

A segunda causa mais comum de demência, e conceitualmente a mais direta de entender, porque não existe aqui uma proteína anômala se acumulando lentamente, existe simplesmente tecido cerebral que morreu ou que está cronicamente mal perfundido, e função cognitiva que depende desse tecido para funcionar. Já construímos praticamente toda a base fisiopatológica necessária para entender essa demência nos capítulos sobre anatomia vascular e sobre a farmacologia do AVC, então aqui vamos nos concentrar em como esses mesmos mecanismos, quando repetidos ou cronificados, geram um quadro demencial.



Existem, na prática, dois padrões principais de demência vascular, e distingui-los é importante porque eles têm fisiopatologias e apresentações clínicas distintas. O primeiro é a demência vascular por múltiplos infartos, também chamada de demência multi-infarto, na qual o paciente sofre uma sucessão de AVCs isquêmicos, muitas vezes pequenos e clinicamente silenciosos isoladamente, cada um destruindo uma porção específica de tecido cortical ou subcortical.


O dano cognitivo aqui é cumulativo e, classicamente, apresenta uma progressão em degraus, um platô clínico relativamente estável interrompido por uma queda funcional abrupta coincidindo com cada novo evento isquêmico, um padrão temporal que contrasta diretamente com o declínio lento e contínuo do Alzheimer. Os déficits cognitivos específicos dependem diretamente de qual território vascular foi afetado a cada evento, o que também explica por que a demência multi-infarto costuma vir acompanhada de sinais neurológicos focais, um episódio de fraqueza num membro, uma alteração de campo visual, um déficit de linguagem localizado, achados que praticamente não existem no Alzheimer típico, ao menos não nas fases iniciais.




O segundo padrão, talvez ainda mais relevante na prática geriátrica, é a demência vascular subcortical, também conhecida como doença de Binswanger quando o comprometimento da substância branca é extenso e

difuso. Aqui o mecanismo não é a oclusão de um grande vaso, mas sim a doença crônica de pequenos vasos, arteríolas penetrantes profundas que sofrem lipohialinose, um espessamento progressivo e degenerativo de sua parede associado cronicamente à hipertensão arterial mal controlada, que já discutimos como fator de risco central para hemorragias e para eventos isquêmicos de pequenos vasos no capítulo de anatomia vascular.

Essas arteríolas penetrantes irrigam justamente a substância branca profunda e os núcleos da base, então sua disfunção crônica gera um padrão difuso de isquemia subclínica e desmielinização da substância branca periventricular, visível em exames de imagem como hipersinal extenso e simétrico. Clinicamente, esse padrão subcortical se comporta exatamente como descrevemos na introdução do capítulo: bradifrenia, disfunção executiva proeminente com relativa preservação da memória declarativa nas fases iniciais, apatia marcante, e um componente motor característico, a chamada marcha magnética, pequenos passos arrastados com base alargada, muito similar à marcha parkinsoniana mas sem o tremor de repouso típico, refletindo a desconexão entre o córtex frontal e os circuitos motores subcorticais causada pela desmielinização difusa dessas vias.



Existe ainda um terceiro padrão, menos comum mas didaticamente importante, chamado demência por infarto estratégico, na qual um único evento isquêmico, muitas vezes pequeno em volume, é suficiente para gerar um quadro demencial abrupto e completo, não pela quantidade de tecido perdido, mas pela função crítica da região atingida. O exemplo clássico é o infarto talâmico bilateral ou do giro angular no hemisfério dominante, estruturas que funcionam como verdadeiros nós de convergência de múltiplas redes cognitivas, de forma que sua perda desconecta funcionalmente regiões corticais que, isoladamente, permanecem estruturalmente intactas, um bom lembrete de que em neurologia o tamanho da lesão importa menos do que a posição estratégica dela dentro do circuito.




Vale reforçar aqui um fator de risco que já mencionamos brevemente no capítulo sobre encefalopatias e no capítulo sobre anemias, a homocisteína. Níveis elevados de homocisteína, seja por deficiência de folato ou de B12, seja por outras causas, promovem disfunção endotelial direta e um estado pró-trombótico crônico, e por isso funcionam como um acelerador silencioso tanto de doença de grandes vasos quanto de doença de pequenos vasos, reforçando como o raciocínio vascular que construímos para o AVC agudo se aplica integralmente aqui, apenas trocando o desfecho agudo de um infarto único pelo desfecho crônico e cumulativo de múltiplas lesões subclínicas ao longo

de anos.

Demência por Corpos de Lewy:

Se o Alzheimer nasce do acúmulo extracelular de amiloide e intracelular de tau, a demência por corpos de Lewy nasce do acúmulo intracelular de uma terceira proteína, a alfa-sinucleína, normalmente envolvida no tráfego de vesículas sinápticas na terminação pré-sináptica. Por motivos ainda não completamente esclarecidos, essa proteína se dobra de forma anômala e se agrega em inclusões intracitoplasmáticas chamadas corpos de Lewy, que se depositam inicialmente em núcleos do tronco encefálico e progressivamente ascendem para estruturas límbicas e, por fim, para o córtex cerebral difusamente, um padrão de disseminação que, de forma interessante, lembra conceitualmente a progressão em estágios que vimos no Alzheimer, só que com uma proteína e uma rota anatômica diferentes.



O que torna essa demência clinicamente distinta e frequentemente mal diagnosticada é a combinação de três achados centrais que raramente aparecem juntos em outra causa de demência. O primeiro é a flutuação cognitiva, o paciente pode estar lúcido e funcional pela manhã e profundamente confuso à tarde, com variações que ocorrem ao longo de horas ou dias, um padrão que lembra o delirium mas que aqui é intrínseco à própria doença, refletindo instabilidade na sinalização colinérgica cortical, que também está comprometida nessa condição, e não apenas no Alzheimer.

O segundo achado central são as alucinações visuais recorrentes e bem formadas, tipicamente de pessoas ou animais, que ocorrem precocemente na doença, ao contrário do Alzheimer, onde alucinações só aparecem, quando aparecem, em fases já avançadas. O terceiro é o parkinsonismo, rigidez, bradicinesia e instabilidade postural, decorrente da mesma patologia de corpos de Lewy afetando a substância negra, exatamente a estrutura que

discutimos no contexto da via nigroestriatal dopaminérgica. Aqui vale uma diferenciação importante e frequentemente cobrada: quando o parkinsonismo motor precede o declínio cognitivo em pelo menos um ano, convencionou-se chamar a condição de demência da doença de Parkinson; quando o declínio cognitivo surge simultaneamente ou precede o parkinsonismo, chamamos de demência por corpos de Lewy.




Fig 1. SMRI revealed diffuse cortical atrophy, mainly on the temporal lobes, being the left more atrophyc than the right. Hippocampal gyri were normal, specially when they were compared with the temporal lobes.


Na prática, ambas compartilham a mesma proteína patológica de base e representam, na visão mais aceita atualmente, um espectro contínuo da mesma doença subjacente, diferenciado principalmente pela sequência temporal de aparecimento dos sintomas, não por uma fisiopatologia fundamentalmente distinta. Por fim, e esse é um dos pontos mais importantes e potencialmente perigosos de toda essa seção, precisamos retomar aqui, sem repetir a fundo, o que já detalhamos no capítulo de farmacologia sobre demências: pacientes com demência por corpos de Lewy têm hipersensibilidade marcante e potencialmente grave a antipsicóticos, especialmente os de alta potência antidopaminérgica, justamente porque a via nigroestriatal já está patologicamente empobrecida de dopamina nessa

condição, e bloquear ainda mais os receptores D2 remanescentes pode precipitar um quadro grave de rigidez extrema e disfunção autonômica.

Reconhecer clinicamente essa demência não é apenas um exercício acadêmico de nomear a doença certa, é literalmente uma decisão que pode evitar prescrever, para controlar alucinações ou agitação, exatamente a classe de medicamento mais perigosa para esse paciente específico.

Demência Frontotemporal:

Diferente das três anteriores, a demência frontotemporal não é uma entidade única do ponto de vista molecular, é melhor entendida como um grupo de doenças que compartilham um alvo anatômico comum, a degeneração seletiva e assimétrica dos lobos frontal e temporal, mas que podem ser causadas por diferentes proteínas anômalas acumuladas, principalmente formas alteradas da própria proteína tau ou de uma proteína de ligação ao DNA chamada TDP-43.




Sem entrar na genética molecular por trás de cada subtipo, o que importa reter clinicamente é que essa é, depois do Alzheimer de início precoce, uma das causas mais comuns de demência em pacientes abaixo dos sessenta e cinco anos, um detalhe demográfico que já ajuda a levantar a suspeita diagnóstica em pacientes mais jovens com quadro demencial.

Clinicamente, a demência frontotemporal se manifesta em dois grandes padrões, dependendo de qual região é predominantemente afetada. A variante comportamental, a mais comum, decorre da degeneração predominante do córtex frontal, especialmente das regiões orbitofrontal e do cíngulo anterior, estruturas que já discutimos como centrais para o controle inibitório e para o julgamento social.

O quadro clínico resultante é dramático e frequentemente confundido inicialmente com um transtorno psiquiátrico primário: desinibição social, comportamento impulsivo ou inapropriado, apatia alternando com euforia inadequada, perda de empatia, mudanças alimentares marcantes como hiperfagia ou preferência compulsiva por doces, e comportamentos repetitivos

ou ritualísticos.


O ponto crucial para diferenciar essa apresentação do Alzheimer é que, nessa variante, a memória episódica e a orientação espacial permanecem relativamente preservadas por bastante tempo, o problema inicial não é esquecer, é a personalidade e o comportamento social que se deterioram primeiro, um reflexo direto e quase didático de que estamos diante de uma doença do lobo frontal, não do lobo temporal medial.



A segunda grande variante é a afasia progressiva primária, decorrente da degeneração predominante de regiões temporais e frontais dominantes para a linguagem, que já discutimos no capítulo sobre telencéfalo ao falarmos de dominância hemisférica. Ela se subdivide em dois padrões principais: a variante não fluente, com fala esforçada, agramatical e apraxia de fala, decorrente de degeneração mais frontal e perisylviana, próxima à área de Broca; e a variante semântica, com fala fluente mas progressivamente

esvaziada de conteúdo e significado, o paciente perde a capacidade de nomear e de compreender o significado de palavras e objetos, decorrente de degeneração mais temporal anterior, próxima às áreas de associação semântica.

Em ambas as variantes de afasia progressiva, assim como na variante comportamental, a memória episódica costuma ficar relativamente poupada nas fases iniciais, reforçando o mesmo princípio de localização que estamos construindo o capítulo inteiro: o domínio cognitivo que falha primeiro quase sempre aponta diretamente para a região anatômica onde a doença começou. Vale um alerta prático sobre essa variante comportamental: por se apresentar inicialmente como mudança de personalidade, desinibição ou apatia, sem o esquecimento característico que leigos e até médicos menos atentos associam automaticamente a "demência", ela é frequentemente confundida por meses ou até anos com um transtorno psiquiátrico primário do adulto, como depressão, transtorno bipolar ou mesmo um quadro de crise de meia-idade, atraso diagnóstico que só reforça a importância de manter a demência frontotemporal como diagnóstico diferencial ativo diante de qualquer mudança de personalidade de início relativamente tardio e sem explicação psicossocial evidente, especialmente quando existe também comprometimento progressivo, ainda que sutil, da função executiva.




Vale ainda registrar aqui, como conexão para o próximo capítulo, que existe

uma causa adicional e extremamente prevalente de demência subcortical que ainda não mencionamos: a demência associada ao uso crônico de álcool. Preferimos deixar essa causa reservada para ser detalhada com profundidade no capítulo seguinte, quando formos percorrer sistematicamente o impacto do álcool sobre cada órgão do corpo, o sistema nervoso central incluído, mas já vale adiantar que ela combina componentes de toxicidade direta do álcool sobre o córtex frontal, deficiência crônica de tiamina e doença cerebrovascular associada, tornando-se, na prática, quase um resumo de vários mecanismos que já vimos nesse capítulo, só que reunidos numa única etiologia.

Agora que já cobrimos as quatro causas mais comuns e mais cobradas de demência, vale dedicarmos uma seção mais breve a causas menos frequentes na prática, mas que carregam um peso desproporcional em provas e em decisões clínicas justamente por suas particularidades, seja pela urgência do diagnóstico, seja, em alguns casos raros, pela possibilidade real de reversão completa do quadro.

Hidrocefalia de Pressão Normal:


Merece destaque especial porque é, entre todas as causas de demência, uma das poucas potencialmente reversíveis com tratamento cirúrgico. O mecanismo envolve uma absorção deficiente de líquor pelas granulações aracnoides, gerando um acúmulo crônico e lentamente progressivo de líquor nos ventrículos, sem, no entanto, gerar a elevação sustentada de pressão intracraniana que veríamos numa hidrocefalia aguda, daí o nome pressão normal, já que a pressão medida pontualmente costuma estar dentro ou próxima da faixa normal, mesmo com os ventrículos visivelmente dilatados na imagem.



A dilatação ventricular crônica estira e comprime as fibras da coroa radiada

adjacente aos ventrículos, especialmente as fibras motoras que descem para os membros inferiores e que passam próximas à parede ventricular antes de se afunilarem na cápsula interna, o que explica a tríade clínica clássica e didaticamente resumida como "wet, wobbly and wacky": incontinência urinária, por comprometimento das fibras que controlam a inibição cortical da bexiga; distúrbio de marcha, tipicamente uma marcha de base alargada, curta e com dificuldade de iniciar o passo, quase magnética ao chão; e declínio cognitivo, predominantemente subcortical, com bradifrenia e disfunção executiva.


A ordem de aparecimento mais comum é justamente essa, primeiro a marcha, depois a incontinência, e só depois a cognição, e reconhecer esse padrão precocemente importa porque a derivação ventriculoperitoneal, desviando cirurgicamente o excesso de líquor, pode reverter parcial ou totalmente o quadro, especialmente quando o distúrbio de marcha ainda é o sintoma predominante.



Doença de Creutzfeldt-Jakob:

A mais rara e a mais rapidamente progressiva das demências que vamos discutir, causada não por uma infecção convencional, mas por uma proteína priônica, uma proteína normalmente presente na membrana neuronal que sofre uma alteração de dobramento e que tem a propriedade única de induzir essa mesma alteração de dobramento em outras moléculas da mesma proteína ao entrar em contato com elas, criando uma reação em cadeia autopropagável que se espalha de neurônio a neurônio sem depender de replicação genética alguma.


O resultado histopatológico é uma degeneração espongiforme, o tecido cerebral literalmente adquire um aspecto de esponja ao microscópio, repleto de pequenos vacúolos, associada a intensa perda neuronal e gliose reativa. Clinicamente, o que mais chama atenção é a velocidade, um quadro demencial que evolui de forma perceptível em semanas a poucos meses, muito mais rápido que qualquer uma das causas anteriores, tipicamente acompanhado de mioclonias, contrações musculares breves e involuntárias, e de sinais cerebelares e visuais.




O eletroencefalograma classicamente mostra complexos periódicos de ondas agudas, um padrão bastante característico que ajuda a levantar a suspeita diagnóstica diante de uma demência que progride rápido demais para se encaixar em qualquer uma das causas que já vimos.

Coreia de Huntington.

Uma causa de demência subcortical associada a um distúrbio de movimento hipercinético, a coreia, movimentos involuntários, súbitos, irregulares e sem propósito, que parecem fluir de uma parte do corpo para outra. O mecanismo envolve degeneração seletiva e precoce dos neurônios espinhosos médios do núcleo caudado e do putamen, os mesmos núcleos da base que já discutimos como parte central do circuito motor extrapiramidal, aqui numa doença hereditária de transmissão autossômica dominante que não vamos detalhar geneticamente por fugir do escopo desse capítulo.




A perda dessa população neuronal específica desinibe excessivamente o tálamo motor, gerando o padrão coreico. Cognitivamente, o padrão de demência é subcortical clássico, bradifrenia, disfunção executiva e apatia, frequentemente acompanhado de irritabilidade e alterações psiquiátricas que podem inclusive preceder o distúrbio motor em anos, um detalhe que vale reter para o raciocínio diagnóstico.




Demência Associada ao HIV

Decorre não de infecção direta dos neurônios pelo próprio vírus, que não os infecta de forma produtiva, mas da neuroinflamação crônica gerada por macrófagos e micróglia infectados que atravessam a barreira hematoencefálica e liberam citocitocinas e proteínas virais neurotóxicas continuamente no parênquima cerebral, um mecanismo indireto que lembra conceitualmente a neuroinflamação mediada por citocinas que já vimos na anemia de doença crônica.



O padrão clínico resultante é predominantemente subcortical, com bradifrenia, apatia e disfunção executiva, e sua incidência caiu drasticamente desde a introdução da terapia antirretroviral combinada, mas ainda é relevante em pacientes com diagnóstico tardio ou má adesão terapêutica. Agora que já percorremos as principais causas, e algumas das mais raras, vale fechar o capítulo sistematizando o raciocínio diferencial, porque na prática clínica raramente alguém chega com o diagnóstico já escrito na testa, o que chega é um paciente com queixa cognitiva, e cabe a nós reconstruir o raciocínio até o diagnóstico mais provável.


O primeiro filtro, sempre, é excluir causas potencialmente reversíveis antes de assumir uma demência neurodegenerativa crônica, porque tratar uma causa reversível a tempo pode literalmente devolver a funcionalidade do paciente, algo impossível nas demências neurodegenerativas que discutimos até aqui. Isso inclui investigar rotineiramente disfunção tireoidiana, já que o hipotireoidismo grave pode mimetizar bradifrenia e lentificação cognitiva global, deficiência de B12, cuja fisiopatologia neurológica já detalhamos exaustivamente no capítulo sobre anemias, neurossífilis, e, como acabamos de ver, a hidrocefalia de pressão normal.



O segundo filtro é temporal: uma demência que progride em semanas a poucos meses aponta fortemente para uma causa incomum e potencialmente urgente, como a doença priônica ou uma encefalite autoimune, enquanto a grande maioria das demências neurodegenerativas progride ao longo de anos. Dentro desse curso mais lento, o padrão de progressão também ajuda, contínuo e gradual favorece causas neurodegenerativas como Alzheimer, corpos de Lewy ou frontotemporal, enquanto um padrão em degraus, com quedas funcionais abruptas intercaladas por platôs, aponta para demência vascular multi-infarto.

O terceiro filtro é qual domínio cognitivo falha primeiro, e aqui vale revisitar o princípio que construímos o capítulo inteiro: memória episódica falhando primeiro aponta para o hipocampo e o lobo temporal medial, sugerindo Alzheimer; personalidade e comportamento social falhando primeiro, com memória relativamente poupada, apontam para o lobo frontal, sugerindo demência frontotemporal variante comportamental; linguagem falhando isoladamente aponta para córtex perisylviano ou temporal anterior dominante, sugerindo afasia progressiva primária; e lentidão cognitiva global com disfunção executiva predominante, sem amnésia ou afasia proeminentes nas fases iniciais, aponta para um padrão subcortical, seja vascular, seja por corpos de Lewy, seja por hidrocefalia de pressão normal, cabendo então diferenciar essas três pelos achados associados que já discutimos, sinais

focais e fatores de risco vascular na primeira, flutuação cognitiva e alucinações visuais na segunda, e a tríade de marcha, incontinência e dilatação ventricular na terceira.



Por fim, o quarto filtro são os achados motores e comportamentais associados: parkinsonismo evidente aponta para corpos de Lewy ou demência da doença de Parkinson; coreia aponta para Huntington; mioclonias de evolução muito rápida apontam para doença priônica; e sinais focais com história de fatores de risco vascular apontam para demência vascular. Nenhum desses filtros funciona isoladamente como uma regra absoluta, doenças neurodegenerativas reais raramente respeitam livros-texto com perfeição, e é comum encontrar pacientes com patologia mista, amiloide e corpos de Lewy coexistindo, por exemplo, algo cada vez mais reconhecido conforme mais estudos de neuropatologia post-mortem são publicados.

Mas como estrutura de raciocínio inicial, percorrer esses quatro filtros, causas reversíveis, tempo de progressão, domínio cognitivo inicial e achados motores associados, é o que transforma uma queixa vaga de "esquecimento" numa hipótese diagnóstica defensável. Existe ainda um quinto filtro, mais tardio no raciocínio mas extremamente útil quando os anteriores deixam dúvida, que é o padrão de atrofia visto na ressonância magnética, já que cada doença que discutimos tende a deixar uma "assinatura" espacial relativamente característica no parênquima remanescente.

No Alzheimer, esperamos atrofia predominante do hipocampo e do lobo temporal medial, sendo essa perda de volume hipocampal, aliás, um dos


achados de imagem mais utilizados na prática para reforçar o diagnóstico clínico.

Na demência frontotemporal, a atrofia é predominante nos lobos frontal e temporal anterior, muitas vezes de forma assimétrica entre os dois hemisférios, um padrão bem diferente do comprometimento mais posterior e medial do Alzheimer.

Na demência vascular, ao invés de atrofia localizada, encontramos os próprios infartos, únicos ou múltiplos, e extenso hipersinal de substância branca profunda e periventricular no padrão subcortical, refletindo diretamente a doença crônica de pequenos vasos que já descrevemos.

Na demência por corpos de Lewy, curiosamente, o volume hipocampal costuma estar relativamente preservado em comparação ao Alzheimer, apesar de sintomas cognitivos de gravidade semelhante, um achado que ajuda a diferenciar as duas quando a apresentação clínica ainda é ambígua.

E na hidrocefalia de pressão normal, o achado é a dilatação ventricular desproporcional ao grau de atrofia cortical presente, o verdadeiro substrato estrutural por trás da tríade clínica que já descrevemos. Juntar esse padrão de imagem aos quatro filtros clínicos anteriores é o que, na prática, fecha o raciocínio diagnóstico com a maior confiança possível antes mesmo de qualquer biomarcador mais sofisticado entrar em cena.




Capítulo 12 | Álcool.

Fechamos o capítulo anterior prometendo voltar ao álcool com profundidade, e é exatamente isso que vamos fazer agora, mas de um jeito um pouco diferente do que fizemos até aqui. Nos capítulos anteriores, sempre que abordamos uma deficiência vitamínica ou uma disfunção orgânica, gastamos boa parte do texto explicando o que acontece quando falta aquele nutriente ou quando aquele órgão falha. Esse trabalho já foi feito, principalmente no capítulo sobre anemias, onde detalhamos a ação fisiológica de cada vitamina e a cascata exata de consequências da sua ausência, e no capítulo sobre órgãos secundários e no capítulo sobre encefalopatias, onde já construímos com profundidade a fisiopatologia da encefalopatia hepática.


Esse capítulo não vai repetir esse trabalho. Ao invés disso, vamos usar o álcool como fio condutor para religar tudo isso: não vamos reexplicar por que a falta de B1 causa Wernicke, vamos explicar por que o álcool tira a B1 do paciente antes mesmo de ele desenvolver uma deficiência dietética evidente. É um capítulo mais sobre mecanismo de causa do que sobre mecanismo de consequência, e por isso ele vai puxar referência cruzada o tempo inteiro, exatamente como fizemos no capítulo de farmacologia.

Antes de entrarmos nas vitaminas, precisamos entender rapidamente como o corpo metaboliza o etanol, porque esse metabolismo é a raiz de praticamente tudo que vamos discutir daqui para frente, das deficiências vitamínicas até a doença hepática. Depois de absorvido no estômago e principalmente no intestino delgado proximal, o etanol é metabolizado majoritariamente no fígado através de duas reações enzimáticas sequenciais.



A primeira, catalisada pela enzima álcool desidrogenase, já mencionada quando discutimos a intoxicação por metanol no capítulo sobre acidentes farmacológicos, converte o etanol em acetaldeído, um metabólito intermediário altamente reativo e diretamente tóxico para praticamente qualquer célula com quem entra em contato, capaz de formar ligações covalentes anômalas com proteínas estruturais e enzimáticas, alterando sua função, e com o próprio DNA, o que explica parte do potencial carcinogênico do consumo crônico de álcool, especialmente em mucosas que entram em contato direto e prolongado com ele, como a mucosa esofágica.

A segunda reação, catalisada pela enzima aldeído desidrogenase, converte esse acetaldeído tóxico em acetato, uma molécula relativamente inofensiva que pode ser exportada para a circulação sistêmica e oxidada por praticamente qualquer tecido do corpo como fonte de energia. O detalhe bioquímico mais importante dessa via, e que vai explicar boa parte da patologia hepática que discutiremos mais à frente, é que ambas as reações dependem da mesma coenzima, o NAD+, que é reduzido a NADH a cada uma das duas etapas. Isso significa que metabolizar uma quantidade significativa de álcool consome uma quantidade igualmente significativa de NAD+ hepático num intervalo de tempo relativamente curto, alterando drasticamente a proporção NADH sobre NAD+ dentro do hepatócito.



Como o NAD+ é justamente o cofator necessário para dezenas de outras vias metabólicas essenciais, incluindo a beta-oxidação de ácidos graxos e o próprio ciclo de Krebs, esse desequilíbrio redox massivo empurra o metabolismo hepático inteiro para um estado alterado, e é literalmente a partir dessa mudança de proporção NADH/NAD+ que vamos construir, mais à frente, o mecanismo da esteatose hepática alcoólica.


Vale ainda mencionar, sem entrarmos em genética molecular, que existe variabilidade individual na atividade dessas duas enzimas entre diferentes pessoas, algumas com aldeído desidrogenase geneticamente menos eficiente acumulam acetaldeído de forma mais acentuada mesmo com pouca ingestão, gerando aquela reação de rubor facial, taquicardia e mal-estar que muitas pessoas relatam ao beber, um mecanismo de acúmulo de acetaldeído que, por sinal, é o mesmo princípio farmacológico por trás do dissulfiram, medicamento usado no tratamento do alcoolismo justamente para inibir a aldeído desidrogenase e tornar a experiência de beber desagradável o suficiente para funcionar como dissuasão comportamental.

Com esse metabolismo básico estabelecido, vamos agora percorrer, vitamina

por vitamina, exatamente como fizemos no capítulo sobre anemias, mas dessa vez com o foco invertido: não no que acontece quando falta cada uma, isso já sabemos, e sim em como especificamente o álcool crônico compromete a absorção, o armazenamento ou o metabolismo de cada uma delas.

Vitamina B1 (Tiamina):


É, disparadamente, a deficiência vitamínica mais associada ao alcoolismo crônico, e por um motivo simples: o álcool a ataca em praticamente todos os pontos possíveis da sua trajetória fisiológica. Primeiro, a ingestão dietética já costuma ser inadequada nesses pacientes, já que, como veremos na seção sobre fisiologia do apetite, boa parte das calorias diárias passa a vir do próprio álcool, deslocando o espaço que seria ocupado por uma alimentação nutricionalmente equilibrada. Segundo, e talvez mais importante, o etanol inibe diretamente o transportador intestinal responsável pela absorção ativa de tiamina no jejuno, então mesmo quando alguma tiamina é ingerida, uma fração bem menor do que o normal efetivamente atravessa a mucosa intestinal. Terceiro, a doença hepática crônica associada ao alcoolismo, que discutiremos em detalhe mais à frente, compromete a capacidade do fígado de fosforilar a tiamina absorvida em sua forma ativa, o pirofosfato de tiamina, o mesmo cofator que já vimos ser essencial para o metabolismo energético mitocondrial. É essa combinação de três falhas simultâneas, ingestão baixa, absorção intestinal prejudicada e ativação hepática comprometida, que explica por que a encefalopatia de Wernicke que já detalhamos anteriormente é tão prevalente especificamente nessa população, a ponto de ser praticamente reflexo médico administrar tiamina de forma empírica em qualquer paciente etilista que chega desorientado a um pronto-socorro, antes mesmo de qualquer exame confirmar a deficiência.



Vitamina B9 (Ácido Fólico):

O álcool interfere no metabolismo do folato por múltiplas vias que se somam. Existe uma redução direta da absorção intestinal de folato dietético, por um efeito tóxico direto do etanol e do acetaldeído sobre as células da mucosa jejunal responsáveis por essa absorção, literalmente lesando o epitélio que faria esse trabalho. Existe também uma interrupção da circulação êntero-hepática do folato, um ciclo fisiológico normal em que parte do folato é secretado na bile, reabsorvido no intestino e reciclado, e que fica comprometido tanto pela lesão hepatocelular quanto pela lesão da mucosa intestinal. E existe ainda um aumento da excreção renal de folato induzido pelo próprio álcool. O resultado é que a deficiência de folato se instala rápido e de forma desproporcional em etilistas crônicos, mesmo naqueles que mantêm alguma ingestão dietética razoável, e vale lembrar que os mecanismos neurológicos dessa deficiência, incluindo a elevação de homocisteína e a

excitotoxicidade associada, já foram detalhados no capítulo sobre anemias.



Vitamina B12 (Cobalamina):

Diferente da B1 e do folato, a B12 costuma ser relativamente mais poupada na fase inicial do alcoolismo, já que o corpo mantém reservas hepáticas de B12 que duram anos mesmo sem reposição dietética alguma. No entanto, conforme a doença hepática crônica avança, e conforme a gastrite crônica induzida pelo álcool, que discutiremos na seção de órgãos, compromete progressivamente as células parietais gástricas responsáveis por secretar o fator intrínseco necessário para a absorção ileal de B12, essa reserva se esgota e a deficiência se instala, tipicamente numa fase mais tardia da doença do que a deficiência de B1 ou de folato, mas com exatamente a mesma cascata neurológica de degeneração combinada subaguda que já detalhamos no capítulo de anemias.

Vitamina B6 (Piridoxina):

O acúmulo de acetaldeído, que já estabelecemos como o metabólito tóxico central de todo esse capítulo, tem uma ação direta e especialmente relevante sobre essa vitamina: ele desloca a piridoxal-fosfato, a forma ativa da B6, das proteínas plasmáticas que normalmente a transportam e protegem, deixando-a livre e muito mais vulnerável à degradação hidrolítica e a subsequente excreção. É um mecanismo de deficiência funcional elegante e um pouco diferente dos anteriores, já que aqui o problema não é primariamente de absorção intestinal, mas de destruição acelerada da vitamina já circulante, um mecanismo que, aliás, guarda uma semelhança conceitual direta com o que já vimos a isoniazida fazer à mesma vitamina no capítulo sobre acidentes farmacológicos, ainda que por uma via bioquímica distinta.



Vitamina A (Retinol):

Aqui o mecanismo de interferência é particularmente elegante porque envolve competição enzimática direta. O retinol também é metabolizado, em parte, pela mesma enzima álcool desidrogenase que acabamos de descrever como a porta de entrada do metabolismo do etanol, e em consumo crônico e elevado de álcool, essa enzima fica ocupada de forma desproporcional processando etanol, reduzindo a conversão de retinol em sua forma ativa. Some-se a isso o fato de que o fígado é o principal órgão de armazenamento de vitamina A do corpo, e que a própria doença hepática alcoólica crônica destrói progressivamente essas reservas hepáticas, e temos uma deficiência funcional relevante mesmo em pacientes com ingestão dietética de vitamina A tecnicamente adequada.



Vitamina D (Calcitriol):

A deficiência aqui tem origem dupla. Por um lado, existe o componente hepático, já que a primeira hidroxilação necessária para ativar a vitamina D, que já detalhamos no capítulo de anemias, depende de um fígado funcional, e a doença hepática alcoólica compromete progressivamente essa capacidade. Por outro lado, existe um componente comportamental e social bastante consistente na literatura, pacientes com alcoolismo grave tendem a ter exposição solar reduzida e ingestão dietética global pobre, dois fatores que já contribuiriam isoladamente para a deficiência mesmo num paciente hipoteticamente com fígado saudável.



Vitamina K (Filoquinona):

A principal via de comprometimento aqui não é hepática diretamente, mas sim pancreática e biliar, e vamos entender exatamente por que quando chegarmos

à seção sobre o pâncreas mais à frente: a insuficiência pancreática exócrina crônica gerada pelo álcool reduz a secreção de enzimas digestivas necessárias para absorver gordura, e como a vitamina K é lipossolúvel, sua absorção intestinal cai proporcionalmente à má absorção de gordura. Some-se a isso que, numa fase mais avançada de doença hepática, o próprio fígado perde a capacidade de sintetizar os fatores de coagulação que dependem dessa vitamina como cofator, então temos aqui uma coagulopatia de origem dupla, uma parte por deficiência real do substrato vitamínico, outra por falência da maquinaria hepática que usaria esse substrato, uma distinção clinicamente relevante porque só a primeira parte responde à reposição de vitamina K, a segunda exige correção da própria função hepática ou reposição direta dos fatores de coagulação.

Vitamina E (Alfa-Tocoferol):

Segue exatamente a mesma lógica de má absorção lipídica que acabamos de descrever para a vitamina K, comprometida pela insuficiência pancreática exócrina e por qualquer grau de colestase associada à doença hepática avançada. Vale lembrar que a vitamina E é o principal antioxidante de membrana que protege, entre outras estruturas, a própria bainha de mielina, e sua deficiência crônica nesse contexto se soma, não se sobrepõe, ao estresse oxidativo que o próprio álcool e o acetaldeído já geram diretamente sobre o tecido nervoso, um efeito combinado que vamos retomar quando chegarmos à neuropatia periférica alcoólica.

Vitamina C (Ácido Ascórbico):

Embora menos dramática clinicamente do que as deficiências anteriores nesse contexto, a vitamina C também sofre redução por ingestão dietética pobre e por um consumo metabólico aumentado, já que ela atua como antioxidante hidrossolúvel e é parcialmente consumida no esforço de neutralizar o estresse oxidativo sistêmico gerado pelo próprio metabolismo do etanol, o mesmo tipo de consumo acelerado de sistemas antioxidantes que discutimos a respeito do NAD+ e da niacina no capítulo de anemias.

Repare que, olhando esse panorama completo, emerge um padrão bastante claro: praticamente todo o arsenal de vitaminas lipossolúveis, A, D, E e K, é afetado principalmente pela combinação de doença hepática e insuficiência pancreática, enquanto o complexo B, sobretudo B1 e folato, é afetado principalmente por lesão direta da mucosa intestinal e por interferência direta do etanol e do acetaldeído na absorção e no metabolismo. Guardar esse agrupamento mental, hepatopancreático de um lado, mucoso-metabólico do outro, ajuda bastante a organizar o raciocínio na hora de decidir o que repor num paciente etilista crônico desnutrido, mais do que decorar cada vitamina isoladamente.





Antes de seguirmos para os órgãos propriamente ditos, precisamos parar num ponto que conecta tudo que acabamos de ver, o motivo fisiológico pelo qual o paciente que bebe cronicamente frequentemente não sente fome, ou sente muito menos fome do que deveria dado o estado de desnutrição instalado, porque é justamente essa desconexão entre necessidade nutricional

real e apetite percebido que explica como alguém consegue chegar a deficiências vitamínicas tão graves quanto as que acabamos de descrever.

O primeiro mecanismo, e talvez o mais simples de entender, é puramente calórico. O etanol fornece sete quilocalorias por grama, um valor energético alto, comparável à gordura e bem acima do carboidrato ou da proteína, mas são calorias vazias no sentido mais literal possível, energia pura sem nenhum aminoácido, ácido graxo essencial, vitamina ou mineral associado. Os sistemas de sinalização de saciedade do corpo, no entanto, não distinguem qualidade nutricional com essa sofisticação, eles respondem principalmente à disponibilidade calórica total e ao estado energético hepático. Um paciente que consome uma quantidade significativa de calorias diárias na forma de álcool está, do ponto de vista puramente energético, tecnicamente "alimentado", e seu corpo reduz naturalmente o estímulo de fome que normalmente o levaria a buscar mais comida, mesmo estando, ao mesmo tempo, em franca desnutrição proteica, vitamínica e mineral. É esse descompasso entre saciedade calórica e desnutrição nutricional real que caracteriza o quadro clássico do etilista crônico desnutrido mas não necessariamente emagrecido.




O segundo mecanismo é gástrico e mediado por via vagal, e aqui já estamos adiantando um pouco o que vamos detalhar na próxima seção sobre o estômago: o contato direto e repetido do etanol com a mucosa gástrica gera gastrite química, inflamação da parede do estômago que, através de aferências vagais que já discutimos brevemente ao falar sobre o núcleo do trato solitário no contexto dos opioides, sinaliza ao tronco encefálico um estado de desconforto visceral e de plenitude gástrica precoce, o corpo

interpreta essa inflamação como se o estômago já estivesse cheio, suprimindo ainda mais o apetite por comida sólida. O terceiro mecanismo é central e inflamatório, e aqui vale resgatar diretamente um mecanismo que já construímos no capítulo sobre anemias, a anemia da doença crônica. Naquele contexto, vimos como citocinas inflamatórias sistêmicas, como a interleucina seis e o fator de necrose tumoral alfa, cruzam a barreira hematoencefálica e geram um estado de fadiga central e lentificação cognitiva. Essas mesmas citocinas, produzidas em quantidade crescente conforme a doença hepática alcoólica progride para hepatite e depois cirrose, como veremos a seguir, atuam diretamente sobre núcleos hipotalâmicos responsáveis pela regulação do apetite, especialmente suprimindo a atividade de neurônios orexígenos que normalmente estimulariam a fome, o mesmo tipo de mecanismo fisiopatológico que explica a anorexia observada em praticamente qualquer doença inflamatória sistêmica crônica, câncer incluído, aqui apenas com a hepatopatia alcoólica como gatilho inflamatório específico.

Com essas três peças reunidas, saciedade calórica vazia, desconforto gástrico vagal e supressão hipotalâmica inflamatória, fica mais fácil entender por que a desnutrição do paciente etilista crônico não é simplesmente uma questão de "não ter dinheiro para comprar comida" ou de escolha comportamental, existe uma base fisiológica real empurrando o apetite para baixo exatamente no momento em que o corpo mais precisaria dele funcionando normalmente. Agora sim, vamos percorrer sistematicamente os principais órgãos afetados pelo consumo crônico de álcool, seguindo a ordem anatômica do próprio trajeto que o etanol percorre pelo corpo, da boca até o sistema nervoso central, para fechar exatamente onde esse livro sempre termina, no impacto sobre o encéfalo.


Boca e Esôfago:

O contato direto e repetido da mucosa oral e esofágica com etanol e, principalmente, com o acetaldeído formado localmente pela ação de enzimas bacterianas orais e da própria mucosa esofágica, gera um efeito genotóxico cumulativo sobre o epitélio escamoso dessas regiões, já que, como estabelecemos no início do capítulo, o acetaldeído forma ligações covalentes anômalas diretamente com o DNA celular. É esse mecanismo que explica por que o consumo crônico de álcool é um dos principais fatores de risco para carcinoma escamoso de esôfago, um risco que se multiplica, e não apenas soma, quando combinado ao tabagismo, já que ambos convergem sobre a mesma via final de dano ao DNA epitelial. Mais agudamente, o consumo excessivo pode gerar lacerações da mucosa na transição esofagogástrica por vômitos repetidos e violentos, as chamadas lacerações de Mallory-Weiss, uma causa relativamente comum de hemorragia digestiva alta nesse contexto.



Estômago:

Já adiantamos parte desse mecanismo na seção sobre apetite: o etanol rompe diretamente a camada de muco protetor que reveste o epitélio gástrico e desestabiliza as junções entre as células epiteliais, permitindo retrodifusão de ácido clorídrico para dentro da própria mucosa, um processo que gera inflamação química direta, a gastrite alcoólica aguda e, com exposição repetida, crônica. Esse processo inflamatório contínuo não só contribui para a supressão do apetite que já discutimos, como também predispõe a erosões e úlceras francas, com risco de sangramento digestivo, e compromete a produção de fator intrínseco pelas células parietais gástricas, o elo que já identificamos como responsável, mais tardiamente, pela deficiência de B12.



Pâncreas:

O álcool exerce toxicidade direta sobre as células acinares pancreáticas, que respondem à exposição crônica aumentando a síntese de enzimas digestivas dentro de um ambiente onde o fluxo normal de secreção fica simultaneamente prejudicado, favorecendo a formação de rolhas proteicas que obstruem pequenos ductos pancreáticos. Essa obstrução, somada à ativação prematura de enzimas digestivas ainda dentro do próprio parênquima pancreático ao invés de apenas no duodeno, é a base fisiopatológica tanto da pancreatite aguda alcoólica, um quadro de autodigestão glandular extremamente dolorosa, quanto, com episódios repetidos ao longo de anos, da pancreatite crônica, caracterizada por fibrose progressiva e perda irreversível de tecido funcionante. É exatamente essa perda de tecido acinar funcionante que gera a insuficiência pancreática exócrina que já citamos repetidamente na seção de vitaminas lipossolúveis, menos enzima digestiva significa menos digestão e absorção de gordura, e consequentemente menos absorção das vitaminas A, D, E e K que dependem dela.





Ilustração que mostra a anatomia do ducto biliar, ductos pancreáticos e a sua convergência para o duodeno.
NETTER, Frank Henry. Atlas de anatomia humana. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.

Fígado:

Chegamos ao órgão mais intimamente ligado ao metabolismo do álcool, e vamos usar diretamente o desequilíbrio redox NADH sobre NAD+ que estabelecemos no início do capítulo para entender toda a progressão da doença hepática alcoólica, que ocorre classicamente em três estágios sequenciais. O primeiro é a esteatose hepática, o fígado gorduroso, e ela decorre quase diretamente daquele excesso de NADH que descrevemos: com o NAD+ escasso, a via de beta-oxidação de ácidos graxos, que depende dele como cofator, fica inibida, enquanto simultaneamente o excesso de NADH favorece a síntese de novos ácidos graxos e de glicerol-3-fosfato, o esqueleto sobre o qual triglicerídeos são montados.

O resultado líquido é que o hepatócito passa a sintetizar mais gordura e a queimar menos gordura ao mesmo tempo, e o excesso se acumula na forma de vacúolos lipídicos intracelulares, um estágio que, isoladamente e se o consumo de álcool cessar, é completamente reversível.


Se a exposição continua, o hepatócito sobrecarregado de gordura e cronicamente agredido pelo acetaldeído e pelo estresse oxidativo associado começa a sofrer morte celular direta, atraindo uma resposta inflamatória local, o segundo estágio, a hepatite alcoólica, caracterizada histologicamente por infiltrado inflamatório, degeneração hepatocelular e o acúmulo intracitoplasmático de agregados proteicos conhecidos como corpúsculos de Mallory-Denk, essencialmente proteínas do citoesqueleto do hepatócito desnaturadas pelo dano tóxico contínuo.



Esse estágio já carrega risco real de descompensação aguda e, diferente da esteatose isolada, nem sempre é totalmente reversível mesmo com abstinência. Com inflamação repetida ao longo de anos, ativa-se o terceiro estágio, a cirrose, processo no qual células estelares hepáticas, normalmente quiescentes e responsáveis apenas por armazenar vitamina A dentro do próprio fígado, algo que já citamos ao falar da deficiência dessa vitamina, se transformam num fenótipo miofibroblástico ativado em resposta à inflamação crônica, e passam a depositar quantidades progressivamente maiores de colágeno na arquitetura hepática. Esse colágeno substitui o parênquima funcionante por tecido fibrótico rígido, distorcendo permanentemente a arquitetura vascular interna do fígado, e é justamente essa distorção estrutural, e não apenas a perda de células funcionantes, que gera a hipertensão portal, o aumento de pressão no sistema venoso que drena o intestino e o baço em direção ao fígado, já que o sangue passa a encontrar uma resistência muito maior para atravessar o órgão fibrosado.

Essa hipertensão portal é responsável por boa parte das complicações

clínicas mais dramáticas da cirrose, varizes esofágicas que podem sangrar cataclismicamente, ascite, e esplenomegalia congestiva com sequestro de plaquetas, um detalhe que vamos retomar na seção hematológica mais à frente. E é justamente sobre essa base estrutural, fígado fibrosado e com hipertensão portal, que se instala o desfecho neurológico final dessa cascata inteira: a encefalopatia hepática.




Já construímos essa fisiopatologia com profundidade nos capítulos sobre encefalopatias e sobre órgãos secundários, o acúmulo de amônia por falência do ciclo da ureia, sua captação astrocitária formando glutamina, o edema astrocitário osmótico resultante, o braço adicional de hipertonia GABAérgica por acúmulo de substâncias de origem intestinal bacteriana e neuroesteroides, e o componente energético da hipoglicemia por falência da gliconeogênese hepática, então não vamos repetir esse mecanismo aqui.

O que vale acrescentar, específico do contexto alcoólico, é que a hipertensão portal que acabamos de descrever cria um agravante adicional: sangue venoso proveniente do intestino, carregado de amônia produzida por bactérias colônicas, passa a desviar parcialmente do fígado através de vasos colaterais formados justamente para aliviar essa pressão portal elevada, os chamados shunts portossistêmicos, entregando amônia diretamente na circulação sistêmica sem sequer passar pelo fígado para tentativa de depuração, o que explica por que a encefalopatia hepática em pacientes cirróticos alcoólicos costuma ser particularmente sensível a qualquer sobrecarga proteica dietética ou a episódios de sangramento digestivo, que aumentam agudamente a carga de nitrogênio oferecida às bactérias intestinais.

Vale ainda destacar duas consequências adicionais da falência hepática crônica que não são metabólicas diretas: primeiro, a coagulopatia por síntese deficiente de fatores de coagulação, que já discutimos parcialmente na seção sobre vitamina K, e que aumenta o risco de sangramentos espontâneos,

incluindo intracranianos; segundo, a possibilidade de acúmulo de manganês nos núcleos da base por falência de sua excreção biliar normal, mecanismo que também já foi citado no capítulo sobre órgãos secundários e que pode gerar sinais parkinsonianos em hepatopatas crônicos avançados, mais um exemplo de como a doença hepática alcoólica reconecta com praticamente todos os mecanismos neurológicos que já construímos ao longo desse livro.





Sistema Cardiovascular


O acetaldeído exerce toxicidade direta sobre o miocárdio, interferindo na função mitocondrial dos cardiomiócitos e favorecendo depósito de colágeno anômalo no interstício cardíaco, um processo que, com exposição crônica e prolongada, resulta em cardiomiopatia dilatada alcoólica, com dilatação progressiva das câmaras cardíacas e queda da fração de ejeção. Existe ainda um efeito elétrico agudo bem descrito, conhecido informalmente como síndrome do coração de férias, na qual um episódio de consumo excessivo e agudo de álcool, tipicamente após um período de abstinência relativa, desencadeia arritmias supraventriculares, mais comumente fibrilação atrial, provavelmente por uma combinação de efeito tóxico direto sobre o tecido de condução atrial, aumento do tônus simpático e alterações eletrolíticas agudas associadas à ingestão excessiva.

Essa conexão importa diretamente para tudo que já construímos sobre demência vascular no capítulo anterior, já que a fibrilação atrial é justamente a origem cardioembólica clássica de AVC isquêmico que discutimos tanto no

capítulo de anatomia vascular quanto no capítulo de farmacologia do AVC, fechando mais um círculo entre capítulos: o álcool pode gerar, através do coração, exatamente o tipo de evento cerebrovascular que alimenta a demência vascular.








Sistema Hematológico:

O álcool e o acetaldeído exercem toxicidade direta sobre os precursores hematopoiéticos na medula óssea, suprimindo sua proliferação normal e favorecendo a formação de eritrócitos anormalmente grandes, uma macrocitose tóxica direta que ocorre mesmo na ausência de qualquer deficiência vitamínica associada, e que se soma, sem se confundir mecanisticamente, à macrocitose por deficiência de B12 ou folato que já detalhamos no capítulo de anemias, ambas empurrando o volume corpuscular médio na mesma direção, mas por vias completamente diferentes. Além disso, a esplenomegalia congestiva secundária à hipertensão portal que já descrevemos favorece o sequestro esplênico de plaquetas, contribuindo para uma trombocitopenia que se soma ao efeito supressor medular direto do álcool sobre os megacariócitos, e à coagulopatia por deficiência de fatores hepáticos que já mencionamos, um paciente cirrótico alcoólico avançado costuma, portanto, acumular simultaneamente múltiplos mecanismos de sangramento fácil, cada um atuando num elo diferente da hemostasia. .



Sistema Imunológico:


O álcool compromete tanto a imunidade inata quanto a adaptativa por múltiplas vias que se somam. Neutrófilos de pacientes etilistas crônicos apresentam capacidade reduzida de migração até o foco infeccioso e de fagocitose efetiva, um efeito tóxico direto do etanol sobre a mobilidade e sobre a produção do burst oxidativo dessas células, o mesmo processo de explosão respiratória que já citamos no capítulo de anemias ao falar sobre o consumo de NAD+ pela niacina. Some-se a isso a supressão medular direta que acabamos de descrever na seção hematológica, que reduz não só a produção

de eritrócitos e plaquetas, mas também a própria reserva de neutrófilos disponíveis para ser recrutada.

Na prática clínica, essa combinação de menos células de defesa e defesa funcionalmente pior explica por que o paciente etilista crônico tem risco marcadamente aumentado de infecções bacterianas graves, com destaque particular para a pneumonia, tanto pela imunossupressão em si quanto por um fator mecânico adicional: a intoxicação aguda reduz o reflexo de tosse e o nível de consciência, aumentando diretamente o risco de aspiração de conteúdo orofaríngeo ou gástrico para a via aérea, uma combinação de fatores imunológicos e mecânicos que torna a pneumonia aspirativa uma das complicações agudas mais temidas nesse contexto.

Sistema Nervoso Periférico:


O álcool gera uma polineuropatia sensitivomotora simétrica e de predomínio distal, o mesmo padrão fisiopatológico de degeneração axonal comprimento-dependente que já detalhamos com profundidade no capítulo sobre órgãos secundários, e que vale a pena revisitar mentalmente aqui: axônios mais longos, como os que inervam os pés, são metabolicamente mais vulneráveis a qualquer agressão tóxica sistêmica crônica, porque dependem de transporte axonal contínuo por distâncias muito maiores, e por isso são os primeiros a falhar.



Nessa neuropatia especificamente, dois mecanismos se sobrepõem: existe toxicidade direta do acetaldeído sobre o axônio e sobre a mitocôndria axonal, e existe o componente nutricional que já detalhamos, sobretudo a deficiência combinada de tiamina e de vitamina E, essa última relevante justamente pelo papel antioxidante de membrana que discutimos na seção de vitaminas, protegendo contra a peroxidação lipídica da própria membrana axonal. É essa combinação de toxicidade direta e carência nutricional simultânea que explica por que a neuropatia alcoólica costuma ser mais precoce e mais intensa do que uma neuropatia carencial pura.

Cerebelo:

Já mencionamos, ainda no capítulo sobre o cerebelo, que essa estrutura é fortemente afetada pelo álcool, e ali descrevemos o efeito agudo, funcional e reversível, responsável pela perda de equilíbrio característica da intoxicação aguda: o etanol potencializa a transmissão inibitória mediada por receptores GABA-A e, simultaneamente, inibe receptores NMDA de glutamato, dois efeitos que juntos suprimem a excitabilidade das células de Purkinje, as principais células de saída do córtex cerebelar, comprometendo transitoriamente toda a função de integração e correção fina de movimento que já detalhamos naquele capítulo.




Corte transversal no nível do pedúnculo cerebelar superior

O que ainda não havíamos discutido é o que acontece com exposição crônica: a combinação de toxicidade direta repetida do etanol e do acetaldeído sobre as células de Purkinje, com a deficiência crônica de tiamina que já sabemos comprometer diretamente o metabolismo energético neuronal, gera degeneração cerebelar alcoólica verdadeira, com perda estrutural e irreversível de células de Purkinje, tipicamente com predileção pelo verme cerebelar anterior e superior. Clinicamente, isso se manifesta como uma ataxia de marcha de base alargada e desproporcionalmente mais intensa do que a incoordenação apendicular dos membros, já que o verme afetado corresponde justamente ao arquicerebelo e paleocerebelo relacionados a postura e marcha, que já discutimos no capítulo 1.3, diferente do padrão de intoxicação aguda que afeta o cerebelo de forma mais global e transitória. .

Encéfalo:

Fechamos exatamente onde esse livro sempre termina, e aqui a maior parte do trabalho mecanístico pesado já foi feita em capítulos anteriores, então vamos nos concentrar em amarrar as pontas. A encefalopatia de Wernicke e a síndrome de Korsakoff, consequências diretas da deficiência de tiamina que detalhamos tanto no início desse capítulo quanto no capítulo sobre anemias,


seguem sendo a manifestação encefálica mais característica e mais urgente do alcoolismo, exatamente pela combinação de baixa ingestão, má absorção intestinal e falência de ativação hepática que já estabelecemos ser tripla nesse contexto.



Além disso, o consumo crônico e prolongado de álcool está associado a atrofia cortical difusa, com predileção relativa pelo córtex frontal, visível em exames de imagem como alargamento dos sulcos e ventrículos proporcionalmente maior do que o esperado para a idade do paciente, um achado estrutural que se correlaciona clinicamente com o comprometimento predominante de função executiva, controle de impulsos e julgamento que costuma acompanhar o alcoolismo crônico avançado, e que, quando suficientemente grave e persistente mesmo após período prolongado de abstinência, é reconhecido como uma entidade clínica própria, a demência relacionada ao álcool, que já citamos ao final do capítulo anterior.


Vale reforçar aqui, agora que já construímos toda a base necessária, que essa demência raramente tem uma causa única e isolada: ela combina neurotoxicidade direta do etanol e do acetaldeído sobre neurônios corticais, o dano nutricional cumulativo por deficiência crônica e repetida de tiamina, mesmo em graus subclínicos que nunca chegaram a se manifestar como uma Wernicke aguda e completa, e a doença cerebrovascular subjacente favorecida tanto pela hipertensão quanto pela fibrilação atrial que já discutimos na seção cardiovascular, um verdadeiro mosaico de mecanismos que resume, de forma quase didática, boa parte de tudo que construímos no capítulo anterior sobre demências. Por fim, precisamos falar sobre dois fenômenos que só fazem sentido quando entendemos a neuroadaptação crônica do sistema nervoso

central à presença constante de álcool. Já estabelecemos que o etanol potencializa agudamente a transmissão GABAérgica e inibe a transmissão glutamatérgica NMDA.



Diante da exposição repetida e prolongada a esse estado de inibição química artificialmente aumentada, o cérebro se adapta homeostaticamente, reduzindo a densidade e a sensibilidade de receptores GABA-A e, simultaneamente, aumentando a densidade e a sensibilidade de receptores NMDA, numa tentativa de restaurar algum equilíbrio funcional de excitabilidade apesar da presença constante do álcool. O problema surge exatamente quando o álcool é subitamente removido desse sistema já readaptado, seja por internação, seja por decisão de parar de beber abruptamente: o efeito inibitório crônico que compensava essa readaptação desaparece de uma vez, mas a readaptação em si, menos GABA-A funcional, mais NMDA funcional, permanece por dias, gerando um estado de hiperexcitabilidade cortical franca e súbita. Esse é o mecanismo exato por trás da síndrome de abstinência alcoólica, que pode variar de tremores e ansiedade em casos leves até crises convulsivas generalizadas e o delirium tremens em casos graves, esse último caracterizado por agitação extrema, alucinações vívidas, tipicamente visuais e táteis, e instabilidade autonômica intensa, taquicardia, hipertensão e

hipertermia, refletindo exatamente essa tempestade de hiperexcitabilidade glutamatérgica somada à perda súbita do freio GABAérgico que o próprio álcool crônico havia induzido.



Um último ponto merece registro, ainda que breve, porque conecta diretamente ao capítulo sobre desenvolvimento neural que já discutimos: quando a exposição ao álcool ocorre durante a gestação, o etanol atravessa livremente a placenta e, no encéfalo fetal em pleno processo de migração neuronal e sinaptogênese, gera apoptose neuronal excessiva e interfere diretamente na migração e na organização cortical normal, através de mecanismos que envolvem tanto estresse oxidativo direto quanto a mesma interferência na sinalização GABAérgica e glutamatérgica que já discutimos para o cérebro adulto, só que aqui atuando sobre um sistema nervoso ainda em construção, não maduro.

O resultado é a síndrome alcoólica fetal, caracterizada por microcefalia, alterações faciais características e deficiência intelectual permanente, um lembrete final de que praticamente todo mecanismo tóxico que discutimos ao longo desse capítulo para o cérebro adulto se torna proporcionalmente mais devastador quando aplicado a um sistema nervoso que ainda depende da plasticidade e da arquitetura precisa que detalhamos no capítulo sobre desenvolvimento neural.


Se olharmos para esse capítulo inteiro de forma panorâmica, fica um princípio simples: praticamente nenhum dos danos que descrevemos, vitamínico, hepático, cardiovascular, hematológico ou neurológico, é um evento isolado,

cada um acelera e potencializa os outros, o fígado doente piora a absorção de vitaminas, a deficiência vitamínica piora a resposta do próprio fígado ao dano, o coração arritmado alimenta a doença cerebrovascular, e tudo isso, somado, converge sobre o mesmo órgão final, o encéfalo. É basicamente um modelo em miniatura de envelhecimento acelerado e multissistêmico, e é exatamente esse conceito, o de como múltiplos sistemas falhando em conjunto aceleram o declínio neurológico, que vamos retomar e generalizar no próximo capítulo, dessa vez olhando não para o álcool especificamente, mas para o processo natural de envelhecimento do sistema nervoso.




Capítulo 13 | Processo de Envelhecimento.

Terminamos o capítulo anterior com uma ideia central: que o álcool funciona como um modelo acelerado e artificial de múltiplos sistemas falhando em conjunto e convergindo sobre o encéfalo. Esse capítulo generaliza essa mesma ideia, só que aplicada ao processo que, mais cedo ou mais tarde, afeta todo mundo, independente de qualquer exposição tóxica externa: o envelhecimento fisiológico normal. Antes de falarmos em doença específica, vale estabelecer o que envelhecer realmente significa do ponto de vista funcional, porque é um conceito que costuma ser mal compreendido mesmo dentro da própria medicina.



Ciclo de retroalimentação negativa



Regulação da temperatura corporal


Envelhecer não é, por si só, adoecer. Envelhecer é perder, de forma lenta, progressiva e biologicamente programada, a reserva funcional de praticamente todo sistema orgânico, um conceito que a geriatria chama de homeostenose, a redução progressiva da capacidade do corpo de manter a homeostase diante de qualquer estresse, seja ele uma infecção, uma cirurgia ou simplesmente um dia mais puxado. Um jovem saudável tem uma reserva cardíaca, renal, hepática e neurológica que ultrapassa em muito sua necessidade basal do dia a dia, e é justamente essa margem de sobra que permite que ele tolere agressões sem descompensar.

Conforme envelhecemos, essa margem encolhe progressivamente em todos os sistemas ao mesmo tempo, não porque cada órgão isoladamente "quebra", mas porque a capacidade de reserva que cada um deles mantinha vai sendo consumida ano após ano, até que uma agressão que um jovem tolera sem sintoma nenhum é suficiente para descompensar clinicamente um idoso. Esse

mesmo raciocínio de reserva, aliás, já apareceu no capítulo sobre demências quando falamos em reserva cognitiva: um cérebro envelhecido não é necessariamente um cérebro doente, mas é um cérebro com menos margem de manobra, o que explica por que a mesma quantidade de patologia acumulada, seja amiloide, seja doença de pequenos vasos, se manifesta clinicamente de forma mais precoce e mais grave em alguns indivíduos do que em outros.



No nível celular, esse encolhimento de reserva tem alguns motores bem estabelecidos que vale conhecer, sem entrarmos a fundo na genética molecular por trás de cada um. Existe o acúmulo progressivo de dano oxidativo, já que mitocôndrias envelhecidas se tornam gradualmente menos eficientes na cadeia transportadora de elétrons que já detalhamos no capítulo de anemias, produzindo relativamente mais radicais livres a cada unidade de ATP gerada, um processo cumulativo que lesa lipídeos de membrana, proteínas e o próprio DNA mitocondrial ano após ano. Existe também a **senescência celular**, um estado no qual células danificadas, ao invés de se dividirem normalmente ou sofrerem apoptose limpa, entram numa espécie de "aposentadoria" metabólica, param de se dividir, mas permanecem vivas e metabolicamente ativas, secretando continuamente um coquetel de citocinas e moléculas pró-inflamatórias no tecido ao redor, o que contribui diretamente para o terceiro motor, chamado inflammaging, um estado de inflamação sistêmica crônica, de baixo grau, mas persistente, que acompanha o envelhecimento normal mesmo na ausência de qualquer infecção ou doença autoimune.



Vale reconhecer aqui exatamente o mesmo tipo de citocinas, interleucina seis e fator de necrose tumoral alfa à frente, que já usamos repetidamente nesse livro, na anemia de doença crônica e na supressão de apetite do etilista crônico, reforçando que esse não é um mecanismo exclusivo de nenhuma doença específica, é um dos motores inflamatórios mais universais do corpo humano, aqui apenas operando de forma crônica e de baixa intensidade ao longo de décadas, ao invés de aguda e intensa. Com essa base estabelecida, podemos agora sim falar sobre o que realmente importa na prática: quais hábitos ajudam a preservar essa reserva funcional pelo maior tempo possível, e quais fatores aceleram sua perda.

Atividade Física, é entre todas as intervenções não farmacológicas conhecidas, a que possui o efeito mais consistente e mais bem documentado sobre a preservação neurológica no envelhecimento, e o motivo não é apenas cardiovascular, embora esse componente também importe e vamos retomá-lo adiante. O exercício aeróbico regular aumenta a produção de um fator neurotrófico derivado do cérebro, uma proteína que atua essencialmente como um fertilizante sináptico, estimulando a sobrevivência neuronal, o crescimento de novas conexões dendríticas e, especificamente no giro denteado do hipocampo, uma das raríssimas regiões do encéfalo adulto que mantém alguma capacidade de neurogênese ao longo da vida, favorecendo literalmente a formação de neurônios novos nessa estrutura que já identificamos, no capítulo sobre demências, como o epicentro inicial da patologia do Alzheimer. Além desse efeito direto, o exercício também estimula angiogênese cerebral, aumentando a densidade de capilares e, consequentemente, a oferta de oxigênio e glicose ao tecido nervoso, e reduz sistemicamente boa parte dos próprios fatores de risco vascular, hipertensão, resistência à insulina e dislipidemia, que já identificamos no capítulo anterior como o motor da demência vascular.






Figura 3 - Sistema de hipocretinas e conexões
Neurônios excitatórios hipocretinas I e II do hipotálamo lateral inervam o sistema ativador ascendente e córtex cerebral. GABA: ácido gama-hidroxitubírico.

Sono , já mencionamos ao longo desse livro, de forma pontual, o papel do sono na consolidação de memória, mas vale aqui detalhar um mecanismo mais específico e diretamente relevante para o envelhecimento saudável: durante o sono de ondas lentas, o espaço extracelular do encéfalo se expande fisicamente, facilitando um fluxo aumentado de líquido cefalorraquidiano através do parênquima cerebral, o chamado sistema glinfático, uma rede de depuração que funciona de forma análoga ao sistema linfático do resto do corpo, mas específica do sistema nervoso central. É através desse fluxo aumentado durante o sono profundo que boa parte do peptídeo beta-amiloide produzido ao longo do dia é fisicamente lavada para fora do parênquima cerebral. Isso significa que a privação crônica de sono não é apenas um fator de cansaço ou de pior desempenho cognitivo no dia seguinte, ela reduz diretamente a depuração de exatamente a proteína que identificamos, no capítulo anterior, como o gatilho inicial da cascata patológica do Alzheimer, um dos elos mais diretos e mecanisticamente elegantes entre um hábito modificável e o risco de demência neurodegenerativa.



Reserva Cognitiva e Estimulação Mental, retomando o conceito que já introduzimos ao falar de comprometimento cognitivo leve, manter o cérebro ativamente engajado ao longo da vida, através de estudo, leitura, aprendizado de novas habilidades ou qualquer atividade que exija esforço cognitivo genuíno, não impede o acúmulo biológico de patologia neurodegenerativa em si, mas aumenta a densidade sináptica e a redundância de redes neurais alternativas disponíveis para compensar essa patologia, atrasando o momento em que o dano acumulado ultrapassa a capacidade compensatória do tecido e se torna clinicamente aparente. É por isso que dois indivíduos podem ter, post-mortem, uma carga histopatológica de placas amiloides e emaranhados de tau praticamente idêntica, e ainda assim ter tido trajetórias clínicas completamente diferentes em vida, um com demência franca anos antes do outro, a diferença estando justamente na reserva cognitiva acumulada, não na quantidade de doença propriamente dita.




Controle de Fatores de Risco Vascular, hipertensão, diabetes e dislipidemia crônicas e mal controladas aceleram diretamente a doença de pequenos vasos e a aterosclerose de grandes vasos que já detalhamos no capítulo de anatomia vascular e no capítulo anterior sobre demência vascular, então o controle rigoroso desses três fatores ao longo da vida adulta é, na prática, uma das formas mais diretas de prevenção não apenas de AVC, mas de declínio cognitivo vascular cumulativo, mesmo na ausência de qualquer evento isquêmico clinicamente identificável.

Dieta e Controle Nutricional, padrões alimentares ricos em antioxidantes, gorduras insaturadas e pobres em açúcar refinado e gordura saturada em excesso ajudam a conter tanto o estresse oxidativo quanto o componente inflamatório crônico que já descrevemos como motores centrais do envelhecimento celular, além de contribuir diretamente para o controle dos próprios fatores de risco vascular que acabamos de mencionar. Vale lembrar aqui, retomando diretamente o capítulo sobre anemias, que a manutenção de níveis adequados de B12 e folato ao longo da vida também mantém a homocisteína sob controle, evitando o efeito pró-trombótico e disfuncional sobre o endotélio que já identificamos como acelerador silencioso de doença de pequenos vasos.

Engajamento Social, menos óbvio fisiologicamente, mas cada vez mais reconhecido como fator protetor independente, o isolamento social crônico se associa a maior ativação crônica do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal e a níveis mais elevados de cortisol circulante, um hormônio que, em exposição crônica e não apenas aguda, é diretamente tóxico para os neurônios do hipocampo, a mesma estrutura que já identificamos repetidamente nesse capítulo e no anterior como particularmente vulnerável ao longo do envelhecimento. Além desse componente neuroendócrino direto, o convívio social mantém o indivíduo cognitivamente estimulado de forma natural e constante, reforçando indiretamente o próprio conceito de reserva cognitiva que já discutimos.

Do outro lado dessa equação, existem fatores que aceleram ativamente a perda de reserva funcional, muitos deles já detalhados em capítulos anteriores e que vale apenas reconectar aqui. O sedentarismo crônico reverte exatamente os benefícios que descrevemos sobre o exercício, reduzindo o fator neurotrófico derivado do cérebro e permitindo a progressão livre dos fatores de risco vascular. O tabagismo soma toxicidade oxidativa direta sobre o endotélio vascular à própria carga aterosclerótica sistêmica. O consumo crônico de álcool, que dedicamos o capítulo inteiro anterior para detalhar, funciona essencialmente como um acelerador multissistêmico do próprio envelhecimento, cada mecanismo que descrevemos ali, hepático, vascular, nutricional e neurotóxico direto, soma-se aos motores fisiológicos normais de envelhecimento ao invés de substituí-los.




Diabetes e hipertensão cronicamente descontrolados aceleram diretamente a formação de produtos finais de glicação avançada, moléculas geradas quando o excesso crônico de glicose circulante se liga de forma não enzimática a proteínas estruturais, enrijecendo literalmente a parede dos vasos sanguíneos e reduzindo sua complacência normal, um mecanismo adicional de dano vascular que se soma à aterosclerose clássica.


A perda auditiva não corrigida, um fator de risco frequentemente subestimado, reduz cronicamente o estímulo sensorial que chega ao córtex e favorece isolamento social progressivo, somando dois dos mecanismos que já discutimos, menos estimulação cognitiva e mais isolamento, numa mesma condição.

E a polifarmácia, especialmente o uso crônico e cumulativo de fármacos com ação anticolinérgica, que já mapeamos em detalhe no capítulo de farmacologia, soma um bloqueio químico direto sobre exatamente o sistema de neurotransmissão que sabemos estar naturalmente mais escasso no cérebro envelhecido, mesmo antes de qualquer doença neurodegenerativa se instalar. Com esse pano de fundo estabelecido, vamos agora percorrer, de forma breve, as doenças neurológicas mais comumente associadas ao envelhecimento que ainda não detalhamos em capítulos anteriores, já que a doença de Alzheimer, a demência vascular, a demência por corpos de Lewy e o AVC, todas fortemente associadas à idade avançada, já foram exaustivamente cobertas.

Doença de Parkinson , já construímos toda a base fisiopatológica dessa doença, a degeneração da via nigroestriatal dopaminérgica e o desequilíbrio resultante entre a via direta e indireta dos núcleos da base, em capítulos anteriores, e o tratamento farmacológico com levodopa já foi detalhado no capítulo de farmacologia, então não vamos repetir esse mecanismo aqui. O que vale acrescentar, especificamente sob a ótica do envelhecimento, é que a substância negra perde neurônios dopaminérgicos de forma lenta e gradual mesmo no envelhecimento fisiológico normal, sem doença nenhuma associada, e a doença de Parkinson idiopática se manifesta clinicamente apenas quando essa perda, seja ela basal mais uma perda patológica adicional, ultrapassa um limiar crítico, estimado classicamente em torno de sessenta a oitenta por cento dos neurônios dopaminérgicos daquela via, exatamente o mesmo tipo de raciocínio de reserva funcional que já estabelecemos no início desse capítulo, agora aplicado especificamente a uma única população neuronal ao invés de ao encéfalo como um todo.



Tremor Essencial, vale uma diferenciação rápida e clinicamente valiosa em relação ao Parkinson, já que ambos cursam com tremor e são frequentemente confundidos por leigos. O tremor essencial é um tremor de ação e postural, ou seja, piora quando o paciente sustenta uma posição contra a gravidade ou realiza um movimento voluntário, como levar uma xícara à boca, e tipicamente melhora, ao menos parcialmente, com pequenas doses de álcool, um detalhe curioso que se conecta ao efeito GABAérgico do etanol que já detalhamos no capítulo anterior. Já o tremor parkinsoniano clássico é um tremor de repouso, que aparece justamente quando o membro está relaxado e sem realizar nenhuma tarefa, e tende a diminuir ou desaparecer durante o movimento voluntário, o oposto exato do padrão do tremor essencial.



Fisiopatologicamente, o tremor essencial não decorre de degeneração dopaminérgica nigroestriatal, mas sim de uma disfunção na atividade

oscilatória de um circuito que envolve o cerebelo, o tálamo e o córtex motor, e por isso não responde à levodopa, ao contrário do tremor parkinsoniano, uma diferença terapêutica que só reforça a importância de diferenciar corretamente os dois quadros antes de iniciar qualquer tratamento.

Neuropatia Periférica do Idoso , a causa mais comum aqui é a neuropatia diabética, decorrente exatamente do mesmo mecanismo de degeneração axonal comprimento-dependente que já detalhamos no capítulo sobre órgãos secundários e novamente no capítulo anterior sobre álcool, agora desencadeada pela hiperglicemia crônica, que gera tanto os mesmos produtos finais de glicação avançada que já mencionamos, dessa vez lesando diretamente proteínas estruturais do próprio axônio e da bainha de mielina, quanto dano microvascular direto aos pequenos vasos que nutrem o nervo periférico, os vasa nervorum, reduzindo cronicamente sua perfusão. O padrão clínico resultante é, mais uma vez, o mesmo padrão sensitivo-motor simétrico e ascendente que já vimos repetidamente nesse livro, reforçando como diferentes agressões metabólicas convergem sistematicamente sobre o mesmo tipo de axônio vulnerável.




Estenose do Canal Vertebral e Mielopatia Cervical Degenerativa, uma causa mecânica, e não metabólica ou neurodegenerativa, de disfunção neurológica progressiva no idoso, mas extremamente prevalente e relevante. Ao longo de décadas, os discos intervertebrais perdem hidratação e altura, as facetas articulares desenvolvem artrose compensatória e o ligamento amarelo, que já vimos brevemente no contexto da anatomia da coluna, sofre hipertrofia e calcificação progressiva, um conjunto de alterações degenerativas que, somadas, estreitam progressivamente o canal vertebral disponível para a medula ou para as raízes nervosas.

Quando esse estreitamento ocorre na região lombar, comprime predominantemente as raízes da cauda equina, gerando a chamada claudicação neurogênica, dor e fraqueza nos membros inferiores que piora tipicamente com a posição ereta prolongada e com a extensão da coluna, e melhora caracteristicamente quando o paciente se inclina para frente, por exemplo apoiado num carrinho de supermercado, já que essa flexão aumenta transitoriamente o diâmetro do canal vertebral, um detalhe clínico que ajuda a diferenciar essa condição da claudicação vascular por doença arterial periférica, que também gera dor nos membros inferiores ao caminhar, mas que não tem relação nenhuma com a postura da coluna, apenas com a distância percorrida.




Quando o estreitamento ocorre na região cervical, comprime diretamente a medula espinhal, gerando a mielopatia cervical degenerativa, que cursa com uma combinação característica de sinais de neurônio motor superior nos membros inferiores, hiperreflexia e espasticidade, com sinais de neurônio motor inferior nos membros superiores, ao nível da compressão, além de

perda de destreza manual fina e alterações de marcha, um padrão clínico que faz sentido imediato à luz de tudo que já construímos sobre as vias motoras no início desse livro.




Dr Ricardo Teixeira

Quedas e Hematoma Subdural Crônico, fechamos essa seção com uma condição que amarra diretamente conceitos que já vimos no capítulo sobre manejo do TCE. A atrofia cortical fisiológica do envelhecimento normal, mesmo na ausência de qualquer doença neurodegenerativa, aumenta o espaço entre a superfície do encéfalo e a dura-máter, esticando progressivamente as veias-ponte que atravessam esse espaço, as mesmas veias que já identificamos como responsáveis pelo hematoma subdural.



(Veja como tenho compressão do encéfalo com desvio da linha média devido a um hematoma Subdural Crônico).
Um cérebro mais atrofiado tem veias-ponte mais esticadas e mais vulneráveis à ruptura mesmo diante de um trauma craniano mínimo, muitas vezes um trauma tão leve que o próprio paciente ou a família nem se lembra do episódio, o que explica por que o hematoma subdural crônico do idoso costuma se apresentar semanas depois do trauma original, com um declínio cognitivo lentamente progressivo que é frequentemente confundido inicialmente com uma demência neurodegenerativa, mais um lembrete de que, diante de qualquer declínio cognitivo subagudo em um idoso, faz parte do raciocínio diferencial que já construímos no capítulo anterior investigar ativamente essa possibilidade antes de assumir uma causa irreversível.




Se olharmos para esse capítulo como um todo, o fio condutor é sempre o mesmo: envelhecer não é uma doença, é a perda gradual e universal de reserva funcional em todos os sistemas simultaneamente, e cada hábito ou fator de risco que discutimos aqui simplesmente acelera ou desacelera essa perda de reserva, sem alterar a direção geral do processo.

Depois de termos percorrido, ao longo desse livro, praticamente todo o ciclo da vida neurológica, sua formação no capítulo sobre desenvolvimento neural, suas doenças adquiridas ao longo da vida adulta, e agora seu desgaste natural no envelhecimento, fecha-se um círculo interessante voltarmos, no próximo capítulo, exatamente ao ponto de partida: não ao envelhecimento do sistema nervoso, mas à sua formação, e a tudo que pode dar errado nesse processo construtivo antes mesmo do primeiro dia de vida.

Capítulo 14 | Más-formações Embrionárias.

Lá no capítulo sobre desenvolvimento neural, deixamos uma promessa em aberto: "vamos deixar a embriologia detalhada e as más formações para os capítulos mais à frente, dedicados especificamente a esse tema". Chegou a hora de cumprir essa promessa. E há algo esteticamente satisfatório em fazer isso logo depois do capítulo sobre envelhecimento, porque literalmente fechamos o ciclo completo da vida neurológica: entendemos como o sistema nervoso se desgasta no fim da vida, e agora voltamos exatamente ao seu primeiro rascunho, às poucas semanas de vida embrionária em que toda a arquitetura que estudamos ao longo desse livro inteiro, do córtex à medula, é montada pela primeira vez, e a tudo que pode dar errado nesse processo de montagem antes mesmo do nascimento.



Já estabelecemos no capítulo 9 que, por volta da terceira e quarta semana de vida embrionária, o tubo neural se fecha e se diferencia nas vesículas primárias e secundárias que já conhecemos. O que não detalhamos naquele momento, e que é o ponto de partida indispensável para esse capítulo, é como exatamente esse tubo se fecha.

O processo, chamado neurulação, começa com uma placa neural plana na superfície dorsal do embrião que se dobra sobre si mesma, suas bordas laterais, chamadas prega neurais, se elevam e se aproximam na linha média até se fundirem, transformando a placa achatada num tubo oco. Essa fusão não ocorre como um zíper único correndo de uma ponta a outra, ela começa

numa região central, aproximadamente ao nível do que se tornará a futura região cervical, e progride simultaneamente em duas direções, uma onda rostral em direção à futura cabeça e uma onda caudal em direção à futura cauda, deixando temporariamente duas aberturas nas extremidades, os neuróporos rostral e caudal, que se fecham por último, o rostral por volta do vigésimo quinto dia e o caudal por volta do vigésimo oitavo dia de gestação. Essa é a chamada neurulação primária, responsável por formar o tubo neural desde a região cranial até aproximadamente a altura lombar superior.




Fig. 17: Esquemas mostrando o início da somitização. Em A, uma vista dorsal do embrião após a retirada do âmnio. Em B, um corte transversal mostrando os somitos lateralmente à notocorda.


Fonte: Moore KL, Persaud TVN, Torchia, MG. Embriologia clínica. 9a ed. Rio de Janeiro (RJ): Elsevier; 2012.

A porção mais caudal do tubo, correspondente aos segmentos sacrais e coccígeos, se forma por um processo ligeiramente diferente, chamado neurulação secundária, no qual um cordão celular maciço se condensa na cauda do embrião e posteriormente se canaliza internamente, formando um tubo oco a partir de dentro para fora, ao invés de se fechar de fora para dentro como na neurulação primária.

Guardar essa diferença entre neurulação primária e secundária não é só um detalhe embriológico decorativo, é o que explica diretamente por que os defeitos de fechamento do tubo neural que vamos discrever a seguir se concentram tão previsivelmente em duas regiões, a extremidade cranial e a região lombossacra, exatamente os dois pontos de fechamento mais tardio e, portanto, mais vulneráveis a qualquer interrupção nesse processo. Antes de entrarmos doença por doença, vale estabelecer um último princípio geral de teratologia, o estudo das más formações congênitas, que vai nos ajudar a entender por que agressões muito diferentes entre si, genéticas, nutricionais, infecciosas ou tóxicas, podem gerar o mesmo tipo de malformação, e por que a mesma agressão pode gerar malformações completamente diferentes dependendo apenas do momento em que ocorre.

O que determina o tipo de malformação resultante não é tanto a natureza específica do agente agressor, mas principalmente o estágio do

desenvolvimento embrionário em que a agressão ocorre, já que cada estrutura tem sua própria janela crítica de formação. Uma agressão durante a terceira e quarta semana, quando o tubo neural ainda está se fechando, tende a gerar defeitos de fechamento; uma agressão um pouco mais tardia, quando o prosencéfalo está se dividindo em dois hemisférios, tende a gerar defeitos de clivagem; e uma agressão ainda mais tardia, durante os meses em que os neurônios estão migrando de onde nasceram até onde vão funcionar, tende a gerar defeitos de migração. É esse mesmo princípio de janela temporal crítica, aliás, que já usamos ao falar da síndrome alcoólica fetal no capítulo anterior, e que vamos ver se repetir constantemente ao longo desse capítulo.



Defeitos de Fechamento do Tubo Neural, é, de longe, o grupo mais comum e mais importante de más formações do sistema nervoso central, e decorre exatamente do que acabamos de descrever: uma falha, parcial ou completa, do fechamento normal do tubo neural durante a terceira e quarta semana de gestação. Antes de detalhar cada apresentação específica, vale destacar o fator de risco mais importante e mais modificável de todo esse grupo, porque ele conecta diretamente com o capítulo sobre anemias: a deficiência de ácido fólico no período periconcepcional.


O folato é indispensável para reações de metilação e para a síntese de bases nitrogenadas necessárias à intensa proliferação celular que ocorre durante o fechamento do tubo neural, e sua deficiência nesse período específico, muitas vezes antes mesmo de a gestante saber que está grávida, já que o fechamento

se completa antes do final da quarta semana, aumenta substancialmente o risco desses defeitos, o que explica por que a suplementação de ácido fólico é hoje recomendada de forma periconcepcional, começando idealmente antes mesmo da concepção, e não apenas após a confirmação da gravidez.



Quando a falha de fechamento ocorre na extremidade rostral, no neuróporo cranial, o resultado é a anencefalia, a mais grave e uniformemente letal dessas condições: sem o fechamento do tubo neural nessa região, as estruturas cerebrais que se formariam a partir dele ficam expostas diretamente ao líquido amniótico ao invés de protegidas sob um tubo neural fechado e, posteriormente, sob a calvária óssea que se desenvolveria a partir da indução do tubo neural fechado sobre o mesênquima adjacente, degenerando progressivamente ao longo da gestação por exposição direta e traumatismo mecânico repetido, restando ao nascimento pouco ou nenhum tecido telencefálico reconhecível, e ausência da calvária craniana, incompatível com sobrevida além de poucas horas ou dias após o nascimento. Quando o fechamento cranial falha de forma mais localizada, e não ao longo de toda a extensão rostral como na anencefalia, o resultado é a encefalocele, uma herniação de meninges, líquor e, frequentemente, tecido encefálico propriamente dito, através de um defeito ósseo focal no crânio, mais comumente na região occipital. Diferente da anencefalia, aqui existe uma

calvária formada ao redor do defeito, e o prognóstico varia enormemente dependendo da quantidade de tecido neural efetivamente herniado e de sua funcionalidade remanescente, desde quadros com desenvolvimento neurológico relativamente preservado após correção cirúrgica até quadros com déficits graves quando uma porção substancial de tecido cerebral funcionante está envolvida na herniação.




Quando a falha de fechamento ocorre no neuróporo caudal ou na região de neurulação secundária, o resultado é a espinha bífida, e aqui vale entender que não estamos falando de uma condição única, mas de um espectro de gravidade que depende de quanto e quais tecidos herniam através do defeito ósseo vertebral posterior. Na forma mais leve, a espinha bífida oculta, existe apenas uma falha de fusão dos arcos vertebrais posteriores, tipicamente na região lombossacra, sem qualquer herniação de meninges ou tecido neural através do defeito, a medula permanece em sua posição normal e coberta por pele intacta, e a condição é frequentemente um achado incidental completamente assintomático, às vezes sinalizado externamente apenas por uma pequena depressão cutânea, um tufo de pelos localizado ou uma mancha de nascença sobre a região lombossacra, sinais cutâneos que valem a pena reconhecer porque, ainda que a maioria seja benigna, ocasionalmente sinalizam uma disrafia oculta mais complexa por baixo, incluindo aderências entre a pele e a medula que podem gerar um quadro de medula presa, na qual a medula fica


ancorada anormalmente baixa e sob tração progressiva conforme a criança cresce, gerando déficits neurológicos lentamente progressivos nos membros inferiores e na função esfincteriana ao longo da infância.

Na **meningocele**, o defeito ósseo permite a herniação de meninges e líquor, formando um saco cístico visível externamente coberto por pele, mas sem tecido neural dentro desse saco, a medula permanece em sua posição e configuração anatômica normal dentro do canal vertebral, o que torna essa forma de espinha bífida aberta relativamente mais benigna, com correção cirúrgica geralmente resultando em bom prognóstico neurológico.

Na forma mais grave e também mais comum entre as formas abertas, a **mielomeningocele**, o próprio tecido neural, a medula espinhal e suas raízes nervosas, hernia junto com as meninges através do defeito, frequentemente sem cobertura cutânea completa, deixando o tecido neural exposto e vulnerável a infecção e a lesão mecânica direta desde o nascimento até a correção cirúrgica. O nível vertebral em que ocorre a **mielomeningocele** determina diretamente a extensão do déficit neurológico, seguindo exatamente a lógica de organização segmentar da medula que já construímos no primeiro capítulo desse livro, tipicamente resultando em paralisia flácida dos membros inferiores abaixo do nível da lesão, perda sensitiva correspondente, e disfunção vesical e intestinal neurogênica por comprometimento das raízes sacrais responsáveis por esse controle. Vale destacar aqui uma associação extremamente importante e muito cobrada: a **mielomeningocele está fortemente associada à malformação de Chiari** tipo dois, uma condição que vamos detalhar a seguir, e essa associação não é coincidência, existe uma teoria mecânica bem aceita de que a perda crônica de líquor através do defeito espinhal aberto durante a gestação reduz a pressão intracraniana fetal o suficiente para alterar o desenvolvimento normal da fossa posterior, favorecendo o deslocamento caudal de estruturas do rombencéfalo que caracteriza essa malformação.




Malformação de Chiari, refere-se ao deslocamento caudal, através do forame magno, de estruturas normalmente confinadas à fossa posterior, e existe uma diferença fisiopatológica e clínica importante entre seus dois tipos principais. No tipo um, a mais comum e geralmente a mais benigna, apenas as tonsilas cerebelares descem através do forame magno, tipicamente permanecendo clinicamente silenciosa por anos ou décadas até se manifestar, quando se manifesta, já na vida adulta, com cefaleia occipital tipicamente desencadeada ou piorada por manobras de Valsalva, tosse ou esforço, justamente porque esses movimentos aumentam transitoriamente a pressão intracraniana e comprimem ainda mais as tonsilas já deslocadas contra o forame magno.
No tipo dois, praticamente sempre associado à mielomeningocele como acabamos de descrever, o deslocamento caudal é muito mais extenso, envolvendo não apenas as tonsilas cerebelares, mas todo o verme cerebelar inferior e porções do próprio tronco encefálico, e se manifesta já no período neonatal ou na primeira infância, com sinais de disfunção de tronco encefálico como estridor por paralisia de cordas vocais, apneia e dificuldade de deglutição, refletindo compressão direta dos núcleos de nervos cranianos baixos que já estudamos no capítulo sobre tronco encefálico.




Em ambos os tipos, o deslocamento caudal das estruturas da fossa posterior obstrui parcialmente o fluxo normal de líquor através do forame magno e ao redor do tronco encefálico, gerando duas consequências que vale a pena reconectar com o que já sabemos sobre dinâmica liquórica do primeiro capítulo desse livro.

A primeira é a hidrocefalia, por dificultar a circulação e a reabsorção normal do líquor produzido nos ventrículos. A segunda, mais sutil mas igualmente importante, é a siringomielia, na qual essa obstrução ao fluxo liquórico normal ao redor do forame magno favorece a formação e a expansão progressiva de uma cavidade cística preenchida por líquido dentro do próprio parênquima medular, o canal central patologicamente dilatado, que cresce lentamente e comprime as fibras que cruzam a linha média na comissura branca anterior, exatamente as fibras espinotalâmicas responsáveis pela sensibilidade térmica e dolorosa que já detalhamos no capítulo sobre vias sensitivas, o que explica o achado clínico clássico e frequentemente citado da siringomielia, uma perda sensitiva dissociada, com perda de sensibilidade térmica e dolorosa mas preservação da sensibilidade tátil e proprioceptiva, tipicamente numa

distribuição em "capa" sobre os ombros e membros superiores, já que a cervical é a região mais comumente afetada.




Holoprosencefalia, decorre de uma falha na clivagem normal do prosencéfalo em dois hemisférios cerebrais distintos durante aproximadamente a quinta e sexta semana de gestação, um processo que, sem entrarmos na sinalização molecular específica por trás dele, depende de sinais indutores originados de estruturas da linha média facial embrionária. É justamente por essa origem embriológica compartilhada entre o prosencéfalo e as estruturas faciais da linha média que a holoprosencefalia vem, na grande maioria dos casos, acompanhada de anomalias faciais correspondentes na linha média, cuja gravidade tende a acompanhar proporcionalmente a gravidade do defeito cerebral, um princípio conhecido informalmente como "a face prediz o cérebro".



Na forma mais grave, a variante alobar, os hemisférios cerebrais permanecem completamente não separados, formando uma única câmara ventricular contígua ao invés de ventrículos laterais distintos, tipicamente acompanhada da anomalia facial mais extrema, a ciclopia, com um único olho central ou olhos fundidos. Formas intermediárias e mais leves, semilobar e lobar, apresentam graus progressivamente menores de fusão hemisférica e anomalias faciais proporcionalmente mais sutis, podendo se manifestar apenas como um único incisivo central superior ou hipotelorismo discreto.


Agenesia do Corpo Caloso, decorre de uma falha, parcial ou completa, no desenvolvimento das fibras comissurais que normalmente cruzariam a linha média conectando os dois hemisférios cerebrais, a principal via de comunicação interhemisférica que já mencionamos brevemente ao longo desse livro. Diferente de praticamente todas as más formações que já discutimos até aqui, essa é notável por sua apresentação clínica frequentemente discreta ou até completamente assintomática, já que outras vias comissurais menores e mecanismos de reorganização funcional durante o desenvolvimento conseguem compensar parcialmente a ausência dessa via principal, especialmente quando a agenesia é isolada e não acompanha outras anomalias estruturais associadas, o que não é incomum. Quando sintomática, tipicamente se manifesta de forma sutil, com dificuldades específicas em tarefas que exigem integração interhemisférica rápida e coordenada, ao invés do quadro clínico dramático que costumamos associar a más formações do sistema nervoso central.



(Anatomia do corpo Caloso para treino e identificação de estruturas)




Defeitos de Migração Neuronal, depois que os neurônios são gerados pelas células progenitoras que revestem a parede dos ventrículos, eles precisam migrar até sua posição cortical final, um trajeto que percorrem majoritariamente guiados por prolongamentos radiais de células da glia radial, que funcionam essencialmente como trilhos físicos esticados da região periventricular até a superfície pial, ao longo dos quais os neurônios em migração literalmente deslizam até alcançar sua camada cortical de destino, formando o córtex numa sequência de dentro para fora, na qual os neurônios gerados mais precocemente ocupam as camadas corticais mais profundas e os gerados mais tardiamente migram além deles para ocupar camadas progressivamente mais superficiais.




Uma falha nesse processo, seja por um defeito nos próprios neurônios migratórios, seja por um defeito estrutural nos trilhos de glia radial que deveriam guiá-los, gera um espectro de más formações corticais conhecidas coletivamente como malformações do desenvolvimento cortical. Na forma mais extrema, a **lisencefalia**, a migração neuronal fica tão globalmente comprometida que o córtex cerebral não desenvolve seus giros e sulcos normais, permanecendo com uma superfície lisa e simplificada, semelhante à de um cérebro fetal em estágio muito mais precoce, associada tipicamente a epilepsia grave e refratária e a atraso global do desenvolvimento profundo. Formas mais localizadas e menos extensas incluem a **polimicrogiria**, na qual a superfície cortical desenvolve um excesso de giros pequenos e anormalmente organizados numa região circunscrita, e as heterotopias neuronais, nas quais grupos de neurônios simplesmente param sua migração pelo caminho e permanecem alojados em posições anômalas, mais comumente numa fileira ao longo da região periventricular, ao invés de completarem sua jornada até o córtex, funcionando essencialmente como ilhas de tecido neuronal mal posicionado que se tornam focos frequentes de atividade epiléptica, já que essas conexões formadas fora do circuito cortical normal tendem a ser

desorganizadas e hiperexcitáveis.



Cobertas as más formações mais comuns e mais centrais para a prática e para provas, vale fecharmos com uma seção mais breve sobre condições menos frequentes, mas que, dentro do universo das más formações raras, ainda aparecem com regularidade suficiente para merecer reconhecimento.

Malformação de Dandy-Walker, caracterizada por uma tríade de agenesia ou hipoplasia do verme cerebelar, dilatação cística do quarto ventrículo que preenche praticamente toda a fossa posterior, e aumento compensatório do tamanho da própria fossa posterior óssea para acomodar essa dilatação. Decorre de uma falha no desenvolvimento normal do teto do quarto ventrículo durante a vida embrionária, e assim como a Chiari, frequentemente resulta em hidrocefalia associada, aqui por obstrução direta da drenagem do próprio quarto ventrículo dilatado, ao invés da obstrução mais periférica ao nível do forame magno que já descrevemos na Chiari.



Doença de Hirschsprung , merece um espaço à parte porque, diferente de todas as condições anteriores desse capítulo, ela não é uma malformação do sistema nervoso central, mas sim do sistema nervoso periférico autônomo, e nos dá a oportunidade de reconectar com um tecido embrionário que já mencionamos de passagem em capítulos anteriores, a crista neural.
A crista neural é uma população de células que se destaca das bordas do tubo neural durante o próprio fechamento que descrevemos no início desse capítulo, e migra extensamente por todo o embrião, dando origem, entre muitas outras estruturas, aos gânglios do sistema nervoso periférico e autônomo, incluindo os plexos nervosos entéricos que já estudamos como responsáveis pela motilidade intestinal intrínseca.



Na doença de Hirschsprung, células precursoras da crista neural destinadas a colonizar os plexos entéricos do intestino distal falham em completar essa migração até o segmento mais distal do cólon e reto, resultando num segmento terminal completamente desprovido de gânglios entéricos, aganglionose que, por não conseguir gerar o relaxamento peristáltico normal necessário para propelir o conteúdo fecal, funciona como uma obstrução funcional crônica, tipicamente se manifestando no período neonatal como atraso na eliminação do mecônio e distensão abdominal progressiva.
É um exemplo didático elegante de como um defeito na migração de células da crista neural, o mesmo tipo geral de processo migratório que discutimos para os neurônios corticais, pode gerar uma doença que se manifesta longe do sistema nervoso central, diretamente no trato gastrointestinal.



Craniossinostose , refere-se à fusão prematura de uma ou mais suturas cranianas, as mesmas suturas que já discutimos no capítulo sobre desenvolvimento neural como estruturas deliberadamente mantidas abertas durante a infância para acomodar o crescimento encefálico.
Quando uma sutura específica se fecha precocemente, o crescimento craniano nessa direção fica restringido, mas o encéfalo, que continua crescendo normalmente por trás dela, força um crescimento compensatório nas direções ainda desimpedidas pelas suturas remanescentes, gerando formatos cranianos característicos e previsíveis conforme qual sutura especificamente fechou precocemente.
Na maioria dos casos isolados, o crescimento encefálico total não fica comprometido, o problema é predominantemente estético e ortopédico craniano, mas quando múltiplas suturas fecham precocemente ao mesmo tempo, o espaço total disponível para o crescimento encefálico pode ficar genuinamente insuficiente, gerando hipertensão intracraniana verdadeira, um cenário que exige correção cirúrgica não apenas por motivos estéticos, mas neurológicos propriamente ditos.



Se olharmos para esse capítulo de forma panorâmica, o princípio que amarra tudo é exatamente o mesmo que já usamos para entender o envelhecimento no capítulo anterior, só que espelhado no tempo: assim como o envelhecimento é a perda gradual de uma arquitetura que já existia, a embriologia é a construção gradual dessa mesma arquitetura, camada por camada, processo por processo, e cada uma das más formações que discutimos aqui representa simplesmente um desses processos, fechamento do tubo, clivagem hemisférica, migração neuronal, sendo interrompido numa janela temporal específica e insubstituível do desenvolvimento. Entender essas más formações não é apenas decorar uma lista de síndromes, é entender, em retrospecto, cada uma das etapas que tiveram que dar certo, na sequência exata e no momento exato, para que o sistema nervoso que estudamos ao longo desse livro inteiro pudesse existir.

Capítulo 15 | Genética.

Esse capítulo estava esperando para ser escrito desde muito antes do capítulo anterior. Lá no capítulo sobre desenvolvimento neural, ao falarmos sobre a diferença entre atraso e regressão do desenvolvimento, adiamos a discussão sobre doenças de depósito lisossômico e distúrbios mitocondriais "para o capítulo sobre genética". Ali mesmo, ao explicarmos a doença de Parkinson e citarmos a doença de Huntington como seu contraponto genético clássico, também deixamos essa profundidade para depois.

No capítulo de oncologia, ao descrevermos o neurofibroma espinhal, descrevemos a anatomia e o comportamento do tumor, mas não o motivo pelo qual algumas famílias inteiras desenvolvem múltiplos desses tumores ao longo da vida. E no capítulo de farmacologia, ao falarmos da temozolomida no glioblastoma, mencionamos de passagem que a resposta do tumor a esse fármaco depende da atividade de uma enzima de reparo específica, sem entrar em detalhe.

Esse capítulo é onde cobramos, uma a uma, todas essas dívidas. Antes de entrarmos doença por doença, e seguindo a mesma lógica organizacional que já usamos em capítulos anteriores, vale estabelecer as ferramentas conceituais que vão nos acompanhar do início ao fim, porque elas transformam uma lista de síndromes decoradas numa estrutura de raciocínio genuína. A primeira distinção, e a mais importante para não misturarmos dois assuntos completamente diferentes, é entre mutação germinativa e mutação somática.

As mutações germinativas, que são o foco desse capítulo, estão presentes em todas as células do corpo desde a concepção, porque estão nos próprios gametas que originaram aquele indivíduo, e por isso são hereditárias, transmissíveis para a próxima geração e seguem os padrões de herança que vamos detalhar a seguir. Já as mutações somáticas, como a que determina a atividade daquela enzima de reparo no glioblastoma que citamos no capítulo de farmacologia, ocorrem apenas dentro de um tecido específico ao longo da vida do indivíduo, tipicamente dentro do próprio tumor, não estão presentes no resto do corpo e não são transmitidas a filho nenhum, elas pertencem ao território da oncologia, não da genética hereditária, e por isso vamos deixá-las de fora desse capítulo, que se dedica inteiramente às condições que se transmitem de geração em geração.

Dentro das mutações germinativas, o padrão de herança determina, antes mesmo de sabermos qualquer detalhe molecular sobre a doença, o tipo de risco que aquela família carrega. Na herança autossômica dominante, basta uma cópia alterada do gene, herdada de qualquer um dos dois pais, para

manifestar a doença, e cada filho de um indivíduo afetado carrega, em média, cinquenta por cento de chance de herdar essa cópia alterada, independente do sexo da criança. Na herança autossômica recessiva, são necessárias duas cópias alteradas, uma de cada pai, o que significa que os pais costumam ser portadores assintomáticos, cada um com uma única cópia alterada, e o risco de um filho afetado, quando ambos os pais são portadores, é de vinte e cinco por cento a cada gestação. Na herança ligada ao X, o gene alterado está no cromossomo X, e como o homem tem apenas uma cópia desse cromossomo, ele manifesta a doença sempre que herda a cópia alterada, enquanto a mulher, com duas cópias de X, geralmente precisa de ambas alteradas para manifestar plenamente a doença, funcionando na maioria dos casos como portadora, o que explica por que a grande maioria das condições ligadas ao X que vamos discutir afeta quase exclusivamente homens. E, por fim, a herança mitocondrial segue uma lógica completamente diferente das três anteriores, porque o DNA mitocondrial não vem do espermatozoide, cuja mitocôndria é degradada logo após a fecundação, mas exclusivamente do citoplasma do óvulo, o que significa que essas condições são transmitidas apenas pela linha materna, uma mãe afetada transmite para todos os seus filhos, homens e mulheres, mas apenas as filhas mulheres continuarão transmitindo adiante para a geração seguinte.

Um segundo conceito, menos intuitivo mas clinicamente indispensável, é a diferença entre penetrância e expressividade. Penetrância é a proporção de indivíduos que carregam a mutação e efetivamente desenvolvem algum sinal da doença, uma penetrância incompleta significa que algumas pessoas podem carregar o gene alterado a vida inteira sem jamais manifestar qualquer sintoma, o que complica bastante o aconselhamento genético que vamos discutir no fim desse capítulo. Expressividade variável, por outro lado, descreve o fato de que, entre os indivíduos que efetivamente manifestam a doença, a gravidade e o conjunto exato de sintomas podem variar enormemente, mesmo dentro da mesma família e carregando exatamente a mesma mutação, um fenômeno que vamos ver se repetir constantemente ao longo desse capítulo, especialmente nas síndromes neurocutâneas.

Com essas ferramentas em mãos, podemos agora percorrer as principais mutações do sistema nervoso, organizadas primeiro pelo compartimento anatômico que afetam predominantemente, periférico e depois central, e depois pelas síndromes genéticas clássicas que atravessam múltiplos sistemas ao mesmo tempo.

Capítulo 15.1 | Mutações do Sistema Nervoso Periférico.

Doença de Charcot-Marie-Tooth, é a neuropatia hereditária mais comum, e vale reconectar diretamente com o mecanismo de neuropatia periférica que já construímos em mais de um capítulo anterior: assim como vimos para as neuropatias tóxicas e metabólicas, o que determina o padrão clínico aqui é, mais uma vez, o comprimento do axônio, os nervos mais longos, dos pés às pernas, são os primeiros e os mais gravemente afetados.


A diferença central em relação às causas que já vimos é que, ao invés de uma agressão externa progressiva, aqui o defeito já nasce com o paciente, embutido na própria maquinaria estrutural do nervo. A forma mais comum decorre de uma duplicação de um gene responsável por uma proteína estrutural da bainha de mielina periférica, herdada de forma autossômica dominante, e o excesso dessa proteína desestabiliza a própria arquitetura da mielina, gerando um processo lento e progressivo de desmielinização e remielinização repetidas, que deixa como marca registrada o achado eletrofisiológico de velocidade de condução nervosa acentuadamente reduzida, já que, como já vimos ao estudar a fisiologia do axônio, é justamente a mielina que permite a condução saltatória rápida.



Clinicamente, isso se traduz numa fraqueza e atrofia distal simétrica e lentamente progressiva, classicamente descrita como a deformidade em "perna de cegonha" pela atrofia da musculatura da panturrilha contrastando com a preservação relativa da musculatura da coxa, associada a pés cavos e dedos em martelo pela fraqueza crônica da musculatura intrínseca do pé, e perda sensitiva distal que acompanha a fraqueza motora.

Neurofibromatose Tipo 1, já descrevemos, no capítulo de oncologia, a anatomia


e o comportamento do neurofibroma espinhal em formato de ampulheta, então não vamos repetir aquele mecanismo tumoral aqui. O que acrescentamos agora é a camada genética por trás dele: a neurofibromatose tipo um decorre de uma mutação autossômica dominante num gene que, em condições normais, funciona como um freio molecular sobre a proliferação celular, um supressor tumoral.



Quando esse freio está ausente ou defeituoso, células de Schwann e fibroblastos ao longo de praticamente qualquer nervo periférico do corpo perdem parte do controle normal sobre sua própria multiplicação, explicando por que esses pacientes desenvolvem neurofibromas múltiplos, e não um único tumor isolado como costuma ocorrer esporadicamente na população geral. Além dos neurofibromas em si, a síndrome cursa com manifestações que refletem essa mesma perda de freio celular em outros tecidos de origem embrionária relacionada: manchas café com leite na pele, presentes desde a infância e frequentemente o primeiro sinal a chamar atenção; nódulos de Lisch, pequenos hamartomas benignos na íris facilmente visíveis à lâmpada de

fenda; sardas em regiões intertriginosas como axilas e virilha; e um risco aumentado, ainda que geralmente discreto, de dificuldades de aprendizado e de tumores do nervo óptico na infância, o glioma de vias ópticas, que merece rastreamento oftalmológico regular justamente pelo potencial de comprometer a visão antes mesmo de gerar sintomas óbvios. .


Atrofia Muscular Espinhal versus Distrofia Muscular de Duchenne , vale fecharmos essa seção com uma comparação direta entre essas duas causas genéticas clássicas de fraqueza progressiva na infância, porque ambas se apresentam de forma superficialmente parecida, uma criança pequena que fica fraca e não anda direito, mas nascem de mecanismos completamente opostos, e diferenciá-las é um exercício de raciocínio anatômico tão elegante quanto tudo que já construímos nesse livro sobre localização de lesão.


(Duchenne)


Na atrofia muscular espinhal, o defeito genético, de herança autossômica recessiva, compromete a sobrevivência dos próprios neurônios motores inferiores no corno anterior da medula, aquela mesma população celular que já identificamos repetidamente ao longo desse livro como responsável pela força voluntária, e sua degeneração progressiva gera um quadro puro de neurônio motor inferior, fraqueza flácida, simétrica e predominantemente proximal, com reflexos profundos abolidos precocemente e fasciculações visíveis na língua, mas com sensibilidade completamente preservada, já que a doença nunca toca em nenhuma via sensitiva. Já na distrofia muscular de Duchenne, de herança ligada ao X e por isso praticamente restrita a meninos, o defeito não está no neurônio motor, mas na proteína estrutural que ancora o citoesqueleto interno da própria fibra muscular à membrana celular, funcionando essencialmente como um amortecedor mecânico que protege a fibra muscular do estresse de cada contração.

Sem essa proteína, cada contração muscular gera microrrupturas progressivas na própria membrana da fibra, levando à morte da fibra

muscular e à sua substituição gradual por tecido fibroso e gorduroso, um processo que explica tanto a fraqueza proximal progressiva característica, mais evidente na cintura pélvica, o que gera a clássica manobra de Gowers, na qual a criança precisa "escalar" o próprio corpo com as mãos sobre as coxas para conseguir se levantar do chão, quanto a pseudo-hipertrofia da panturrilha, que parece maior e mais forte, mas está na verdade infiltrada por gordura e fibrose, não por músculo funcionante.




Vale notar que a diferenciação prática entre as duas é direta: a atrofia muscular espinhal **poupa completamente o músculo em si**, o problema está a montante, no neurônio, enquanto a distrofia muscular de Duchenne poupa completamente o neurônio motor, o problema está totalmente a jusante, na própria fibra muscular, e é exatamente esse tipo de raciocínio de localização, testado repetidamente ao longo desse livro inteiro, que separa essas duas doenças de apresentação inicial tão parecida.




Capítulo 15.2 | Mutações do Sistema Nervoso Central.

Doenças de Depósito Lisossômico, cumprindo finalmente a promessa deixada no capítulo sobre desenvolvimento neural, essas são doenças autossômicas recessivas, na sua grande maioria, causadas pela deficiência de uma enzima lisossômica específica. Vale relembrar rapidamente, sem repetir a fundo, o papel do lisossomo que já tangenciamos em capítulos anteriores: ele funciona como o centro de reciclagem da célula, degradando continuamente macromoléculas complexas em seus componentes básicos para reaproveitamento. Quando uma dessas enzimas degradadoras específicas está ausente ou não funcional, o substrato que ela deveria quebrar simplesmente se acumula, progressivamente, dentro do próprio lisossomo, que incha e se torna disfuncional, e esse acúmulo é especialmente devastador no sistema nervoso central porque os neurônios, como já sabemos, são células pós-mitóticas que não se dividem nem se substituem, então não têm como "diluir" esse acúmulo tóxico redistribuindo-o para células-filhas, apenas acumulam progressivamente até a morte celular. O exemplo clássico e mais didático é a doença de Tay-Sachs, na qual a enzima ausente é responsável por degradar um componente lipídico específico da membrana neuronal, um gangliosídeo, que se acumula maciçamente dentro dos neurônios de todo o sistema nervoso central.



Clinicamente, uma criança aparentemente normal ao nascimento começa a regredir marcos já conquistados por volta dos seis meses de idade, exatamente o padrão de regressão, e não de atraso, que já identificamos no capítulo sobre desenvolvimento neural como sinal de alerta para doença neurodegenerativa ativa, progredindo para perda visual, pela toxicidade direta sobre as células ganglionares da retina, que gera o achado fundoscópico clássico de mancha vermelho-cereja na mácula, convulsões refratárias e, tipicamente, óbito ainda na primeira infância. Outras doenças desse mesmo grupo, como a doença de Gaucher e a doença de Niemann-Pick, seguem essa mesma lógica geral de enzima ausente e substrato acumulado, diferindo principalmente em qual enzima específica falta, qual substrato se acumula e, consequentemente, em quais órgãos e com que velocidade a doença se manifesta.

Distúrbios Mitocondriais, já apresentamos brevemente a síndrome de MELAS no capítulo sobre encefalopatias, então vamos aproveitar esse capítulo para acrescentar exatamente a camada genética que faltava naquele momento. O ponto de partida é lembrar que a mitocôndria é a única organela do corpo humano que possui seu próprio DNA, separado do DNA nuclear, uma relíquia evolutiva de sua origem como uma bactéria endossimbionte ancestral, e é justamente por causa dessa origem que a herança mitocondrial segue aquela lógica exclusivamente materna que já estabelecemos na introdução desse capítulo.




(MELAS)

Um detalhe adicional, e que explica boa parte da variabilidade clínica notável dentro dessas doenças, é o conceito de heteroplasmia: cada célula contém centenas a milhares de cópias de DNA mitocondrial, e numa mutação mitocondrial, nem todas as cópias dentro de uma mesma célula estão necessariamente mutadas, a proporção entre DNA mitocondrial normal e mutado varia de célula para célula, e mesmo de pessoa para pessoa dentro da mesma família, e existe um limiar de proporção mutada, variável por tecido, abaixo do qual a célula ainda consegue compensar com as mitocôndrias normais remanescentes e acima do qual a disfunção se torna clinicamente aparente, o que explica por que a mesma mutação mitocondrial pode gerar quadros clínicos de gravidade completamente diferente entre irmãos.

Clinicamente, os distúrbios mitocondriais afetam preferencialmente os tecidos com maior demanda energética, exatamente como já vimos para a síndrome de MELAS, o cérebro e o músculo esquelético, o que explica a combinação característica de encefalopatia, fraqueza muscular proximal e, muitas vezes, oftalmoplegia externa progressiva por comprometimento da musculatura extraocular, que também tem demanda energética desproporcionalmente alta para seu tamanho.

Doença de Huntington, retomamos aqui a doença que já discutimos clinicamente no capítulo sobre demências, quando explicamos a degeneração dos neurônios espinhosos médios do núcleo caudado e do putamen e o padrão


coreico resultante, mas que deixamos deliberadamente sem detalhamento genético naquele momento. A doença de Huntington é o exemplo mais clássico de um mecanismo genético particular chamado expansão de repetição de trinucleotídeos: dentro do gene responsável, existe normalmente uma sequência curta que se repete um certo número de vezes, e a doença ocorre quando essa sequência se expande além de um determinado limiar de repetições.



É uma herança autossômica dominante, mas com uma característica adicional notável e clinicamente relevante para o aconselhamento genético, o fenômeno da antecipação: a cada geração em que essa expansão é transmitida, especialmente quando herdada pela linha paterna, ela tende a crescer ainda mais, o que se traduz clinicamente em doença que aparece progressivamente mais cedo e, frequentemente, de forma mais grave a cada geração sucessiva dentro da mesma família, um padrão de "piora geracional" que ajuda a explicar por que casos de início mais precoce, às vezes já na adolescência, costumam ser herdados do pai.

Ataxias Espinocerebelares, fechamos essa seção com um grupo de doenças que segue exatamente essa mesma lógica de expansão de repetição de trinucleotídeos que acabamos de descrever para a Huntington, só que atingindo, preferencialmente, o cerebelo e suas conexões, ao invés dos núcleos da base. Existem múltiplos subtipos, numerados conforme foram

sendo descobertos, cada um com sua própria expansão em um gene diferente, mas todos convergindo para um quadro clínico central de ataxia cerebelar lentamente progressiva, reconhecível pelo mesmo padrão de disfunção que já detalhamos no capítulo sobre cerebelo, marcha atáxica de base alargada, dismetria, disartria escandida, somada, dependendo do subtipo específico, a graus variáveis de neuropatia periférica, oftalmoplegia ou sinais piramidais associados, um bom lembrete de que, em genética, mecanismos moleculares semelhantes, aqui a mesma classe de expansão de repetição, podem convergir para alvos anatômicos completamente diferentes dependendo apenas de em qual gene, e portanto em qual população neuronal, a expansão especificamente ocorre.



Capítulo 15.3 | Principais Alterações Genéticas.


Reunimos aqui três das síndromes genéticas mais amplamente reconhecidas na prática clínica, separadas das anteriores não porque sigam uma lógica fisiopatológica diferente, mas porque nenhuma delas se restringe a um único compartimento do sistema nervoso, todas afetam múltiplos sistemas do corpo simultaneamente, e é justamente essa natureza multissistêmica que as torna tão reconhecíveis clinicamente.

Esclerose Tuberosa, assim como a neurofibromatose tipo um que já descrevemos, decorre da perda de função de um gene supressor tumoral, aqui um gene diretamente envolvido em frear uma via de sinalização intracelular central para o crescimento e a proliferação celular, e sua ausência libera esse freio em múltiplos órgãos ao mesmo tempo, gerando hamartomas, crescimentos desorganizados mas benignos de tecido normal, espalhados por

cérebro, pele, rins, coração e pulmões.



No sistema nervoso central especificamente, esses hamartomas se manifestam como **túberes corticais**, focos displásicos que funcionam como zonas epileptogênicas altamente ativas, explicando por que a epilepsia refratária, frequentemente de início muito precoce, é uma das manifestações de apresentação mais comuns dessa síndrome, e como astrocitomas subependimários de células gigantes, tumores benignos mas que, por crescerem literalmente dentro da parede ventricular, podem obstruir progressivamente o forame de Monro e gerar hidrocefalia obstrutiva.




Vale reconectar aqui diretamente com o capítulo sobre desenvolvimento neural: a combinação de epilepsia de início precoce com atraso do desenvolvimento e, em parcela significativa dos casos, transtorno do espectro autista associado, reflete exatamente o princípio que já estabelecemos naquele capítulo, de que qualquer interferência significativa durante as janelas críticas de plasticidade sináptica tem consequências que se propagam por praticamente todo o desenvolvimento cognitivo subsequente.

Neurofibromatose Tipo 2, apesar do nome quase idêntico ao da neurofibromatose tipo um que já detalhamos, essa é uma doença geneticamente distinta, causada pela mutação de um gene supressor tumoral completamente diferente, e seu quadro clínico também é bem diferente na prática: ao invés de neurofibromas cutâneos múltiplos, a marca registrada dessa condição são os schwannomas vestibulares bilaterais, tumores benignos originados das células de Schwann que revestem o oitavo par craniano, que já estudamos no capítulo sobre tronco encefálico como o par responsável pela audição e pelo equilíbrio.


A bilateralidade aqui é praticamente patognomônica, um schwannoma vestibular unilateral isolado na população geral é, na esmagadora maioria das vezes, um achado esporádico sem relação genética nenhuma, mas schwannomas vestibulares bilaterais praticamente definem a neurofibromatose tipo dois, manifestando-se clinicamente com perda auditiva progressiva e assimétrica entre os dois ouvidos, zumbido e desequilíbrio, e

frequentemente acompanhados de outros tumores do sistema nervoso central, como meningiomas múltiplos e ependimomas espinhais.



Síndrome de Down, a causa mais comum de deficiência intelectual de origem genética, e diferente de tudo que discutimos até aqui, ela não decorre de uma mutação pontual num único gene, mas da presença de uma cópia inteira extra de um cromossomo inteiro, o cromossomo vinte e um, uma alteração numérica chamada trissomia, que ocorre predominantemente por um erro de segregação cromossômica durante a formação do óvulo materno, cujo risco aumenta de forma bem documentada com a idade materna avançada. O excesso de material genético resultante, um cromossomo inteiro a mais, com todos os genes que ele carrega presentes em triplicata ao invés de em duplicata, gera um efeito de dose gênica que se manifesta de forma sistêmica: hipotonia neonatal marcante, fácies característica, cardiopatias congênitas e deficiência intelectual de grau variável.


Mas o achado que mais nos interessa reconectar diretamente com esse livro é neurológico e tardio: o gene que codifica a proteína precursora amiloide, exatamente aquela mesma proteína que detalhamos com profundidade no capítulo sobre demências como o ponto de partida de toda a cascata patológica do Alzheimer, está localizado justamente no cromossomo vinte e um. Como indivíduos com síndrome de Down carregam três cópias desse cromossomo, eles também produzem, ao longo de toda a vida, uma quantidade cronicamente maior de **proteína precursora amiloide**, e consequentemente mais substrato disponível para ser clivado pela via amiloidogênica que já descrevemos, o que explica por que praticamente todos os indivíduos com síndrome de Down desenvolvem, já na quarta década de vida, as mesmas placas amiloides e emaranhados neurofibrilares característicos do **Alzheimer**, décadas mais cedo do que a população geral, um dos exemplos mais diretos e elegantes que existem em toda a medicina de como um simples excesso de dose gênica, sem qualquer mutação propriamente dita, pode reproduzir fielmente toda uma cascata neurodegenerativa que já estudamos em profundidade sob outro contexto completamente diferente.



Capítulo 15.4 | Alterações Genéticas Raras.

Fechando o panorama das condições hereditárias, vale um espaço mais breve para três condições bem menos prevalentes do que tudo que já vimos até aqui, mas que carregam mecanismos elegantes o suficiente, ou consequências clínicas graves o bastante, para merecerem reconhecimento.


Doença de Wilson, uma condição autossômica recessiva que compromete diretamente uma proteína transportadora responsável por excretar o excesso de cobre pela bile, o principal mecanismo fisiológico de eliminação desse metal do corpo. Sem esse transportador funcionando corretamente, o cobre absorvido pela dieta se acumula progressivamente, primeiro no próprio fígado, gerando um quadro de hepatopatia crônica que, na sua fisiopatologia final, converge para exatamente a mesma cascata de encefalopatia hepática que já detalhamos com profundidade nos capítulos sobre encefalopatias, sobre órgãos secundários e, mais recentemente, sobre álcool, apenas com o cobre, e não o álcool, como agressor inicial.



Quando a capacidade de armazenamento hepático se esgota, o cobre transborda para a circulação sistêmica e se deposita preferencialmente em dois locais de grande relevância clínica: a córnea, onde gera o clássico anel de Kayser-Fleischer, um depósito acastanhado visível na periferia da íris à inspeção cuidadosa, e os núcleos da base, especialmente o putamen, onde sua toxicidade direta sobre os neurônios gera um quadro de parkinsonismo, distonia e tremor, muitas vezes acompanhado de alterações psiquiátricas e comportamentais que podem preceder os sinais motores em anos, mais um lembrete de que essa combinação de doença hepática com quadro extrapiramidal num paciente jovem deveria sempre levantar a suspeita dessa

condição específica.


Síndrome de Von Hippel-Lindau, outra doença autossômica dominante causada pela perda de função de um gene supressor tumoral, dessa vez um envolvido na regulação da resposta celular à disponibilidade de oxigênio, cuja ausência faz com que a célula se comporte cronicamente como se estivesse em hipóxia, mesmo com oxigenação normal, estimulando angiogênese descontrolada e a formação de tumores altamente vascularizados.



No sistema nervoso central, a manifestação clássica são os **hemangioblastomas**, tumores benignos mas ricamente vascularizados que se formam preferencialmente no cerebelo e na medula espinhal, reconectando diretamente com o capítulo sobre oncologia, e que podem ainda se acompanhar de tumores em outros órgãos, como carcinoma de células renais e feocromocitoma, reforçando mais uma vez essa natureza multissistêmica

que caracteriza boa parte das síndromes de perda de gene supressor tumoral que percorremos ao longo desse capítulo. .

Ataxia-Telangiectasia, uma condição autossômica recessiva rara, mas didaticamente valiosa, causada pela disfunção de uma proteína central nos mecanismos de reparo do próprio DNA danificado, sem entrarmos na maquinaria molecular exata desse reparo, o que basta reter é que sem essa vigilância genômica adequada, o dano ao DNA se acumula continuamente em diversos tecidos. No sistema nervoso, esse acúmulo afeta desproporcionalmente as células de Purkinje do cerebelo, que já sabemos serem particularmente vulneráveis, gerando uma ataxia cerebelar progressiva de início já na primeira infância, tipicamente acompanhada de telangiectasias oculocutâneas visíveis, pequenos vasos sanguíneos dilatados na conjuntiva e na pele, e de uma imunodeficiência combinada relevante, já que a mesma maquinaria de reparo de DNA comprometida também é indispensável para o rearranjo genético normal que gera a diversidade de anticorpos e receptores do sistema imune, deixando esses pacientes vulneráveis a infecções recorrentes e com risco aumentado de neoplasias malignas ao longo da vida.





Capítulo 15.5 | Manejo Desses Pacientes.

Fechamos esse capítulo com uma mudança deliberada de perspectiva, porque quase todas as condições que discutimos até aqui compartilham uma característica prática desconfortável: a esmagadora maioria não tem cura, e o manejo, portanto, não gira em torno de reverter o defeito genético em si, mas em torno de três frentes que se complementam.

A primeira frente é o aconselhamento genético, que começa muito antes de qualquer sintoma aparecer. Diante de um diagnóstico confirmado numa família, cabe ao médico comunicar com clareza, mas sem determinismo excessivo, justamente por causa dos conceitos de penetrância incompleta e expressividade variável que já estabelecemos no início desse capítulo, qual é o risco de recorrência para futuros filhos e para outros parentes já vivos, sempre em linguagem acessível e sem impor decisões reprodutivas, apenas municiando a família com a informação necessária para que ela tome suas próprias decisões.


A segunda frente é o rastreamento familiar em cascata, que decorre diretamente da lógica de herança que construímos no início do capítulo: uma vez identificado um caso índice, faz sentido investigar ativamente os parentes de primeiro grau, e depois, dependendo do resultado, expandir progressivamente o rastreamento para parentes mais distantes, especialmente relevante em condições de penetrância incompleta ou de manifestação tardia, como a própria doença de Huntington, em que um parente aparentemente saudável hoje pode se beneficiar enormemente de saber, com antecedência, que carrega a mutação, seja para planejamento reprodutivo, seja para vigilância clínica antecipada de complicações associadas.

A terceira frente é o cuidado multidisciplinar sintomático propriamente dito, já

que, na ausência de cura para a maioria dessas condições, o que realmente muda a qualidade e, muitas vezes, a expectativa de vida desses pacientes é o manejo proativo de cada uma das complicações específicas que já detalhamos doença por doença, controle da epilepsia na esclerose tuberosa, suporte respiratório e nutricional na atrofia muscular espinhal e na distrofia muscular de Duchenne, rastreamento oftalmológico e auditivo regular na neurofibromatose tipo um e dois, vigilância radiológica seriada para hemangioblastomas na Von Hippel-Lindau, sempre reunindo neurologista, geneticista e os especialistas de órgão relevantes para cada condição específica ao redor do mesmo paciente.

Por fim, vale fechar com uma nota sobre o horizonte terapêutico mais recente, porque ele representa uma mudança de paradigma real em relação a tudo que descrevemos até aqui: pela primeira vez, para um número crescente dessas condições, já existem terapias que atacam diretamente a causa genética, e não apenas suas consequências. Na atrofia muscular espinhal, terapias que aumentam diretamente a produção de uma proteína funcional a partir de um gene alternativo já disponível no genoma desses pacientes transformaram uma doença antes quase uniformemente fatal na infância numa condição com sobrevida e função motora dramaticamente melhores quando tratada precocemente.

Em algumas doenças de depósito lisossômico, a terapia de reposição enzimática, na qual a enzima ausente é sintetizada em laboratório e infundida periodicamente no paciente, já permite repor parcialmente exatamente aquela função que descrevemos faltando no início desse capítulo. São ainda tratamentos com limitações importantes, de custo elevado e de acesso ainda restrito, mas representam a direção clara para onde esse campo inteiro está caminhando, e fecham esse capítulo com uma nota apropriadamente diferente de praticamente tudo que vimos até aqui: pela primeira vez, entender o mecanismo genético exato de uma doença não serve apenas para explicá-la, mas para efetivamente corrigi-la.



(Tomografia de um paciente com MELAS)

Capítulo 16 | Características diferencias do S.N.P.


Lá no capítulo 1, ao descrevermos as células da glia, prometemos voltar ao sistema nervoso periférico "para falar mais sobre como ele possui capacidade regenerativa". Chegou a hora de cumprir essa promessa, e de aproveitar para consertar, ao longo do caminho, uma pequena inversão que ficou naquele capítulo: os oligodendrócitos são as células mielinizantes do sistema nervoso central, não do periférico, e as células de Schwann são as mielinizantes do sistema nervoso periférico, não do central, exatamente o oposto de como ficaram listadas naquele momento.



Vale a correção não como um exercício de pedantismo, mas porque essa troca de papéis é literalmente o ponto de partida de tudo que esse capítulo vai construir: entender por que essas duas células, aparentemente equivalentes em função, geram destinos tão diferentes para o axônio lesado que envolvem. Um oligodendrócito, no sistema nervoso central, não se dedica a um único axônio. Ele estende múltiplos prolongamentos, cada um envolvendo um segmento de mielina, chamado internódulo, em axônios diferentes, muitas

vezes dezenas deles ao mesmo tempo, funcionando como uma espécie de central telefônica que atende várias linhas simultaneamente. Uma célula de Schwann, no sistema nervoso periférico, faz exatamente o oposto: ela se dedica inteiramente a um único internódulo de um único axônio, uma relação de um para um.


Essa diferença de arquitetura, que parece um detalhe anatômico menor, é na verdade a raiz de praticamente toda a diferença de capacidade regenerativa entre os dois sistemas que vamos explorar nesse capítulo, porque uma célula de Schwann, comprometida com um único axônio, pode se dar ao luxo de se transformar inteiramente para ajudá-lo a se recuperar, enquanto um oligodendrócito, mantendo dezenas de axônios simultaneamente, não tem essa mesma liberdade, qualquer mudança drástica em seu comportamento arriscaria comprometer todos os outros axônios saudáveis sob sua responsabilidade ao mesmo tempo. Antes de entrarmos no processo de regeneração propriamente dito, vale entender o que acontece imediatamente após uma lesão axonal, um processo chamado degeneração walleriana, que ocorre de forma essencialmente idêntica tanto no sistema nervoso central quanto no periférico, e é justamente por começarem da mesma forma que a diferença de desfecho entre os dois fica ainda mais evidente.



Quando um axônio é seccionado, o segmento distal, agora fisicamente desconectado do corpo celular que sintetiza suas proteínas e organelas, entra em colapso metabólico progressivo: sem reposição de proteínas estruturais vindas do corpo neuronal, o citoesqueleto axonal se desintegra, favorecido por um influxo maciço de cálcio para dentro do axônio que ativa enzimas proteolíticas internas, e todo o segmento distal se fragmenta ao longo de poucos dias, um processo de "autodestruição programada" da porção do axônio que já perdeu contato com sua fonte de sustento. É exatamente nesse momento, logo após a fragmentação, que a história se separa entre os dois sistemas.

No sistema nervoso periférico, as células de Schwann que envolviam aquele segmento agora fragmentado respondem a esse dano com uma verdadeira reprogramação de identidade: elas se desdiferenciam, voltando para um estado mais parecido com o de uma célula de Schwann imatura, param de produzir mielina, e passam a proliferar ativamente. Recrutando macrófagos que vêm ajudar a fagocitar os debris de mielina e axônio já fragmentados,


essas células de Schwann desdiferenciadas se realinham formando colunas celulares contínuas dentro do que sobrou do tubo endoneural original, uma estrutura conhecida como bandas de Büngner, que funcionam essencialmente como um corredor físico e bioquímico pré-formado, apontando exatamente na direção onde o axônio original passava.




O coto proximal do axônio, ainda conectado ao corpo neuronal vivo, começa então a brotar prolongamentos exploratórios, os cones de crescimento, que literalmente seguem esse corredor de bandas de Büngner como um trem seguindo trilhos já assentados, encontrando pelo caminho fatores neurotróficos secretados pelas próprias células de Schwann que sustentam e orientam esse crescimento até, com sorte, reencontrar seu alvo original, seja ele um músculo ou um receptor sensitivo.

É um processo real, mas lento, classicamente estimado em torno de um milímetro por dia, o que já antecipa por que lesões de nervos periféricos localizadas próximas ao alvo, como uma lesão distal na mão, tendem a se recuperar bem mais depressa e de forma bem mais completa do que lesões proximais, próximas à raiz do membro, nas quais o axônio em regeneração precisa percorrer uma distância enorme antes de reencontrar seu destino, e durante esse tempo todo o músculo-alvo, sem nenhum estímulo nervoso, vai progressivamente perdendo massa e capacidade de reinervação efetiva, uma corrida contra o tempo que nem sempre termina bem mesmo quando a regeneração axonal em si ocorre sem problemas. No sistema nervoso central, a mesma degeneração walleriana inicial ocorre, mas o que se segue é praticamente o oposto de tudo que acabamos de descrever.

Os oligodendrócitos, diferente das células de Schwann, não se desdiferenciam nem proliferam para ajudar na limpeza e na reconstrução, e a remoção da mielina fragmentada pela micróglia local, o equivalente central dos macrófagos periféricos, ocorre de forma muito mais lenta e incompleta, deixando para trás debris de mielina que, ao invés de desaparecerem, carregam consigo sinais moleculares que ativamente sinalizam para o cone de crescimento se retrair, funcionando como uma placa de "pare" química espalhada pelo caminho, em nítido contraste com o corredor convidativo das bandas de Büngner periféricas.



Paralelamente, os astrócitos ao redor da lesão respondem proliferando intensamente e se organizando numa cicatriz glial densa, uma barreira física reforçada por uma matriz extracelular rica em moléculas que também inibem ativamente o crescimento axonal, essencialmente selando a área lesada como uma tentativa de conter o dano, mas ao custo de bloquear qualquer axônio que tentasse atravessar essa região para se reconectar. O resultado líquido é que o cone de crescimento de um axônio lesado no sistema nervoso central encontra, ao invés de um corredor guiado como no sistema periférico, um ambiente hostil por todos os lados, quimicamente repelente e fisicamente bloqueado, e simplesmente para de crescer.



É essa combinação, ausência de células mielinizantes dispostas a se sacrificar em prol de um único axônio, depuração ineficiente de debris inibitórios e formação de cicatriz glial bloqueadora, que explica de forma completa e mecanística por que já sabemos, desde o primeiríssimo capítulo desse livro, que lesões medulares e encefálicas são permanentes enquanto lesões de nervos periféricos têm, ao menos potencialmente, alguma chance real de recuperação. Essa diferença, aliás, não é apenas uma curiosidade fisiológica, ela é a própria justificativa por trás de uma conduta cirúrgica inteira. Quando um nervo periférico é seccionado por um trauma, faz sentido clínico e cirúrgico suturar as duas pontas, ou mesmo interpor um enxerto de nervo entre elas quando a distância é grande demais para aproximar diretamente, justamente porque sabemos que, uma vez as pontas próximas o suficiente, a maquinaria de bandas de Büngner e cones de crescimento que acabamos de descrever tem uma chance real de reconectar o circuito.

Não existe procedimento cirúrgico equivalente para a medula espinhal seccionada, não porque a técnica cirúrgica de aproximar dois cotos seja impossível, mas porque, mesmo aproximados perfeitamente, o ambiente bioquímico e celular do sistema nervoso central que acabamos de descrever simplesmente não permite que o axônio atravesse a cicatriz glial e reencontre seu alvo, um lembrete direto de que, em neurociência, o obstáculo à recuperação muitas vezes não é anatômico, é celular.


Vale ainda uma última reflexão antes de seguirmos, conectando esse capítulo

diretamente ao anterior: se voltarmos à doença de Charcot-Marie-Tooth que detalhamos no capítulo sobre genética, temos ali um exemplo de mielina periférica comprometida por um defeito estrutural hereditário, presente desde o nascimento e progressivo ao longo de toda a vida, mas ainda assim um defeito que preserva a própria célula de Schwann como célula viva, apenas produzindo uma proteína estrutural defeituosa. Isso contrasta diretamente com o que vamos ver a seguir nesse capítulo, uma condição na qual a própria célula de Schwann, saudável e geneticamente normal, é atacada de fora para dentro por um processo inflamatório agudo. São dois mecanismos completamente diferentes, hereditário e estrutural contra adquirido e imunológico, convergindo sobre a mesma população celular e, por isso, gerando quadros clínicos que compartilham a mesma lógica geral de neuropatia periférica desmielinizante, ainda que com cursos temporais e prognósticos completamente distintos.



Essa diferença de capacidade regenerativa não é a única consequência prática de as duas populações gliais se organizarem de formas tão distintas, existe uma segunda diferença, igualmente fundamental, que envolve não a capacidade de reparo, mas a exposição ao sistema imune. O sistema nervoso central é classicamente descrito como um sítio imunologicamente privilegiado, protegido pela barreira hematoencefálica que já detalhamos em múltiplos capítulos anteriores, e historicamente também considerado desprovido de


drenagem linfática convencional, ainda que descobertas mais recentes tenham identificado vasos linfáticos meníngeos funcionais que fazem essa fronteira ser menos absoluta do que se pensava, e cuja função imunológica vamos deixar reservada para capítulos futuros sobre infecções do sistema nervoso.



O sistema nervoso periférico, por outro lado, não desfruta dessa mesma proteção com o mesmo rigor: os capilares que nutrem os troncos nervosos periféricos e, especialmente, os gânglios da raiz dorsal, são mais permeáveis, formando o que se chama de barreira hemato-nervosa, uma barreira real, mas estruturalmente mais permissiva do que a barreira hematoencefálica, permitindo maior trânsito de células imunes, anticorpos e, infelizmente, também de toxinas circulantes e imunoglobulinas anômalas do que o parênquima central protegido consegue permitir. Essa maior exposição explica, por exemplo, por que tantas das neuropatias tóxicas e metabólicas que já detalhamos em capítulos anteriores conseguem atingir o nervo periférico com relativa facilidade, enquanto o parênquima central correspondente muitas vezes fica mais protegido da mesma exposição sistêmica. É justamente essa combinação de maior exposição imunológica com a distinção mielinizante que já construímos que nos leva ao par de doenças mais didático para fechar esse capítulo, porque elas ilustram, de forma quase perfeita, como o mesmo tipo geral de ataque, autoimune contra a mielina, gera desfechos completamente diferentes dependendo de qual das duas mielinas, periférica ou central, é o alvo.

Síndrome de Guillain-Barré, é a polirradiculoneuropatia autoimune aguda mais comum, e seu mecanismo de disparo segue exatamente o mesmo princípio de mimetismo molecular que já detalhamos ao falar da encefalopatia pós-infecciosa no capítulo sobre encefalopatias, só que aqui o alvo confundido pelo sistema imune são componentes da mielina e, em algumas variantes, dos próprios axônios do sistema nervoso periférico, tipicamente dias a poucas


semanas depois de uma infecção gastrointestinal ou respiratória comum. Clinicamente, o padrão mais característico é uma fraqueza flácida e simétrica de instalação relativamente rápida, ao longo de dias, que classicamente ascende dos membros inferiores em direção aos superiores e, nos casos mais graves, até a musculatura respiratória e bulbar, acompanhada de arreflexia praticamente universal desde as fases iniciais, um achado que já sinaliza, pelo raciocínio de neurônio motor inferior que construímos ao longo desse livro, que o problema está na própria unidade motora periférica, não em nenhuma via descendente central. Um achado laboratorial clássico e frequentemente cobrado é a dissociação albuminocitológica no líquor, proteína elevada com contagem celular normal, refletindo a inflamação das raízes nervosas próximas ao espaço subaracnóideo sem a presença de uma resposta celular inflamatória exuberante que geralmente acompanha infecções diretas do sistema nervoso.



O maior risco agudo é a insuficiência respiratória por comprometimento do nervo frênico, tornando o monitoramento seriado da capacidade vital forçada uma peça central do manejo enquanto detalharemos melhor no próximo capítulo, mas o dado mais relevante para fechar essa comparação é o prognóstico: a maioria dos pacientes recupera função substancial ao longo de


semanas a poucos meses, exatamente porque o alvo do ataque autoimune são as células de Schwann e a mielina periférica, o mesmo sistema que acabamos de estabelecer como capaz de se desdiferenciar, proliferar e reconstruir bandas de Büngner funcionais assim que o ataque autoimune agudo cessa. .

Esclerose Múltipla, é o contraponto quase perfeito da Guillain-Barré, uma doença autoimune desmielinizante, mas dessa vez do sistema nervoso central, com uma diferença crucial de curso temporal: enquanto a Guillain-Barré é tipicamente monofásica, um único ataque seguido de recuperação, a esclerose múltipla é classicamente recorrente, com surtos de disfunção neurológica separados no tempo e, criticamente para o diagnóstico, separados também no espaço, ou seja, afetando regiões anatômicas diferentes do sistema nervoso central em momentos diferentes, o critério de "disseminação no tempo e no espaço" que forma a base do raciocínio diagnóstico dessa doença.



As apresentações clássicas incluem a neurite óptica, com perda visual monocular subaguda dolorosa à movimentação ocular, refletindo desmielinização do próprio nervo óptico; um quadro sensitivo-motor sugestivo de lesão medular parcial, a chamada mielite transversa incompleta; e a


oftalmoplegia internuclear, na qual uma lesão do fascículo longitudinal medial no tronco encefálico, aquele mesmo trato que conecta os núcleos oculomotores para permitir o olhar conjugado, gera falha especificamente na adução do olho ipsilateral durante o olhar conjugado para o lado oposto, um achado de localização extremamente específico e satisfatório de reconhecer. Na ressonância magnética, as lesões desmielinizantes se distribuem



classicamente em regiões periventriculares, justacorticais, infratentoriais e na própria medula espinhal, um padrão de distribuição que, mais uma vez, reflete diretamente a distribuição anatômica dos oligodendrócitos e de suas vias mais vulneráveis ao processo inflamatório. E é justamente aqui, no desfecho, que a comparação com a Guillain-Barré se fecha com força total: diferente da recuperação substancial que vimos na neuropatia periférica autoimune, a esclerose múltipla tende, ao longo de anos e décadas, a acumular incapacidade progressiva, mesmo com tratamento, precisamente porque, como já construímos com detalhe nesse capítulo, o sistema nervoso central carece da mesma maquinaria de reparo dedicado, desmielinização repetida e cicatrizes gliais recorrentes ao longo dos anos vão deixando sequelas cada vez menos reversíveis, o oposto exato do que vimos para o sistema periférico.

Vale ainda uma nota rápida sobre o tratamento agudo dessas duas condições, porque ele também reflete, de forma indireta, essa mesma lógica de privilégio imunológico que construímos ao longo desse capítulo: tanto a Guillain-Barré quanto os surtos agudos de esclerose múltipla podem ser tratados com imunoglobulina intravenosa ou plasmaférese, duas estratégias que, por caminhos diferentes, reduzem a quantidade de anticorpos e complexos imunes


circulantes disponíveis para atacar a mielina, e vamos detalhar o mecanismo de cada uma delas com mais profundidade no próximo capítulo, quando formos falar sobre manejo farmacológico da paralisia de forma mais ampla.




Fechamos esse capítulo com uma última aplicação prática dessa diferença estrutural entre os dois sistemas, dessa vez não relacionada a autoimunidade, mas à própria exposição física do nervo periférico. Justamente por correr fora da proteção óssea do crânio e da coluna vertebral que protege o sistema nervoso central, o nervo periférico atravessa, ao longo do seu trajeto, diversos túneis anatômicos naturais, formados por ossos, ligamentos e tendões, e está sujeito a compressão focal nesses pontos específicos, as chamadas neuropatias compressivas ou de aprisionamento.

O exemplo mais comum e mais didático é a síndrome do túnel do carpo, na qual o nervo mediano é comprimido cronicamente à passagem pelo punho, sob o ligamento transverso do carpo, tipicamente por espessamento dos tendões flexores adjacentes ou por edema local, gerando dor e parestesias nos primeiros três dedos e metade do quarto dedo da mão, o território sensitivo

exato do nervo mediano, e nos casos mais avançados fraqueza da musculatura tenar, todos esses achados restritos ao território de um único nervo, um padrão de mononeuropatia focal que contrasta diretamente com o padrão simétrico, bilateral e comprimento-dependente das polineuropatias tóxicas e metabólicas que já detalhamos repetidamente ao longo desse livro.



Um segundo exemplo, igualmente clássico, é o aprisionamento do nervo ulnar no cotovelo, à sua passagem pelo túnel cubital, atrás do epicôndilo medial, exatamente a região que colide na mesa quando "batemos o cotovelo" e sentimos aquele choque característico descendo até o quarto e o quinto dedos, o território sensitivo do nervo ulnar. Compressão crônica nesse ponto, por apoio repetido do cotovelo ou por flexão prolongada da articulação, gera parestesias nesses dois dedos e, com o tempo, fraqueza da musculatura intrínseca da mão, gerando a chamada mão em garra pela perda do equilíbrio entre os músculos intrínsecos e extrínsecos da mão.




Reparem que ambos os exemplos, mediano no punho e ulnar no cotovelo, seguem exatamente o mesmo princípio fisiopatológico, compressão mecânica focal num ponto anatômico estreito e vulnerável, gerando tanto isquemia local quanto desmielinização focal diretamente sob o ponto de compressão, mais uma vez reforçando como reconhecer o padrão espacial de uma queixa neurológica, focal versus simétrico, isolado versus comprimento-dependente, é tão importante quanto reconhecer o mecanismo fisiopatológico por trás dela.

Capítulo 17 | Paralisia.

Terminamos o capítulo anterior com dois exemplos de paralisia focal, o nervo mediano e o nervo ulnar aprisionados em seus respectivos túneis anatômicos, e com um exemplo de paralisia generalizada e ascendente, a síndrome de Guillain-Barré. Não foi coincidência começarmos a usar a palavra "paralisia" com tanta frequência exatamente quando entramos no território do sistema nervoso periférico, porque paralisia, no sentido mais amplo que vamos usar nesse capítulo, é simplesmente a perda, parcial ou completa, da força muscular voluntária, e essa perda pode nascer em praticamente qualquer ponto ao longo de um trajeto que já percorremos, peça por peça, ao longo desse livro inteiro: do córtex motor, descendo pela via piramidal, cruzando na decussação bulbar que já detalhamos no capítulo sobre tronco encefálico, chegando ao corno anterior da medula, seguindo pelo nervo periférico, atravessando a junção neuromuscular, e finalmente ativando a própria fibra muscular.

Esse capítulo existe para reunir, num único fio condutor, praticamente tudo que já construímos sobre cada um desses elos, e para preencher as poucas lacunas que ainda restam nessa cadeia, principalmente a junção neuromuscular, que esse livro ainda não tinha visitado diretamente. Capítulo


---



Capítulo 17.1 | Classificações e Suas Causas.

Antes de percorrermos essa cadeia elo por elo, vale estabelecer a primeira e mais importante ferramenta diagnóstica desse capítulo, uma que já usamos de forma implícita várias vezes ao longo desse livro, mas que nunca havíamos sistematizado formalmente: a distinção entre paralisia de neurônio motor superior e paralisia de neurônio motor inferior.

Essa distinção não é apenas semântica, ela decorre diretamente da anatomia funcional que já construímos desde o primeiro capítulo. O neurônio motor superior é aquele que se origina no córtex motor e desce até fazer sinapse com o neurônio motor inferior, seja diretamente, seja através de interneurônios; sua função normal não é apenas "ligar" o movimento, mas também modular e conter a excitabilidade dos circuitos reflexos espinhais mais primitivos que já mencionamos no capítulo sobre desenvolvimento neural.




Quando esse neurônio motor superior é lesado, essa contenção desaparece, e o resultado paradoxal é que, apesar da fraqueza, os reflexos profundos ficam exaltados, o tônus muscular aumenta de forma velocidade-dependente, o que chamamos de espasticidade, e reaparece o sinal de Babinski, aquela mesma resposta plantar em extensão que já vimos ser fisiologicamente normal e esperada num lactente antes da mielinização completa da via corticospinal, e que na vida adulta só reaparece justamente quando essa via se lesa e a contenção cortical sobre o reflexo plantar primitivo se perde. A atrofia muscular, quando presente, é tardia e discreta, por desuso, não pela perda direta de inervação, já que o neurônio motor inferior, e o contato direto dele com a fibra muscular, permanecem intactos.

Neurologia I

- Revisão das estruturas anatômicas do Sistema Nervoso:


Aula 1: Introdução ao Sistema Nervoso e Fisiopatologia do Neurônio motor superior e periférico




O neurônio motor inferior, por sua vez, é a peça final da cadeia, o corpo celular no corno anterior da medula, ou nos núcleos motores dos nervos cranianos no tronco encefálico, e seu próprio axônio periférico até a fibra muscular, aquilo que classicamente chamamos de via final comum, já que é literalmente o único canal pelo qual qualquer comando motor, seja ele voluntário e originado no córtex, seja ele um reflexo espinhal primitivo, consegue efetivamente alcançar o músculo. Quando esse neurônio motor inferior é lesado, o resultado é o oposto ponto a ponto do que acabamos de descrever: os reflexos profundos desaparecem, porque o próprio braço eferente do arco reflexo está interrompido; o tônus cai, gerando flacidez; o sinal de Babinski não aparece, porque a via responsável por gerá-lo já está destruída na sua porção final, não haveria como executar esse reflexo mesmo que ele fosse desinibido; e a atrofia muscular é precoce, importante e acompanhada de fasciculações, pequenos abalos musculares visíveis sob a pele, refletindo descargas espontâneas de axônios motores doentes tentando, sem sucesso, manter contato funcional com fibras musculares que estão progressivamente perdendo seu suporte trófico neuronal.

Guardar esse contraste ponto a ponto, hiper-reflexia e espasticidade contra hiporreflexia e flacidez, Babinski presente contra Babinski ausente, atrofia tardia e discreta contra atrofia precoce e importante com fasciculações, é o que permite, só de examinar um paciente à beira do leito, restringir imediatamente a lesão a uma de duas grandes metades de toda a via motora,


antes mesmo de qualquer exame de imagem. Uma segunda ferramenta, complementar à primeira, é puramente topográfica: qual porção do corpo está fraca.



Uma monoparesia, fraqueza restrita a um único membro, aponta tipicamente para uma lesão focal e periférica, um nervo, um plexo ou uma raiz isolada, embora ocasionalmente possa refletir uma lesão cortical muito pequena e localizada. Uma hemiparesia, fraqueza de um lado inteiro do corpo, aponta para uma lesão acima da decussação piramidal, tipicamente no córtex, na substância branca subcortical ou no próprio tronco encefálico, sempre contralateral ao lado fraco quando a lesão está acima do bulbo, exatamente pela decussação que já detalhamos no capítulo sobre tronco encefálico.




Uma paraparesia, fraqueza simétrica restrita aos membros inferiores, aponta classicamente para uma lesão medular, já que é justamente na medula torácica e lombar que as fibras destinadas aos membros inferiores viajam isoladas das fibras destinadas aos membros superiores, embora, mais raramente, uma lesão cortical parassagital bilateral, comprimindo simetricamente ambos os territórios corticais que controlam os membros inferiores, como um meningioma da foice cerebral que já mencionamos no capítulo de oncologia, também possa gerar exatamente esse mesmo padrão.




E uma tetraparesia, fraqueza dos quatro membros, aponta para uma lesão cervical alta, para o tronco encefálico, ou para um processo verdadeiramente difuso, atingindo múltiplos nervos periféricos ao mesmo tempo, a junção neuromuscular inteira, ou a musculatura como um todo, e é justamente esse

último grupo, junto com as causas puramente medulares, que vai nos ocupar boa parte desse capítulo. Com essas duas ferramentas, neurônio motor superior contra inferior e o padrão topográfico da fraqueza, podemos agora percorrer sistematicamente cada elo da cadeia motora, do córtex ao músculo, revisitando o que já construímos em capítulos anteriores e preenchendo o que ainda faltava.

Córtex e Via Piramidal, já dedicamos capítulos inteiros às principais causas de lesão nesse nível, então aqui vamos apenas reunir o que já sabemos sob a ótica específica da paralisia. O AVC isquêmico ou hemorrágico, que já detalhamos extensamente nos capítulos de anatomia vascular e de farmacologia, é a causa mais comum de hemiparesia aguda de início súbito. Tumores, do capítulo de oncologia, geram fraqueza de instalação mais lenta e progressiva, muitas vezes acompanhada de outros sinais de efeito de massa. O TCE, do capítulo sobre manejo do trauma, pode gerar hemiparesia tanto por contusão cortical direta quanto por uma hérnia de uncus comprimindo o pedúnculo cerebral contralateral, um mecanismo que, curiosamente, pode gerar fraqueza no mesmo lado da lesão original, o chamado sinal de Kernohan, um dos poucos "falsos localizadores" que vale lembrar justamente por quebrar a regra geral de lateralidade que acabamos de estabelecer. E a esclerose múltipla, que acabamos de detalhar no capítulo anterior, gera fraqueza subaguda e recorrente quando as placas desmielinizantes atingem a via piramidal em qualquer ponto do seu longo trajeto. Vale abrir aqui um parêntese sobre um caso particular de paralisia que já apareceu duas vezes nesse livro sem que nunca tivéssemos parado para explicar sua lógica: a paralisia facial, dividida exatamente pela mesma distinção entre neurônio motor superior e inferior que acabamos de construir, só que aplicada a um nervo craniano ao invés de um membro.




Quando descrevemos o AVC de artéria cerebelar inferior anterior, no capítulo sobre anatomia vascular, usamos o termo "paralisia facial periférica", e quando descrevemos o glioma pontino infiltrativo, no capítulo de oncologia, usamos "paralisia facial central", e a diferença entre os dois não é apenas de nomenclatura. O núcleo do nervo facial, na ponte, recebe dois tipos de comando cortical descendente: a porção do núcleo responsável pela musculatura da testa e do fechamento palpebral recebe fibras corticobulbares de ambos os hemisférios, enquanto a porção responsável pela musculatura da metade inferior da face recebe fibras corticobulbares predominantemente do hemisfério contralateral. Isso significa que uma lesão acima do núcleo, como o glioma pontino que descrevemos comprimindo o trato corticoespinhal e corticobulbar antes de alcançarem os núcleos propriamente ditos, ou qualquer lesão cortical mais alta ainda, poupa a musculatura da testa, já que ela continua recebendo comando do hemisfério são, gerando a paralisia facial central, reconhecível clinicamente por um paciente que consegue enrugar a testa e fechar os olhos normalmente, mas perde a mímica da metade inferior do rosto contralateral à lesão.



Já uma lesão do próprio núcleo facial ou do nervo depois dele, como no AVC de cerebelar inferior anterior que atinge diretamente o núcleo dentro da ponte, ou como na paralisia de Bell, a forma idiopática mais comum na população geral, provavelmente relacionada a um processo inflamatório viral que edemacia o nervo dentro do seu canal ósseo estreito, compromete toda a musculatura facial daquele lado, testa incluída, já que agora a via final comum para ambas as porções do núcleo está interrompida, a mesma lógica de "via final comum" que já usamos para diferenciar neurônio motor superior de inferior nos membros, apenas aplicada, dessa vez, a um único nervo craniano.


Medula Espinhal, aqui reunimos praticamente um mosaico de capítulos anteriores. O trauma raquimedular, cujo manejo agudo em muitos aspectos espelha o que já detalhamos para o TCE, gera paraparesia ou tetraparesia dependendo do nível da lesão. A compressão medular crônica, seja por um tumor extradural do capítulo de oncologia, seja pela estenose degenerativa do canal vertebral que detalhamos no capítulo sobre envelhecimento, gera fraqueza de instalação insidiosa, tipicamente acompanhada de sinais de neurônio motor superior abaixo do nível comprimido.



As más formações que detalhamos no capítulo correspondente também pertencem aqui: a mielomeningocele gera paralisia flácida dos membros inferiores desde o nascimento, por comprometimento direto do próprio corno anterior e das raízes naquele nível, enquanto a siringomielia associada à malformação de Chiari gera, ao longo do tempo, um quadro misto, com fraqueza de neurônio motor inferior nos segmentos onde a cavidade siringomiélica expande e comprime diretamente o corno anterior, e sinais de neurônio motor superior abaixo disso, pela compressão adicional das vias descendentes que atravessam a medula naquele nível.


E a mielite transversa, uma inflamação aguda que pode atingir a medula de forma isolada ou como parte do espectro da esclerose múltipla já discutido no capítulo anterior, gera paraparesia ou tetraparesia de instalação subaguda, tipicamente acompanhada de um nível sensitivo bem definido no tronco, um detalhe semiológico que, por si só, já localiza a lesão na medula com boa precisão antes mesmo de qualquer exame de imagem. Vale destacar, dentro desse mesmo território, uma emergência cirúrgica que merece menção separada pela urgência do seu reconhecimento: a síndrome da cauda equina. A medula espinhal propriamente dita termina, como já vimos lá no primeiro

capítulo desse livro, por volta de L1-L2, formando o cone medular, e abaixo desse nível o canal vertebral contém apenas as raízes nervosas lombossacras descendo soltas dentro do saco dural até saírem cada uma pelo seu respectivo forame, literalmente parecendo uma cauda de cavalo, daí o nome.



Uma compressão nesse nível, tipicamente por uma hérnia discal volumosa na linha média, comprime múltiplas raízes nervosas simultaneamente, e não a medula em si, e por isso o quadro clínico resultante é de neurônio motor inferior, e não superior, apesar de estarmos falando de uma "lesão alta" dentro do canal vertebral, um bom lembrete de que o que determina o padrão clínico não é a altura da lesão em termos absolutos, mas se ela atinge a medula propriamente dita ou já as raízes nervosas soltas abaixo dela. Clinicamente, a tríade de alerta é dor lombar irradiada para ambas as pernas, anestesia em sela, a perda de sensibilidade especificamente na região que tocaria uma sela de cavalo, períneo, nádegas e face interna das coxas, e disfunção esfincteriana aguda, tipicamente retenção urinária. Diferente de praticamente tudo que discutimos até aqui, onde a urgência cirúrgica é frequentemente relativa, aqui o tempo é diretamente proporcional ao prognóstico de recuperação esfincteriana e motora, o que torna a síndrome da cauda equina, ao lado do próprio TCE que já detalhamos, uma das poucas verdadeiras urgências cirúrgicas de todo esse capítulo.


Corno Anterior da Medula, já conhecemos, do capítulo sobre genética, a atrofia muscular espinhal como a causa hereditária clássica de degeneração isolada do neurônio motor inferior nessa região. Vale agora apresentar seu contraponto adquirido e do adulto, a esclerose lateral amiotrófica, uma doença neurodegenerativa progressiva e, na maioria dos casos, sem causa hereditária identificável, que também tem como alvo principal os neurônios motores, mas com uma particularidade que a torna clinicamente única entre tudo que já vimos nesse capítulo: ela degenera tanto o neurônio motor superior quanto o neurônio motor inferior simultaneamente, e muitas vezes no mesmo segmento corporal, gerando a combinação clínica, à primeira vista contraditória, de fraqueza com hiper-reflexia e Babinski presente num membro que, ao mesmo tempo, apresenta atrofia importante e fasciculações visíveis, um quadro misto que só faz sentido quando lembramos que essas duas populações neuronais, apesar de anatomicamente distantes, podem ser alvo do mesmo processo neurodegenerativo convergente



.

A doença tipicamente poupa a musculatura ocular extrínseca e os esfíncteres até fases muito avançadas, um detalhe que ajuda a diferenciá-la de outras causas de fraqueza difusa, e sua progressão, infelizmente, é implacável, evoluindo ao longo de poucos anos para insuficiência respiratória por comprometimento da musculatura frênica e intercostal, a principal causa de óbito nesses pacientes.

Vale reconectar sua fisiopatologia com um mecanismo que já apareceu repetidas vezes ao longo desse livro, da encefalopatia hipóxico-isquêmica ao AVC: acredita-se que boa parte da morte neuronal progressiva nessa doença envolve excitotoxicidade mediada por glutamato, o mesmo excesso de sinalização excitatória e sobrecarga de cálcio intracelular que já detalhamos em contextos completamente diferentes, aqui operando de forma mais lenta e crônica ao invés de aguda.




É justamente sobre esse mecanismo que atua o riluzol, o único fármaco com benefício modesto, mas consistente, sobre a sobrevida nessa doença, reduzindo a liberação pré-sináptica de glutamato e, com isso, tentando conter discretamente essa mesma cascata excitotóxica que já vimos operar, com protagonistas diferentes, em praticamente todos os contextos de lesão neuronal aguda desse livro.

Nervo Periférico, já percorremos exaustivamente esse território nos capítulos sobre genética e sobre as características diferenciais do sistema nervoso periférico: a doença de Charcot-Marie-Tooth como causa hereditária estrutural, a síndrome de Guillain-Barré como causa autoimune aguda, e as neuropatias tóxicas e metabólicas, do álcool aos metais pesados, passando pelo diabetes no capítulo sobre envelhecimento, como causas adquiridas crônicas, todas convergindo para aquele mesmo padrão de neurônio motor inferior distal e comprimento-dependente que já se tornou familiar ao longo desse livro.

Junção Neuromuscular, esse é o único elo dessa cadeia inteira que esse livro


ainda não havia detalhado diretamente, e ele merece atenção especial porque introduz um padrão clínico genuinamente novo: a fadiga. Diferente de tudo que já vimos até aqui, onde a força, uma vez perdida, permanece perdida de forma relativamente estável ao longo do dia, as doenças da junção neuromuscular clássicas se caracterizam por uma fraqueza que piora com o uso repetido e melhora com o repouso, porque o problema não está na geração ou na condução do sinal elétrico, que permanecem intactas até esse ponto da cadeia, mas na quantidade de acetilcolina efetivamente disponível para ativar os receptores musculares a cada disparo sucessivo.



A miastenia gravis é a doença mais comum e mais representativa desse grupo, uma condição autoimune na qual anticorpos são produzidos contra os próprios receptores de acetilcolina na membrana pós-sináptica muscular. Vale entender, antes de descrever a doença em si, por que a junção neuromuscular normal tolera perder uma certa quantidade de receptores sem gerar sintoma nenhum: em condições fisiológicas, cada disparo nervoso libera acetilcolina em quantidade muito superior ao mínimo necessário para desencadear um potencial de ação muscular, uma reserva funcional que chamamos de fator de segurança, exatamente o mesmo tipo de conceito de reserva fisiológica que já usamos no capítulo sobre envelhecimento, aqui aplicado a uma sinapse específica ao invés de a um órgão inteiro.

É só quando a destruição autoimune de receptores ultrapassa essa margem de segurança que a transmissão neuromuscular começa a falhar clinicamente, o que explica por que a miastenia costuma se manifestar de forma insidiosa e só se tornar clinicamente óbvia depois que uma fração substancial dos receptores já foi perdida. Diferente da Guillain-Barré, onde o ataque autoimune

é contra a mielina, aqui o alvo é diretamente o receptor que recebe o neurotransmissor, e a cada disparo nervoso sucessivo, com menos receptores funcionais disponíveis para responder e com essa reserva de segurança já corroída, a força gerada vai progressivamente diminuindo ao longo de um esforço sustentado, o fenômeno de fatigabilidade que dá nome ao raciocínio diagnóstico inteiro dessa doença.




Classicamente, a musculatura ocular extrínseca e palpebral é a primeira e a mais sensivelmente afetada, gerando ptose e diplopia flutuantes, que pioram ao longo do dia ou após esforço visual sustentado, e podem progredir para envolvimento da musculatura bulbar, gerando disfagia e disartria, e da musculatura respiratória, configurando a crise miastênica, uma emergência que compartilha com a Guillain-Barré, discutida no capítulo anterior, a necessidade do mesmo monitoramento seriado da capacidade vital forçada que prometemos detalhar nesse capítulo.

A síndrome **miastênica de Eaton-Lambert** nasce de um mecanismo quase espelhado ao da miastenia gravis: ao invés de anticorpos contra o receptor pós-sináptico de acetilcolina, aqui os anticorpos atacam os canais de cálcio voltagem-dependentes na própria membrana pré-sináptica, os mesmos canais que já sabemos, desde os primeiros capítulos desse livro, serem indispensáveis para desencadear a fusão das vesículas sinápticas contendo acetilcolina. Com menos canais de cálcio funcionais, cada disparo nervoso libera menos acetilcolina do que deveria, e o resultado, curiosamente, é quase o oposto clínico da miastenia gravis: enquanto lá a força piora com o esforço repetido, aqui a força tende a melhorar transitoriamente nos primeiros

segundos de contração sustentada, porque disparos repetidos permitem algum acúmulo residual de cálcio pré-sináptico que parcialmente compensa o déficit de canais, um achado conhecido como facilitação, o inverso exato da fatigabilidade miastênica.


Figura 1. Miastenia gravis e mecanismo de doença.



Vale reconectar diretamente com o capítulo de oncologia: essa síndrome é classicamente paraneoplásica, mais comumente associada ao carcinoma pulmonar de pequenas células, no qual anticorpos originalmente produzidos contra canais de cálcio expressos pelo próprio tumor acabam, por reação cruzada, atacando os canais estruturalmente semelhantes da junção neuromuscular, tornando essa síndrome, em muitos casos, o primeiro sinal

clínico de um câncer ainda não diagnosticado.

O botulismo, cujo mecanismo já detalhamos com profundidade no capítulo de farmacologia ao contrastá-lo com a alfa-latrotoxina da viúva-negra: a toxina botulínica cliva as proteínas responsáveis pela fusão vesicular pré-sináptica, bloqueando fisicamente a liberação de acetilcolina, gerando uma paralisia flácida descendente, ao contrário do padrão ascendente clássico da Guillain-Barré, um detalhe semiológico que ajuda a diferenciar clinicamente as duas causas de paralisia aguda generalizada mesmo antes de qualquer exame complementar.




Músculo, o último elo da cadeia, onde já conhecemos, do capítulo de genética, a distrofia muscular de Duchenne como exemplo clássico de defeito estrutural hereditário da própria fibra muscular. Vale acrescentar aqui duas causas adquiridas relevantes. A paralisia periódica, um grupo de canalopatias nas quais mutações em canais iônicos musculares tornam a fibra muscular anormalmente sensível a flutuações do potássio sérico, gerando episódios recorrentes de fraqueza flácida generalizada.

Na forma hipocalêmica, a mais comum, uma refeição rica em carboidratos, gerando um pico de insulina que empurra potássio para dentro das células, ou exercício intenso seguido de repouso, são gatilhos clássicos, já que a queda aguda do potássio extracelular hiperpolariza a membrana muscular a ponto de torná-la temporariamente inexcitável, incapaz de gerar o potencial de ação que normalmente desencadearia a contração.

Na forma hipercalêmica, menos comum, o mecanismo é quase espelhado, um defeito no canal de sódio muscular que, diante de uma elevação mesmo discreta do potássio sérico, como a que ocorre naturalmente após exercício,

mantém a membrana anormalmente despolarizada e incapaz de se repolarizar o suficiente para dar início a um novo potencial de ação, gerando o mesmo desfecho final de fraqueza flácida por uma via iônica oposta.




E a miopatia do doente crítico, relevante especialmente no contexto que já discutimos no capítulo sobre manejo do trauma, na qual pacientes gravemente enfermos, expostos a imobilização prolongada, corticosteroides em altas doses e, por vezes, bloqueadores neuromusculares durante ventilação mecânica prolongada, desenvolvem fraqueza muscular difusa que pode dificultar significativamente o desmame da ventilação mecânica, um lembrete de que a própria unidade de terapia intensiva, com toda sua tecnologia de suporte, pode paradoxalmente contribuir para gerar exatamente o tipo de fraqueza que está tentando tratar.

Antes de seguirmos para o manejo propriamente dito, vale mencionar duas causas de paralisia que não se encaixam perfeitamente nessa cadeia anatômica, mas que aparecem com frequência suficiente na prática para merecerem reconhecimento.

A paralisia de Todd é um déficit motor focal, transitório e completamente reversível ao longo de minutos a poucas horas, que segue uma crise convulsiva focal, refletindo não uma lesão estrutural nova, mas uma exaustão metabólica e funcional temporária dos neurônios que acabaram de disparar excessivamente durante a crise, um diagnóstico de exclusão importante para não confundir com um AVC agudo sobreposto a uma crise convulsiva

coincidente.




A paralisia funcional, antes chamada de conversiva, na qual a fraqueza é genuinamente sentida e vivenciada pelo paciente, mas não corresponde a nenhuma lesão estrutural identificável ao longo de toda essa cadeia que acabamos de percorrer, reconhecida clinicamente por achados como o sinal de Hoover, no qual a extensão involuntária da perna contralateral, quando se pede ao paciente para flexionar a perna "fraca" contra resistência, revela força preservada por vias reflexas automáticas que escapam do controle voluntário consciente, uma condição que exige tanto sensibilidade quanto rigor

diagnóstico, já que o diagnóstico é feito por achados positivos característicos, não apenas pela ausência de uma causa estrutural encontrada.

Capítulo 17.2 | Manejo do Paciente.

Independente de qual elo da cadeia motora esteja comprometido, o manejo inicial de qualquer paciente com paralisia aguda ou rapidamente progressiva segue uma lógica comum, e a primeira prioridade, sempre, é respiratória. Já mencionamos duas vezes nesse capítulo, tanto para a Guillain-Barré quanto para a crise miastênica, a importância do monitoramento seriado da capacidade vital forçada, e vale agora explicar por que essa medida específica, e não apenas a saturação de oxigênio, é a que realmente importa nesse contexto.




A saturação de oxigênio medida por oximetria de pulso tende a permanecer normal até fases surpreendentemente tardias da insuficiência respiratória neuromuscular, porque a troca gasosa pulmonar em si permanece intacta até o fim, o problema não é o pulmão, é a bomba muscular que expande a caixa torácica, então um paciente pode estar silenciosamente se aproximando da exaustão diafragmática completa com uma saturação de oxigênio perfeitamente normal até o colapso abrupto.

A capacidade vital forçada, medindo diretamente o volume de ar que o paciente consegue mobilizar, captura essa deterioração muito antes, e valores

em queda progressiva, classicamente abaixo de determinados limiares absolutos, sinalizam a necessidade de intubação eletiva e ventilação mecânica antes que uma insuficiência respiratória franca e não planejada se instale. Uma segunda prioridade, para qualquer paciente com paralisia significativa e prolongada, é a prevenção ativa das complicações da própria imobilidade, que frequentemente causam mais morbidade a longo prazo do que a doença neurológica de base isoladamente.

A profilaxia de trombose venosa profunda, através de heparina em baixas doses ou de dispositivos de compressão pneumática intermitente, é indispensável, já que a estase venosa de membros paralisados é um dos três componentes clássicos da tríade de Virchow para trombose. O cuidado ativo com a pele, incluindo mudanças de decúbito regulares, previne úlceras de pressão em proeminências ósseas que, sem a sensibilidade e a mobilidade espontânea normais para redistribuir peso, se tornam vulneráveis à isquemia tecidual local sustentada. E a fisioterapia motora passiva regular previne contraturas articulares, o encurtamento permanente de músculos e tendões mantidos numa mesma posição por tempo prolongado sem a movimentação ativa que normalmente os manteria alongados.

Uma terceira consideração, específica de lesões medulares altas, acima aproximadamente do sexto segmento torácico, é a disreflexia autonômica, uma complicação que vale a pena entender mecanisticamente porque ela reconecta diretamente com a fisiologia do sistema nervoso autônomo que já tangenciamos em capítulos anteriores.



Abaixo do nível da lesão medular, o corpo continua gerando estímulos

aferentes normalmente, mais comumente distensão vesical ou intestinal, e esses estímulos ainda conseguem desencadear uma resposta simpática reflexa local na medula abaixo da lesão, vasoconstrição generalizada abaixo do nível lesado, elevando a pressão arterial de forma abrupta e potencialmente perigosa. Só que o sinal descendente que normalmente chegaria do tronco encefálico para conter e modular essa resposta simpática exagerada não consegue atravessar a lesão medular, então esse reflexo simpático fica completamente desinibido e sem contenção alguma, gerando picos hipertensivos graves, frequentemente acompanhados de bradicardia reflexa mediada pelo nervo vago, que permanece funcionalmente intacto e consegue detectar a hipertensão através dos barorreceptores acima da lesão, mas sem conseguir efetivamente conter a vasoconstrição que está ocorrendo abaixo dela, um verdadeiro desacoplamento entre a detecção do problema e a capacidade de corrigi-lo.


O manejo imediato é identificar e remover o estímulo desencadeante, mais comumente esvaziando a bexiga distendida, o que costuma resolver a crise rapidamente. Por fim, vale mencionar a disfunção vesical e intestinal neurogênica, já antecipada quando discutimos a mielomeningocele no capítulo sobre más formações, mas relevante para praticamente qualquer paralisia de origem medular: dependendo do nível e da natureza da lesão, a bexiga pode ficar espástica e hiper-reflexa, esvaziando de forma involuntária e incompleta, ou flácida e hipotônica, retendo grandes volumes sem gerar a sensação normal de plenitude, e o manejo, tipicamente através de cateterismo intermitente programado, é indispensável não apenas pelo conforto do paciente, mas porque a retenção urinária crônica não tratada é justamente um dos estímulos mais comuns para desencadear a disreflexia autonômica que acabamos de descrever, mais um lembrete de como esses diferentes aspectos do manejo estão interligados, não são itens isolados numa lista de tarefas.



Capítulo 17.3 | Fármacos Auxiliares para o Paciente.


Fechamos esse capítulo revisando, e em alguns casos finalmente detalhando, o arsenal farmacológico voltado especificamente para o paciente com paralisia, boa parte dele já mencionado de passagem em capítulos anteriores. Antes mesmo de qualquer fármaco voltado à causa neurológica de base, vale detalhar rapidamente o mecanismo por trás da profilaxia de trombose venosa profunda que já mencionamos no manejo geral desses pacientes, já que ela se aplica de forma praticamente universal a qualquer paciente com paralisia significativa.

A heparina não fracionada e as heparinas de baixo peso molecular, como a enoxaparina, atuam potencializando drasticamente a atividade de um inibidor natural da coagulação que já circula normalmente no plasma, a antitrombina, que sozinha neutraliza fatores de coagulação ativados de forma relativamente lenta; ao se ligar à antitrombina, a heparina induz uma mudança conformacional nessa molécula que acelera esse processo de neutralização em ordens de magnitude, essencialmente transformando um freio fraco num freio potente sobre a cascata de coagulação, reduzindo a formação do trombo que a estase venosa de um membro paralisado favorece.



No manejo da espasticidade, consequência típica de lesões de neurônio motor superior, o baclofeno, cujo mecanismo de superdose já detalhamos no capítulo sobre acidentes farmacológicos, é reaproveitado aqui em doses terapêuticas: o mesmo agonismo do receptor GABA-B que, em excesso, gera depressão do tronco encefálico e hipotonia generalizada, em doses controladas reduz especificamente a excitabilidade dos circuitos reflexos espinhais hiperativos que geram a espasticidade, restaurando parte do equilíbrio inibitório que a lesão do neurônio motor superior removeu.

A tizanidina segue uma lógica relacionada, mas por um receptor diferente, um agonista alfa-2 adrenérgico que reduz a liberação de neurotransmissores excitatórios nos próprios interneurônios espinhais envolvidos no arco reflexo hiperativo. E a toxina botulínica, cujo mecanismo de bloqueio da liberação de acetilcolina na junção neuromuscular já detalhamos tanto no capítulo de farmacologia quanto nesse próprio capítulo ao discutirmos o botulismo como causa de paralisia, é aplicada aqui de forma extremamente localizada, diretamente no músculo espástico específico, para reduzir focalmente sua contração excessiva sem gerar o efeito sistêmico generalizado que veríamos numa intoxicação verdadeira.



No manejo da dor neuropática, frequentemente associada a lesões de nervo periférico, a gabapentina e a pregabalina, cujo mecanismo de bloqueio de canais de cálcio pré-sinápticos já detalhamos no capítulo de farmacologia de uso contínuo, seguem sendo a base do tratamento, geralmente associadas, em casos mais refratários, aos antidepressivos tricíclicos em dose baixa, reforçando as vias descendentes inibitórias de dor pelo mesmo mecanismo que também já detalhamos naquele capítulo.

No manejo específico da miastenia gravis, a piridostigmina é o pilar sintomático inicial, um inibidor da acetilcolinesterase que, ao impedir a degradação da pouca acetilcolina liberada a cada disparo, prolonga sua disponibilidade na fenda sináptica e aumenta a chance dela encontrar um dos poucos receptores pós-sinápticos ainda não bloqueados pelos autoanticorpos, exatamente o mesmo princípio farmacológico geral que já vimos no capítulo sobre farmacologia das demências, quando detalhamos os inibidores da acetilcolinesterase usados no Alzheimer, aqui aplicado não ao déficit colinérgico central daquela doença, mas ao déficit funcional periférico da miastenia, um bom exemplo de como a mesma classe farmacológica pode ser reaproveitada para alvos anatômicos completamente diferentes dependendo

de onde exatamente a acetilcolina está escassa.

Para o controle da doença autoimune de base, e não apenas dos sintomas, entram os imunossupressores crônicos, e nas exacerbações agudas ou na crise miastênica, entram exatamente as mesmas duas estratégias que já mencionamos no capítulo anterior ao falar do tratamento agudo da Guillain-Barré e dos surtos de esclerose múltipla: a imunoglobulina intravenosa, que fornece um excesso de anticorpos normais capazes de saturar e neutralizar os mecanismos que amplificam a resposta autoimune do próprio paciente, e a plasmaférese, que remove fisicamente o plasma do paciente, e com ele os autoanticorpos patogênicos circulantes, substituindo-o por plasma ou albumina de doador, duas abordagens que, por caminhos mecanisticamente diferentes, um bloqueando e diluindo, o outro removendo fisicamente, convergem para o mesmo objetivo final de reduzir agudamente a carga de autoanticorpos circulantes disponíveis para continuar atacando a junção neuromuscular, a mielina periférica ou a mielina central, dependendo apenas de qual das doenças que já percorremos nesse capítulo e no anterior estamos tratando naquele momento.


Fechando esse capítulo, e com ele boa parte do raciocínio sobre a via motora que construímos ao longo desse livro inteiro, vale a mesma reflexão que já fizemos em capítulos anteriores sobre farmacologia: cada um desses fármacos, apesar de atuar em alvos moleculares completamente diferentes, existe para corrigir exatamente o mesmo tipo de desequilíbrio que já identificamos repetidamente, ou repondo um sinal que está faltando, como a acetilcolina retida pela piridostigmina, ou contendo um circuito que está hiperativo, como o baclofeno sobre a espasticidade, ou removendo diretamente um agressor circulante, como a plasmaférese sobre os autoanticorpos, a mesma lógica de raciocínio farmacológico que vem se repetindo, com pequenas variações de alvo, desde o primeiro capítulo em que discutimos fármacos nesse livro.

Capítulo 18 | Bactérias e Fungos.

Se o capítulo anterior nos ensinou que o sistema nervoso periférico é mais exposto imunologicamente do que o sistema nervoso central, protegido por uma barreira hemato-nervosa mais permissiva do que a barreira hematoencefálica, esse capítulo é, em boa parte, a consequência direta e mais literal possível dessa exposição diferencial: quando o agressor não é uma toxina, um autoanticorpo ou uma proteína mal dobrada, mas um organismo vivo tentando genuinamente colonizar o sistema nervoso, para se multiplicar às custas dele. Vale abrir com uma distinção geral entre os dois grandes grupos de agressores que vamos discutir, porque ela organiza intuitivamente tudo que vem a seguir.

As bactérias, de forma geral, se multiplicam rapidamente, em questão de horas, e por isso as infecções bacterianas do sistema nervoso tendem a ser agudas e fulminantes, uma corrida contra o tempo na qual cada hora de atraso no tratamento se traduz diretamente em pior desfecho neurológico. Os fungos, por outro lado, se multiplicam de forma muito mais lenta, e por isso as infecções fúngicas do sistema nervoso tendem a ser subagudas ou crônicas, se instalando ao longo de semanas, e praticamente sempre pressupõem algum grau de falha do sistema imunológico do hospedeiro, seja pelo HIV que já detalhamos no capítulo sobre encefalopatias, seja pela imunossupressão crônica que já mencionamos no capítulo sobre genética ao falarmos do manejo desses pacientes, seja por neutropenia induzida por quimioterapia, que já tangenciamos no capítulo de farmacologia oncológica.

Um fungo raramente vence um sistema imune competente, uma bactéria virulenta o suficiente pode vencer mesmo o mais competente deles, e essa assimetria de agressividade entre os dois grupos vai se refletir, de ponta a ponta, em tudo que vamos construir nesse capítulo, da apresentação clínica ao próprio racional dos fármacos que fecham o capítulo.



Capítulo 18.1 | Principais Bactérias que Afetam o S.N.P.

Hanseníase, causada pelo Mycobacterium leprae, essa é, sem exagero, a doença bacteriana mais intimamente conectada com tudo que construímos no capítulo anterior sobre o sistema nervoso periférico, porque seu alvo preferencial não é o neurônio nem o músculo, é exatamente a célula de Schwann. Esse bacilo tem duas propriedades que, juntas, explicam praticamente toda a doença.



A primeira é o tropismo direto pela célula de Schwann, infectando-a e utilizando sua maquinaria intracelular para se replicar lentamente, um processo que, com o tempo, desorganiza a própria arquitetura da mielina que aquela célula deveria manter, gerando desmielinização segmentar progressiva exatamente no mesmo tipo de célula que já sabemos, do capítulo anterior, ser capaz de se desdiferenciar e reconstruir bandas de Büngner diante de uma lesão axonal comum, só que aqui sob ataque contínuo, sem trégua para se reorganizar.

A segunda propriedade, e a que explica a distribuição corporal tão característica dessa doença, é que o Mycobacterium leprae cresce preferencialmente em temperaturas mais baixas do que a temperatura corporal central, o que faz com que a doença se concentre nas regiões mais frias do corpo, a pele e, especialmente, os nervos periféricos mais superficiais e mais próximos da superfície cutânea, como o nervo ulnar no cotovelo e o nervo fibular comum na altura do joelho, os mesmos pontos anatômicos de vulnerabilidade compressiva que já identificamos no capítulo anterior, agora vulneráveis por um motivo completamente diferente.

Clinicamente, a doença se apresenta ao longo de um espectro imunológico, não de uma forma clínica única, e vale entender esse espectro porque ele reflete diretamente a força da resposta imune do próprio hospedeiro contra o bacilo, não apenas a carga bacteriana em si.

No polo tuberculoide, um hospedeiro com resposta imune celular vigorosa contém a infecção de forma eficiente, mas essa mesma resposta inflamatória intensa acaba lesando extensamente os poucos nervos envolvidos, gerando poucas lesões de pele bem delimitadas e um comprometimento neural focal, mas grave, com espessamento palpável do nervo afetado, facilmente identificável ao exame físico, e perda sensitiva importante na região correspondente.



No polo lepromatoso, o oposto ocorre, uma resposta imune celular ineficiente permite proliferação bacilar disseminada, com múltiplas lesões cutâneas simétricas e comprometimento neural extenso, mas paradoxalmente mais insidioso e menos inflamatório localizadamente, resultando numa neuropatia sensitiva distal simétrica progressiva, o mesmo padrão comprimento-dependente que já se tornou familiar ao longo desse livro, aqui com uma causa infecciosa direta ao invés de tóxica, metabólica ou autoimune.

Em ambos os polos, a perda sensitiva precoce e silenciosa, especialmente térmica e dolorosa, é o que gera a complicação mais temida e mais desfigurante da doença: sem a sensação protetora normal de dor, pequenos traumas repetidos e despercebidos nas mãos e nos pés acumulam lesão física não percebida ao longo dos anos, levando a ulcerações crônicas, infecções secundárias e, eventualmente, reabsorção óssea distal, um quadro que tem muito mais a ver com a perda sensitiva silenciosa do que com qualquer destruição tecidual direta pela própria bactéria.



Difteria, causada pelo Corynebacterium diphtheriae, essa é uma neuropatia de mecanismo completamente diferente da hanseníase: aqui a bactéria em si nem precisa invadir o nervo, ela permanece localizada na orofaringe, mas secreta uma exotoxina extremamente potente que se dissemina pela corrente sanguínea e ataca à distância.

Essa toxina bloqueia a síntese proteica das células que invade, inativando um fator de elongação essencial para a tradução do RNA mensageiro em proteína, e as células de Schwann, com sua alta demanda contínua de síntese proteica para manter a bainha de mielina, são especialmente vulneráveis a esse bloqueio.

Clinicamente, a neuropatia diftérica segue um padrão bifásico característico e didático: primeiro, uma paralisia local precoce, tipicamente palatal e faríngea, decorrente da difusão direta da toxina a partir do foco de infecção na orofaringe para os nervos cranianos próximos, gerando voz anasalada e disfagia já na primeira semana de doença; depois, semanas mais tarde, uma polineuropatia sensitivomotora simétrica e ascendente generalizada, decorrente da toxina que conseguiu se disseminar hematogenicamente e atingir nervos periféricos por todo o corpo, um padrão temporal, achado local precoce seguido de achado generalizado tardio, que ajuda a diferenciar clinicamente a difteria de outras causas de paralisia ascendente aguda que já discutimos, como a Guillain-Barré.




PLATE XI. Diphtheria

Note the extension of the false membrane to the soft palate

Tétano, causado pelo Clostridium tetani, e vale colocá-lo lado a lado com o botulismo que já detalhamos em mais de um capítulo anterior, porque as duas doenças nascem de toxinas produzidas pelo mesmo gênero bacteriano, Clostridium, mas geram desfechos clínicos opostos por uma diferença fascinante de trajeto anatômico.

A toxina botulínica, como já sabemos, age localmente na própria junção neuromuscular onde é absorvida, bloqueando a liberação de acetilcolina e gerando paralisia flácida. A toxina tetânica, ao contrário, é absorvida na ferida contaminada, tipicamente um ferimento perfurante contaminado com esporos presentes no solo, mas ao invés de agir localmente, ela é captada pelo próprio terminal axonal motor periférico e viaja em sentido retrógrado, subindo pelo axônio até alcançar o corpo do neurônio motor no corno anterior da medula, o mesmo tipo de transporte axonal retrógrado que já mencionamos brevemente em capítulos anteriores, só que aqui sequestrado pela toxina como via de acesso ao sistema nervoso central.

Uma vez lá dentro, a toxina tetânica atravessa a sinapse em sentido transináptico e vai bloquear especificamente a liberação de neurotransmissores inibitórios, glicina e GABA, dos interneurônios espinhais

inibitórios que normalmente contêm e modulam o reflexo motor, incluindo aquelas mesmas células de Renshaw que fazem inibição recorrente sobre o próprio neurônio motor que acabou de disparar.

Sem essa contenção inibitória central, qualquer estímulo excitatório passa a gerar contração muscular descontrolada e sustentada, o oposto quase perfeito da paralisia flácida do botulismo: aqui temos rigidez muscular generalizada, trismo, o clássico espasmo dos masseteres que impede a abertura da boca, e o riso sardônico, a contração sustentada da musculatura facial, podendo evoluir para espasmos generalizados violentos o suficiente para gerar fraturas vertebrais pela própria intensidade da contração muscular. Duas toxinas do mesmo gênero bacteriano, uma agindo perifericamente e bloqueando excitação, outra viajando até o sistema nervoso central e bloqueando inibição, gerando os dois extremos opostos do espectro de disfunção motora que esse livro já construiu.

Doença de Lyme, causada pela espiroqueta Borrelia burgdorferi, transmitida pela picada de carrapatos do gênero Ixodes, merece menção mais breve nesse capítulo, mas com um achado neurológico particularmente característico: a paralisia facial periférica bilateral, simultânea ou quase simultânea nos dois lados da face, um achado raro o suficiente na maioria das outras causas de paralisia facial periférica, que costumam ser unilaterais, a ponto de a bilateralidade por si só já levantar fortemente a suspeita dessa doença específica em áreas endêmicas, além de radiculoneurite dolorosa e, ocasionalmente, comprometimento meníngeo associado que antecipa o próximo bloco desse capítulo.




Capítulo 18.2 | Principais Bactérias que Afetam o S.N.C.

Meningite Bacteriana, chegamos, finalmente, à doença que prometemos detalhar já em dois capítulos anteriores, tanto ao falarmos do baço quanto ao falarmos da fístula liquórica pós-traumática:
Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis e Haemophilus influenzae tipo b, os três principais agentes, todos compartilhando uma característica estrutural comum que já antecipamos no capítulo sobre órgãos secundários, uma cápsula polissacarídica espessa que dificulta o reconhecimento imunológico direto e que exige opsonização eficiente, normalmente fornecida pelo baço, para ser adequadamente combatida, o que explica por que pacientes asplênicos ou com disfunção esplênica, como discutimos para a anemia falciforme, são especialmente vulneráveis a esses três organismos específicos.




A via de acesso mais comum ao espaço subaracnóideo é hematogênica, a partir de um foco de colonização na nasofaringe que rompe as defesas locais e ganha a corrente sanguínea, embora, como já vimos ao falar de fratura de base de crânio no capítulo sobre TCE, exista também a via direta, através de uma fístula liquórica que cria uma comunicação aberta entre o ambiente

externo e o espaço subaracnóideo.
Uma vez que a bactéria alcança o líquor, ela encontra um ambiente quase ideal para proliferar sem grande oposição: o espaço subaracnóideo tem defesas imunológicas basais relativamente escassas, exatamente a mesma característica de privilégio imunológico do sistema nervoso central que já construímos no capítulo anterior, só que agora jogando a favor do invasor, não do hospedeiro.
A proliferação bacteriana ali dispara uma cascata inflamatória local intensa, com liberação maciça de citocinas, o mesmo tipo de resposta mediada por interleucina seis e fator de necrose tumoral alfa que já usamos repetidamente ao longo desse livro, e é essa resposta inflamatória do próprio hospedeiro, não a bactéria diretamente, que gera boa parte do dano neurológico: as citocinas aumentam a permeabilidade da barreira hematoencefálica, permitindo edema vasogênico e influxo adicional de proteínas e células inflamatórias; o próprio exsudato purulento se acumula nas cisternas basais e ao longo das convexidades, obstruindo mecanicamente a reabsorção normal de líquor pelas granulações aracnoides, exatamente o mesmo mecanismo de hidrocefalia obstrutiva que já vimos em outros contextos ao longo desse livro, aqui por pus ao invés de sangue ou de más formações; e a inflamação da parede dos vasos que atravessam o espaço subaracnóideo pode gerar vasculite secundária e infarto isquêmico, adicionando um componente vascular direto ao dano já em curso.




Clinicamente, a tríade clássica de febre, rigidez de nuca e alteração do estado mental reflete diretamente essa fisiopatologia: a rigidez de nuca, e os sinais de Kernig e Brudzinski que a acompanham, nascem da irritação mecânica das raízes nervosas e das meninges inflamadas quando o pescoço ou o membro inferior são movimentados, esticando meninges já hipersensíveis pelo processo inflamatório, um mecanismo de dor por tração que já vimos se repetir, com outras estruturas, em capítulos anteriores.

Um achado adicional e mais específico, embora menos sensível, é o exantema petequial da meningococcemia, no qual a própria bactéria, ao invadir a corrente sanguínea de forma maciça, dispara um processo de coagulação intravascular disseminada, consumindo plaquetas e fatores de coagulação e gerando pequenas hemorragias cutâneas difusas.




Vale entender melhor o mecanismo por trás desse processo, porque ele conecta diretamente com conceitos de coagulação que já tangenciamos em capítulos anteriores: a superfície externa da Neisseria meningitidis é rica em lipopolissacarídeo, uma molécula que, liberada em quantidade maciça durante a bacteremia, ativa diretamente a cascata de coagulação pela via do fator tecidual, ao mesmo tempo que lesa diretamente o endotélio vascular, um duplo estímulo pró-coagulante que consome progressivamente plaquetas e fatores de coagulação por todo o corpo, formando incontáveis microtrombos na microcirculação enquanto, paradoxalmente, o paciente fica cada vez mais propenso a sangrar em outros territórios pela própria depleção desses mesmos fatores, o quadro clássico de coagulopatia de consumo.

Em sua forma mais extrema, esse processo pode causar hemorragia bilateral maciça nas próprias glândulas adrenais, a síndrome **de Waterhouse-Friderichsen**, numa lógica de vulnerabilidade anatômica que vale a pena entender: as adrenais recebem um suprimento sanguíneo arterial abundante convergindo para uma drenagem venosa comparativamente mais estreita, criando uma espécie de gargalo vascular que as torna desproporcionalmente vulneráveis a congestão e hemorragia quando a microcirculação local trombosa, gerando insuficiência adrenal aguda somada ao choque séptico já em curso, uma das apresentações mais fulminantes de toda a medicina de urgência.



(Sindrome de Waterhouse-Friderichsen)

Antes de seguirmos ao abscesso propriamente parenquimatoso, vale mencionar duas coleções purulentas que se formam nos espaços que envolvem, mas não penetram, o parênquima cerebral, e que compartilham boa parte da lógica anatômica que já construímos para os hematomas no capítulo sobre TCE.



O empiema subdural, mais comumente uma complicação de sinusite frontal ou de meningite não adequadamente tratada, se acumula no mesmo espaço potencial entre dura-máter e aracnoide onde já vimos se formar o hematoma subdural, e por não ser contido por nenhuma barreira anatômica firme dentro desse espaço, tende a se espalhar rapidamente por toda a convexidade cerebral, configurando uma emergência cirúrgica de drenagem urgente.

O abscesso epidural, por sua vez, se forma entre a dura-máter e o osso, o

mesmo espaço do hematoma epidural clássico, e por isso, seguindo exatamente a mesma lógica anatômica que já construímos para o sangramento arterial naquele contexto, tende a permanecer mais localizado e contido pelas próprias suturas cranianas, que limitam sua disseminação da mesma forma que limitariam a expansão de um hematoma epidural.




(Abscesso epidural | Coluna Vertebral)

Vale abrir aqui uma exceção geográfica importante: o abscesso epidural também ocorre, e com relevância clínica igualmente grande, ao longo de toda a extensão da coluna vertebral, não apenas no crânio, e merece menção direta porque reconecta com o capítulo anterior sobre paralisia.

O abscesso epidural espinhal tipicamente se origina de disseminação hematogênica a partir de um foco distante, como uma infecção de pele ou o uso de drogas endovenosas, ou por extensão contígua a partir de uma discite ou osteomielite vertebral adjacente, mais comum em pacientes diabéticos, e o


Staphylococcus aureus é, disparadamente, o organismo mais frequentemente envolvido.

Uma vez formado, esse abscesso comprime diretamente a medula ou a cauda equina, dependendo do nível acometido, gerando exatamente o mesmo tipo de paraparesia ou tetraparesia de instalação subaguda por compressão medular que já sistematizamos no capítulo anterior, só que aqui por uma causa infecciosa ao invés de neoplásica ou degenerativa, e com uma urgência ainda maior, já que o atraso no reconhecimento e na drenagem cirúrgica desse abscesso especificamente se correlaciona de forma direta e bem documentada com a irreversibilidade do déficit motor resultante, tornando a tríade de dor lombar localizada, febre e déficit neurológico progressivo, mesmo isoladamente incompleta, motivo suficiente para investigação de imagem urgente nesse contexto.



O diagnóstico definitivo passa pela análise do líquor obtido por punção lombar, e vale aqui um exercício comparativo que amarra diretamente com o que já construímos no capítulo anterior sobre a síndrome de Guillain-Barré: naquela condição, vimos a dissociação albuminocitológica, proteína elevada com

celularidade normal, refletindo inflamação das raízes nervosas sem invasão direta do espaço liquórico por células inflamatórias. Na meningite bacteriana, o padrão é bem diferente, e mais intuitivo: proteína elevada, glicose liquórica marcadamente reduzida, já que as próprias bactérias consomem ativamente a glicose disponível no líquor como substrato metabólico, e celularidade elevada com predomínio de neutrófilos, refletindo o recrutamento maciço de células inflamatórias diretamente para dentro do espaço subaracnóideo infectado, o oposto ponto a ponto do padrão liquórico que vimos na Guillain-Barré.
Uma meningite viral, para completar esse quadro comparativo, tipicamente mostra glicose normal e celularidade elevada com predomínio linfocitário ao invés de neutrofílico, já que vírus não consomem glicose do líquor da mesma forma que bactérias o fazem, um terceiro padrão que, somado aos outros dois, transforma a análise do líquor numa ferramenta de raciocínio diferencial tão poderosa quanto qualquer exame de imagem.




Abscesso Cerebral, diferente da meningite, que se instala no espaço que envolve o encéfalo, o abscesso é uma infecção que se forma dentro do próprio parênquima cerebral, e sua origem mais comum é a extensão contígua a partir

de um foco infeccioso adjacente, como uma otite média, uma mastoidite ou uma sinusite crônica, embora também possa se formar por disseminação hematogênica a partir de um foco distante, e vale aqui uma reconexão direta com o próprio coração: pacientes com cardiopatias congênitas que permitem shunt direito-esquerdo, desviando sangue venoso, potencialmente carregado de bactérias, diretamente para a circulação arterial sistêmica sem passar pelo filtro capilar pulmonar que normalmente reteria esses êmbolos sépticos, têm risco aumentado de abscesso cerebral hematogênico justamente por esse desvio anatômico.




A formação do abscesso segue estágios progressivos bem definidos, que valem a pena entender porque eles têm implicação terapêutica direta. Inicialmente, temos a cerebrite, uma área de inflamação e infecção ainda mal delimitada, sem uma cápsula formada, estágio no qual o tratamento é predominantemente ou exclusivamente antibiótico, já que não existe ainda uma coleção purulenta bem definida para drenar cirurgicamente. Progressivamente, o próprio organismo tenta conter a infecção formando uma cápsula fibrosa ao redor do centro necrótico e purulento, um processo que reflete a mesma lógica de contenção que já vimos os astrócitos tentarem fazer diante de qualquer lesão do sistema nervoso central no capítulo anterior, só que aqui bem-sucedida o suficiente para gerar uma verdadeira parede de tecido fibroso e glial circundando o material infeccioso, e é justamente essa

cápsula bem formada, geralmente visível em exames de imagem como uma lesão com captação de contraste em anel, que torna a drenagem cirúrgica, além do antibiótico, geralmente necessária, já que um antibiótico sistêmico tem penetração limitada através dessa própria cápsula que o corpo formou para se proteger.



Tuberculose do Sistema Nervoso Central, causada pelo Mycobacterium tuberculosis, tipicamente por disseminação hematogênica a partir de um foco pulmonar primário, e merece atenção especial pela sua predileção anatômica característica: a meningite tuberculosa se concentra preferencialmente nas cisternas basais do encéfalo, a região ao redor do quiasma óptico e do tronco encefálico, ao invés de se distribuir difusamente pelas convexidades cerebrais como costuma ocorrer na meningite bacteriana piogênica clássica.
Essa predileção basal explica dois achados clínicos característicos: primeiro, o comprometimento frequente de múltiplos nervos cranianos, já que vários deles emergem justamente nessa região basal e ficam banhados pelo


exsudato inflamatório espesso e gelatinoso característico dessa infecção; segundo, a hidrocefalia comunicante, que se desenvolve com frequência e relativa rapidez, porque é exatamente nas cisternas basais que esse exsudato espesso mais compromete mecanicamente a circulação e a reabsorção normais do líquor.



Além da forma meníngea, a tuberculose também pode gerar tuberculomas, lesões expansivas parenquimatosas que se comportam clinicamente e radiologicamente de forma semelhante a um tumor ou a um abscesso, mais um item para a lista de diagnósticos diferenciais de lesão expansiva intracraniana que vamos sistematizar no próximo capítulo.

Neurossífilis, causada pela disseminação tardia do Treponema pallidum ao sistema nervoso central, tipicamente anos a décadas após a infecção primária não tratada, e vale reconectar diretamente com o capítulo sobre demências: uma de suas formas clássicas, a paralisia geral progressiva, gera um quadro demencial cortical difuso, com deterioração cognitiva, alterações de personalidade e, eventualmente, sinais motores, decorrente de invasão

parenquimatosa direta e crônica pelo próprio Treponema.



Outra forma clássica, a tabes dorsalis, ataca preferencialmente as raízes dorsais e os cordões posteriores da medula espinhal, exatamente as vias de propriocepção e sensibilidade vibratória que já detalhamos no primeiro capítulo desse livro, gerando ataxia sensitiva, que piora caracteristicamente quando o paciente fecha os olhos, já que perde a compensação visual para a propriocepção perdida, e dores lancinantes episódicas.

Um achado clássico e curioso dessa forma tardia é a pupila de Argyll Robertson, que acomoda normalmente ao olhar de perto, mas não reage à luz direta, refletindo uma lesão seletiva na região pré-tectal que compromete especificamente a via do reflexo fotomotor sem afetar a via, anatomicamente próxima mas distinta, que controla a miose de acomodação para perto, um achado que os livros mais antigos descreviam com a frase "que acomoda mas não reage", uma pequena pérola semiológica que sobrevive até hoje justamente pela sua precisão anatômica.



Capítulo 18.3 | Principais Fungos que Afetam o S.N.P.

Esse é, honestamente, o subcapítulo mais enxuto desse capítulo inteiro, e vale explicar o motivo ao invés de simplesmente preencher espaço artificialmente: fungos raramente têm um tropismo genuíno e isolado pelo sistema nervoso periférico da forma como vimos o Mycobacterium leprae ter pela célula de Schwann. Quando um fungo efetivamente compromete estruturas periféricas, isso costuma acontecer como parte de um processo mais amplo de invasão contígua a partir de estruturas vizinhas, tipicamente os seios paranasais, e não como uma neuropatia fúngica primária e isolada.

Mucormicose Rino-Órbito-Cerebral, o melhor exemplo dessa lógica de invasão contígua com comprometimento neural secundário. Fungos da ordem Mucorales, meses tipicamente inalados e depositados na mucosa nasal e nos seios paranasais, têm uma propriedade que já vimos ser compartilhada por poucos outros agressores nesse livro, o angiotropismo, invadindo diretamente a parede de vasos sanguíneos locais e causando trombose e infarto tecidual isquêmico à medida que se espalham.

Esses fungos, no entanto, também exibem uma capacidade documentada de invasão perineural, disseminando-se ao longo da bainha de nervos cranianos que atravessam essa região, como o nervo óptico e os nervos que controlam a motricidade ocular, o que explica por que um paciente com mucormicose invasiva pode desenvolver perda visual súbita e oftalmoplegia dolorosa antes mesmo de qualquer evidência clara de invasão intracraniana propriamente dita, o comprometimento do nervo periférico craniano servindo como sinal de alerta precoce de uma doença que, se não tratada agressivamente, seguirá


exatamente essas mesmas vias perineurais e vasculares até alcançar o parênquima encefálico, quando então passa a pertencer à próxima seção desse capítulo.



Capítulo 18.4 | Principais Fungos que Afetam o S.N.C.

Meningite Criptocócica, causada pelo Cryptococcus neoformans, é a infecção fúngica clássica e mais prevalente do sistema nervoso central, e sua epidemiologia reforça diretamente o que já estabelecemos na abertura desse capítulo: ela ocorre, de forma esmagadora, em pacientes com imunidade celular comprometida, sendo a infecção oportunista definidora de AIDS mais comum do sistema nervoso central em pacientes com contagens de linfócitos T CD4 muito baixas, reconectando diretamente com a encefalopatia por HIV que já detalhamos no capítulo sobre encefalopatias, embora também ocorra, com menor frequência, em pacientes cronicamente imunossuprimidos por outras causas, como o uso prolongado de corticosteroides ou imunossupressores após transplante de órgãos, que já mencionamos brevemente no capítulo sobre manejo de doenças genéticas.

A propriedade estrutural definidora desse fungo é sua espessa cápsula polissacarídica, visualizável ao microscópio por uma coloração especial com tinta nanquim, que cria um halo claro ao redor da célula fúngica facilmente reconhecível, e é justamente essa cápsula, que já discutimos ter um papel imunoevasivo direto ao dificultar a fagocitose, que também explica um dos achados mais característicos e mais praticamente relevantes dessa doença: a hipertensão intracraniana desproporcional à gravidade do processo inflamatório visível.



O acúmulo de material capsular polissacarídico dentro do espaço subaracnóideo obstrui mecanicamente as granulações aracnoides responsáveis pela reabsorção liquórica, de forma direta e física, gerando uma pressão de abertura à punção lombar frequentemente muito elevada, às vezes dramaticamente elevada, mesmo em pacientes com um exame de líquor relativamente pouco inflamatório em termos de celularidade, um padrão quase oposto ao que vimos na meningite bacteriana piogênica, onde a inflamação celular costuma ser exuberante.


Essa hipertensão intracraniana isolada é clinicamente tão relevante que seu manejo direto, através de punções lombares terapêuticas repetidas para aliviar mecanicamente a pressão, é parte integral do tratamento dessa doença, independentemente da terapia antifúngica em curso, um dos poucos exemplos nesse livro inteiro em que o alívio mecânico de pressão é tão importante quanto o tratamento da causa de base.

Diferente da meningite bacteriana, de curso fulminante em horas a poucos dias, a meningite criptocócica tipicamente se instala de forma subaguda, ao longo de dias a poucas semanas, com cefaleia progressiva e alterações sutis de comportamento e cognição precedendo por bastante tempo qualquer sinal meníngeo mais óbvio, exatamente o padrão temporal mais indolente que já antecipamos na introdução desse capítulo como característico das infecções fúngicas em geral.

Mucormicose e Aspergilose Invasivas do Sistema Nervoso Central, retomando a mucormicose que já apresentamos na seção anterior sobre nervos periféricos, quando a invasão perineural e vascular progride sem controle, o fungo eventualmente alcança o parênquima encefálico diretamente, tipicamente pelos lobos frontais, adjacentes aos seios etmoidais e à órbita, gerando necrose hemorrágica extensa pelo mesmo mecanismo angioinvasivo já descrito, trombose vascular direta seguida de infarto isquêmico do território correspondente, só que agora dentro do próprio encéfalo.

Um achado clínico característico e alarmante dessa doença, quando ainda restrita à região rino-orbital antes de progredir intracranialmente, é a presença de uma escara necrótica enegrecida no palato ou na mucosa nasal, refletindo diretamente a necrose tecidual isquêmica que o angiotropismo fúngico já está causando localmente, um sinal de alerta que exige intervenção cirúrgica de desbridamento extremamente agressiva e urgente, já que nenhum antifúngico sozinho penetra adequadamente em tecido já necrótico e desvascularizado.

Vale reforçar o principal fator de risco dessa doença, a cetoacidose diabética, que já detalhamos em outro contexto nesse livro: o ambiente ácido e rico em glicose favorece diretamente o crescimento fúngico, e a acidose reduz a capacidade de ligação da transferrina ao ferro circulante, aumentando a disponibilidade de ferro livre, um nutriente essencial para o crescimento desses fungos, dois fatores que, somados à disfunção imune já presente no diabetes mal controlado, explicam por que a cetoacidose diabética é, disparadamente, o cenário clínico mais associado a essa infecção devastadora.



A aspergilose invasiva do sistema nervoso central segue uma lógica angioinvasiva semelhante à da mucormicose, trombose vascular direta seguida de infarto hemorrágico, mas seu principal fator de risco é diferente e vale a distinção: ao invés da cetoacidose diabética, aqui o cenário clássico é a neutropenia profunda e prolongada, tipicamente em pacientes oncológicos submetidos a quimioterapia mieloablativa ou em receptores de transplante de medula óssea, reconectando diretamente com o capítulo de farmacologia oncológica, já que é justamente a ausência quase completa de neutrófilos funcionantes, a primeira linha de defesa contra esporos fúngicos inalados diariamente por qualquer pessoa sem gerar doença alguma, que permite a esse fungo, normalmente inofensivo, se tornar invasivo e potencialmente fatal.

Candidíase do Sistema Nervoso Central, fechando esse bloco com um padrão de acometimento diferente dos anteriores: ao invés de uma meningite clássica ou de uma lesão angioinvasiva única e destrutiva, a Candida tende a se disseminar hematogenicamente a partir de um foco sistêmico, tipicamente um cateter venoso central colonizado em pacientes de unidade de terapia intensiva ou recém-nascidos prematuros, e formar múltiplos microabscessos disseminados por todo o parênquima encefálico, um padrão miliar que reflete diretamente sua via de chegada, múltiplos pequenos êmbolos fúngicos se implantando simultaneamente em territórios vasculares diferentes, ao invés

de uma única via de invasão contígua e progressiva como vimos na mucormicose.

Paracoccidioidomicose, merece um espaço próprio nesse capítulo por um motivo que foge da lógica puramente fisiopatológica que guiou as escolhas anteriores: o Paracoccidioides brasiliensis, cujo próprio nome científico já entrega sua relevância geográfica, é endêmico justamente na América Latina, e particularmente no Brasil, que concentra a esmagadora maioria dos casos descritos mundialmente, tornando essa uma das poucas doenças desse capítulo inteiro com relevância epidemiológica direta e desproporcional para a realidade clínica em que você está se formando.



Figura 5 - Aspectos clínicos da forma crônica da paracoccidioidomicose. A - Lesões cutâneas em face resultantes de disseminação hematogênica. Lesões papulosas e úlcero-crostosas. B - Acometimento peri-oral e mentoniano. C - Linfonodos cervicais e submandibulares fistulizados. D - Lesão vegetante com bordos irregulares em região peri-anal.

A infecção se inicia quase sempre por inalação de esporos presentes no solo, tipicamente em trabalhadores rurais ou em pessoas com histórico de exposição a atividades agrícolas, formando um foco pulmonar primário que, na maioria das pessoas imunocompetentes, permanece contido e assintomático, de forma conceitualmente parecida com a tuberculose primária.

Em uma parcela dos pacientes, no entanto, especialmente naqueles com alguma fragilidade imunológica ou, curiosamente, com maior carga fúngica inalada inicialmente, o fungo dissemina-se hematogenicamente a partir desse

foco pulmonar para múltiplos outros órgãos, o sistema nervoso central incluído, num padrão de disseminação sistêmica que pode ocorrer mesmo anos após a exposição pulmonar inicial, num processo de reativação a partir de um foco que permanecia latente, o mesmo tipo de lógica temporal de latência e reativação tardia que já vimos, com outro organismo completamente diferente, ao falarmos de tuberculose.

No sistema nervoso central, a forma mais comum não é a meningite difusa, mas sim lesões expansivas focais, os paracoccidioidomas, que se comportam radiologicamente como lesões com efeito de massa e captação de contraste, entrando diretamente no mesmo diagnóstico diferencial de lesão expansiva intracraniana que já mencionamos para o tuberculoma e para o abscesso bacteriano, e que vamos sistematizar de forma mais completa no próximo capítulo.


Clinicamente, além dos sinais neurológicos focais correspondentes à localização da lesão, vale lembrar que a doença costuma deixar pistas fora do sistema nervoso que ajudam a levantar a suspeita diagnóstica, especialmente lesões mucocutâneas ulceradas características, envolvendo a mucosa oral e nasal, que frequentemente precedem ou acompanham o quadro neurológico e que, para qualquer médico formado dentro do contexto epidemiológico brasileiro, deveriam entrar rotineiramente no raciocínio diagnóstico diante de uma lesão expansiva intracraniana em paciente com histórico rural, muito antes de se considerar causas geograficamente mais distantes que os livros-texto internacionais tendem a priorizar.



Capítulo 18.5 | Fármacos para Tratamento Bacteriano.

Fechamos esse capítulo com o arsenal terapêutico, e vale começar pela decisão mais urgente e mais carregada de raciocínio fisiopatológico de toda essa seção: a escolha do esquema antibiótico empírico diante de uma suspeita de meningite bacteriana, antes mesmo de qualquer resultado de cultura, já que, como já estabelecemos, cada hora de atraso nessa doença se traduz diretamente em pior desfecho neurológico.

O esquema empírico clássico combina uma cefalosporina de terceira geração, geralmente a ceftriaxona, cobrindo a maioria das cepas de Streptococcus pneumoniae e de Neisseria meningitidis, com a vancomicina, adicionada especificamente pela crescente prevalência de cepas de pneumococo com sensibilidade reduzida às cefalosporinas, e, em determinadas faixas etárias, com a ampicilina, adicionada especificamente para cobrir a Listeria monocytogenes, um organismo que, diferente dos três agentes principais que já detalhamos, tem predileção por dois extremos de idade e de competência imunológica, neonatos, cujo sistema imune ainda está amadurecendo, e idosos ou imunossuprimidos, cuja imunidade celular já está em declínio, exatamente os mesmos grupos etários que, não por acaso, também vimos serem mais vulneráveis a outras infecções oportunistas ao longo desse capítulo.



Vale um parêntese sobre por que especificamente a ampicilina, e não a ceftriaxona já presente no esquema, é necessária para cobrir esse organismo em particular: a Listeria é intrinsecamente resistente a toda a classe das cefalosporinas, um detalhe farmacológico que obriga à adição de um agente de uma classe diferente sempre que esse organismo entra no diagnóstico diferencial, ao invés de simplesmente confiar que o espectro já amplo da cefalosporina de terceira geração resolveria sozinho.

Vale ainda notar, como curiosidade fisiopatológica que ajuda a explicar sua neurotropismo, que a Listeria é um patógeno intracelular facultativo capaz de induzir a própria polimerização do citoesqueleto de actina da célula que invade, propelindo-se fisicamente de uma célula para a célula vizinha adjacente sem nunca precisar se expor ao meio extracelular e, com isso, às defesas imunes humorais que ali a reconheceriam, uma estratégia de disseminação célula a célula que ajuda a explicar sua notável capacidade de atravessar barreiras epiteliais e endoteliais, placenta incluída, o que também torna a listeriose particularmente perigosa na gestação.

Vale um comentário mecanístico sobre um desafio farmacocinético que já tangenciamos indiretamente ao longo desse livro inteiro: a maioria dos antibióticos, incluindo boa parte das cefalosporinas, penetra mal através de uma barreira hematoencefálica íntegra e não inflamada, exatamente a mesma barreira que já discutimos protegendo o sistema nervoso central de toxinas e patógenos circulantes.

A boa notícia, paradoxal, é que a própria inflamação meníngea gerada pela infecção aumenta transitoriamente a permeabilidade dessa barreira, como já vimos ao construir a fisiopatologia da meningite nesse mesmo capítulo,

permitindo que doses adequadamente altas desses antibióticos consigam atingir concentrações terapêuticas no líquor durante a fase aguda da doença, uma penetração que se perde progressivamente conforme o tratamento funciona e a inflamação, e com ela a permeabilidade aumentada da barreira, começa a resolver, o que explica por que as doses usadas no tratamento da meningite costumam ser desproporcionalmente mais altas do que as usadas para infecções do mesmo organismo em outros sítios do corpo.



Ainda dentro do tratamento da meningite bacteriana, vale destacar o papel da dexametasona como adjuvante, administrada idealmente já junto com, ou mesmo discretamente antes, da primeira dose de antibiótico, e não depois. O raciocínio por trás desse detalhe de tempo reconecta diretamente com a fisiopatologia que já construímos: quando o antibiótico começa a matar as bactérias, ele rompe suas paredes celulares e libera, de uma só vez, uma quantidade ainda maior de componentes bacterianos pró-inflamatórios no espaço subaracnóideo, momentaneamente amplificando, ao invés de reduzindo, a cascata inflamatória mediada por citocinas que já identificamos como boa parte do próprio mecanismo de dano nessa doença.

A dexametasona, administrada nesse momento crítico, amortece essa resposta inflamatória amplificada pela própria lise bacteriana induzida pelo antibiótico, reduzindo de forma comprovada a incidência de sequelas, especialmente a perda auditiva neurossensorial que costuma acompanhar a meningite por Haemophilus influenzae. Para contatos próximos de um caso confirmado de meningite meningocócica, a rifampicina profilática, ou alternativas como a ciprofloxacina, tem papel bem estabelecido, erradicando o

estado de portador assintomático na nasofaringe antes que ele se traduza em doença invasiva num contato ainda não infectado.

No tratamento da hanseníase, o esquema poliquimioterápico padrão combina rifampicina, dapsona e clofazimina, uma combinação de múltiplos fármacos que, assim como já vimos no tratamento da tuberculose, existe especificamente para minimizar o desenvolvimento de resistência bacteriana, já que a chance de um único bacilo desenvolver mutações de resistência simultaneamente contra três mecanismos de ação diferentes é drasticamente menor do que contra um único fármaco isolado, a mesma lógica de combinação farmacológica que, aliás, também sustenta o esquema quádruplo clássico de tratamento da tuberculose do sistema nervoso central, que exige, adicionalmente, uma duração de tratamento consideravelmente mais prolongada do que a tuberculose pulmonar isolada, justamente pela dificuldade de penetração e pela lenta resolução do exsudato inflamatório espesso nas cisternas basais que já descrevemos.

Por fim, no tratamento da neurossífilis, a penicilina cristalina intravenosa em altas doses continua sendo, décadas após sua introdução, o tratamento de escolha praticamente inquestionável, um dos raros exemplos na medicina moderna de um antibiótico tão antigo permanecer como primeira linha absoluta, sem qualquer alternativa oral ou de mecanismo mais novo tendo conseguido superá-lo em eficácia comprovada contra o Treponema pallidum no sistema nervoso central.

Capítulo 18.6 | Fármacos para Tratamento Fúngico.

Fechamos o capítulo, e com ele boa parte do raciocínio farmacológico construído ao longo desse livro, com os antifúngicos, e aqui o princípio central que organiza toda a classe é a diferença fundamental entre a membrana celular fúngica e a membrana celular humana: enquanto nossas células utilizam colesterol como o principal esterol estabilizador de membrana, as células fúngicas utilizam um esterol estrutural e funcionalmente análogo, mas quimicamente distinto, o ergosterol, e é justamente essa diferença molecular que a maioria dos antifúngicos sistêmicos explora para atingir seletividade terapêutica.

A anfotericina B, historicamente o pilar do tratamento das infecções fúngicas invasivas do sistema nervoso central, incluindo a meningite criptocócica grave e a mucormicose, liga-se diretamente ao ergosterol presente na membrana fúngica e forma poros transmembrana, essencialmente perfurando a célula fúngica e permitindo o extravasamento descontrolado de íons e do conteúdo celular, levando à morte celular.

O problema, e a razão pela qual esse fármaco carrega tanta reputação de toxicidade, é que a anfotericina B não é perfeitamente seletiva, ela também tem alguma afinidade residual pelo colesterol das nossas próprias membranas celulares, especialmente nas células tubulares renais, o que explica sua nefrotoxicidade dose-dependente característica e a necessidade de monitoramento renal cuidadoso durante o tratamento, um lembrete direto do mesmo princípio de seletividade imperfeita que já vimos se repetir para outros fármacos ao longo desse livro.

Os antifúngicos azólicos, como o fluconazol, atuam por um mecanismo diferente e anterior na mesma via biossintética, inibindo uma enzima dependente do citocromo P450 fúngico responsável por uma etapa específica da própria síntese do ergosterol, reduzindo assim sua disponibilidade na membrana ao invés de atacar diretamente o ergosterol já formado.

O fluconazol, especificamente, merece destaque adicional nesse capítulo pela sua excelente penetração no sistema nervoso central, atravessando a barreira hematoencefálica de forma muito mais eficiente do que a maioria dos outros antifúngicos disponíveis, o que o torna a escolha preferencial para terapia de manutenção prolongada após o tratamento agudo da meningite criptocócica, prevenindo recidiva num paciente cuja imunidade de base, tipicamente pela infecção por HIV subjacente, muitas vezes continua comprometida por bastante tempo.

A flucitosina, frequentemente associada à anfotericina B no tratamento inicial da meningite criptocócica grave, segue uma lógica de ação completamente diferente das duas classes anteriores: ela é captada seletivamente pela célula fúngica e convertida internamente, por uma enzima fúngica específica ausente em células humanas, numa molécula que se incorpora diretamente na síntese de RNA fúngico e interfere na síntese de DNA, essencialmente sequestrando a maquinaria de replicação do próprio fungo contra ele mesmo, e sua associação com a anfotericina B nessa doença específica reflete um benefício sinérgico bem documentado, no qual os poros de membrana formados pela anfotericina B facilitam a entrada da própria flucitosina na célula fúngica, aumentando sua eficácia combinada além da soma dos dois efeitos isolados.

Por fim, vale mencionar, mais pela ausência de indicação do que pela presença dela, uma classe mais recente de antifúngicos, as equinocandinas, que atuam inibindo diretamente a síntese da parede celular fúngica, um alvo estrutural que sequer existe nas nossas próprias células, o que teoricamente as tornaria antifúngicos quase idealmente seletivos.

Na prática, porém, essa classe tem penetração extremamente limitada através da barreira hematoencefálica, o que a torna, apesar de amplamente utilizada para infecções fúngicas invasivas em outros sítios do corpo,

praticamente inútil para o tratamento de infecções fúngicas do sistema nervoso central, um lembrete final e apropriado para fechar esse capítulo: no sistema nervoso, a eficácia teórica de um fármaco contra o organismo-alvo importa menos do que sua capacidade real de atravessar a mesma barreira que, ironicamente, esse livro inteiro passou construindo como a grande protetora desse sistema, e que aqui se torna, também, o maior obstáculo ao próprio tratamento.





Fig 1. MRI from Patient 1: A) T1- weighted, B) FLAIR and C) and D) T2-weighted axial images showing diffuse periventricular lesions, hyperintense in T2- weighted and FLAIR and hypointense in T1 with gadolinium enhancement. See methods for acquisition parameters.

Capítulo 19 | Tomografia Computadorizada e Raio-X.

Ao longo desse livro inteiro, praticamente todo capítulo que envolveu uma doença estrutural, do trauma às más formações, passando pela oncologia e agora pelas infecções, trouxe consigo alguma referência a um achado de imagem, uma tomografia hiperdensa aqui, uma captação de contraste em anel ali, uma calcificação nos núcleos da base mais adiante.

Fiz isso propositalmente de forma pontual, descrevendo o achado relevante para cada doença específica no momento em que ela era discutida, mas nunca paramos para construir, de forma sistemática, o raciocínio por trás da própria ferramenta que gera essas imagens. Esse capítulo existe para fazer exatamente isso: não vamos aprender doenças novas, vamos aprender a olhar, de forma organizada, para as mesmas doenças que já construímos ao longo de dezoito capítulos, e no processo, transformar uma coleção de achados isolados numa competência de leitura de imagem genuína.




Antes de entrarmos nos achados propriamente ditos, precisamos entender o princípio físico básico por trás da tomografia computadorizada, porque é esse princípio que dá sentido a tudo que vem a seguir. Um aparelho de tomografia gira um feixe de raios-X ao redor da cabeça do paciente, e detectores do lado oposto medem quanto desse feixe consegue atravessar o tecido sem ser


absorvido, a chamada atenuação. Tecidos diferentes atenuam o feixe de raios-X em graus diferentes, dependendo basicamente da sua densidade física e do seu número atômico médio, e um computador reconstrói, a partir de milhares dessas medidas de atenuação tomadas em ângulos diferentes, uma imagem em fatias na qual cada ponto recebe um valor numérico de atenuação, medido numa escala padronizada chamada unidades Hounsfield, na qual a água, por convenção, vale exatamente zero, o ar vale um valor extremamente negativo, e o osso denso vale um valor extremamente positivo.

Na prática, quando olhamos para uma tomografia de crânio, essa escala numérica é convertida numa escala de cinza, na qual estruturas que atenuam muito o feixe, absorvendo boa parte dele, aparecem brancas, e chamamos de hiperdensas, enquanto estruturas que atenuam pouco o feixe, deixando-o atravessar quase livremente até o detector, aparecem escuras, e chamamos de hipodensas. O osso, extremamente denso e rico em cálcio, um elemento de número atômico relativamente alto, aparece branco brilhante.

O ar, dentro dos seios paranasais ou de uma cavidade patológica, aparece preto absoluto. A gordura, com densidade ligeiramente menor que a da água, aparece discretamente mais escura que o parênquima cerebral ao redor. E o próprio parênquima encefálico ocupa uma faixa intermediária estreita da escala, na qual a substância cinzenta, mais rica em corpos neuronais e vasos, aparece discretamente mais clara do que a substância branca, mais rica em mielina lipídica, uma diferenciação sutil, mas suficiente para o olho treinado reconhecer a anatomia cortical normal e, mais importante ainda, reconhecer quando essa diferenciação sutil se perde, um dos primeiros sinais radiológicos do AVC isquêmico hiperagudo que vamos detalhar mais à frente.




Vale ainda entender o mecanismo por trás do contraste iodado endovenoso, usado em boa parte dos protocolos de tomografia relevantes para esse livro, porque ele não é um corante que simplesmente "pinta" tecido doente, ele funciona por um princípio fisiológico direto que já construímos repetidamente ao longo desse livro: o iodo, um elemento de número atômico alto, é fortemente atenuante e aparece hiperdenso onde quer que se acumule, e sua distribuição normal fica restrita ao compartimento vascular, já que, num sistema nervoso central saudável, a barreira hematoencefálica que já detalhamos exaustivamente impede sua passagem livre para o parênquima. Quando essa barreira está comprometida, seja pela neovascularização desorganizada e permeável de um tumor maligno, seja pela inflamação de um abscesso ou de uma meningite, seja pela quebra estrutural direta causada por qualquer processo patológico agressivo, o contraste extravasa para fora dos vasos e se acumula localmente, marcando literalmente, na imagem, exatamente os locais onde essa barreira parou de fazer seu trabalho, transformando cada exame com contraste numa espécie de mapa funcional da integridade da barreira hematoencefálica, e não apenas um mapa anatômico estrutural.




Uma última peça técnica vale ser entendida antes de partirmos para os achados propriamente ditos, porque ela explica por que a mesma tomografia pode ser mostrada de formas visualmente tão diferentes dependendo de quem a exibe: a escala de unidades Hounsfield que acabamos de descrever é ampla

demais, com milhares de valores possíveis, para que o olho humano consiga distinguir todas as suas gradações simultaneamente numa única imagem em tons de cinza, que só consegue representar um número limitado de tons distinguíveis de uma vez. Por isso, todo exame é exibido através de uma distinguíveis de uma vez. Por isso, todo exame é exibido através de uma janela, um intervalo específico de unidades Hounsfield escolhido deliberadamente para maximizar o contraste visual dentro da faixa de densidade que mais interessa naquele momento, jogando fora, deliberadamente, a capacidade de diferenciar tons fora dessa faixa escolhida. A janela de parênquima cerebral, a mais comumente usada e a que temos usado implicitamente ao longo de toda essa seção, é estreita e centrada na faixa de densidade do próprio tecido encefálico, permitindo diferenciar substância cinzenta de branca e identificar sutilezas de edema, mas nessa mesma janela o osso aparece uniformemente branco estourado, sem detalhe interno algum, e uma fratura fina pode passar despercebida. A janela óssea, ao contrário, é ampla e deslocada para valores de densidade muito mais altos, revelando detalhes finos da própria estrutura óssea, como as linhas de fratura que vamos detalhar mais à frente nesse capítulo, mas nessa mesma janela todo o parênquima cerebral colapsa numa massa cinzenta uniforme e sem qualquer detalhe útil. E existe ainda uma janela intermediária, a janela de sangue ou subdural, ajustada especificamente para diferenciar melhor coleções hemorrágicas finas encostadas na própria superfície interna do crânio, que na janela de parênquima padrão podem se confundir opticamente com o próprio osso adjacente, igualmente hiperdenso naquela escala mais estreita. Um mesmo exame, três janelas diferentes, três "verdades" visuais diferentes extraídas exatamente dos mesmos dados brutos de atenuação, e reconhecer que uma tomografia normal na janela de parênquima pode perfeitamente esconder uma fratura óssea sutil, visível apenas na janela óssea correspondente, é o tipo de raciocínio que separa uma leitura de imagem superficial de uma leitura genuinamente completa.



Capítulo 19.1 | Principais Achados da T.C. de Crânio.


Hiperdensidades Agudas e o Sangue, o sangue recém-extravasado é hiperdenso porque a hemoglobina, rica em proteína e em ferro, atenua o feixe de raios-X mais intensamente do que o parênquima cerebral normal ao redor, e já construímos, no capítulo sobre manejo do TCE, boa parte do raciocínio necessário para localizar esse sangue pela sua própria forma geométrica.
O hematoma epidural, contido pelas suturas cranianas e formando-se entre o crânio e a dura-máter firmemente aderida a ele, assume classicamente uma forma biconvexa, como uma lente.
O hematoma subdural, livre para se espalhar por todo o espaço potencial entre dura-máter e aracnoide, assume a forma de crescente, acompanhando difusamente a convexidade cerebral.



A hemorragia subaracnóidea, tipicamente decorrente da ruptura de um aneurisma que já discutimos no capítulo de anatomia vascular, se distribui de forma característica seguindo o próprio contorno dos sulcos corticais e das cisternas basais, já que é exatamente nesse espaço, banhado por líquor, que ela se acumula, gerando um padrão hiperdenso que preenche literalmente o desenho das cisternas ao redor do tronco encefálico, um achado que, quando suficientemente sutil, pode escapar de um olhar menos treinado justamente por não formar uma coleção arredondada óbvia como as anteriores.
A hemorragia intraparenquimatosa, tipicamente hipertensiva ou relacionada a angiopatia amiloide nos idosos, forma uma coleção hiperdensa diretamente dentro do próprio tecido cerebral, com predileção, na forma hipertensiva clássica, pelos núcleos da base e pelo tálamo, territórios irrigados pelas mesmas pequenas artérias perfurantes que já identificamos no capítulo sobre demência vascular como vulneráveis à lipohialinose crônica.

Vale reforçar, e agora explicar de forma mais completa, um fenômeno que já antecipamos no capítulo sobre TCE: a densidade do sangue extravasado muda de forma previsível ao longo do tempo, hiperdenso na fase aguda, passando por uma fase isodensa, mais difícil de identificar, e finalmente hipodenso na fase crônica. A explicação completa está na própria proteína hemoglobina: no sangue fresco, ela está intacta e em alta concentração dentro do coágulo, gerando a hiperdensidade inicial que já conhecemos.
Ao longo de dias a poucas semanas, as hemácias se lisam e a hemoglobina começa a se degradar em produtos menores e vai sendo progressivamente reabsorvida e diluída por líquido que migra para dentro da coleção, um


processo que reduz progressivamente a concentração proteica efetiva daquele espaço até ela se tornar transitoriamente equivalente, em termos de atenuação, ao parênquima cerebral normal ao redor, a fase isodensa, e depois inferior a ele, a fase hipodensa crônica, na qual o que sobra é essencialmente um espaço preenchido por líquido de degradação, com densidade próxima à do próprio líquor.




Hipodensidades e o Espectro Isquêmico, se o sangue fresco é hiperdenso, o tecido isquêmico segue a lógica oposta, e entender por quê exige revisitarmos brevemente a fisiopatologia do AVC que já construímos no capítulo de anatomia vascular. Nas primeiras horas após a oclusão de um vaso, a falência

energética celular que já detalhamos leva ao edema citotóxico, água se deslocando para dentro das células por falência das bombas iônicas dependentes de ATP, e esse aumento discreto do conteúdo de água tecidual já é suficiente para reduzir sutilmente a atenuação daquela área em relação ao parênquima normal ao redor, gerando os primeiros sinais tomográficos do AVC isquêmico hiperagudo, tipicamente sutis o suficiente para passarem despercebidos por um olhar não treinado nas primeiras horas: perda da diferenciação entre substância cinzenta e branca que já mencionamos, e apagamento dos sulcos corticais na região afetada pelo edema já em


formação.




Ao longo do primeiro ou segundo dia, esse edema citotóxico se acentua e se soma a algum grau de edema vasogênico secundário, e a hipodensidade se torna progressivamente mais óbvia e mais bem delimitada, seguindo classicamente o território vascular específico que foi ocluído, um mapa quase didático da própria anatomia vascular que já construímos naquele capítulo. Esse mesmo princípio de edema gerando hipodensidade se aplica, por um mecanismo ligeiramente diferente, ao edema vasogênico que já vimos circundar tumores no capítulo de oncologia, no qual a barreira hematoencefálica rompida pelo próprio tumor permite extravasamento de líquido rico em proteína para o espaço extracelular da substância branca adjacente, gerando uma hipodensidade digitiforme característica que acompanha os tratos de substância branca ao redor da lesão, distinguível, com treino, da hipodensidade mais homogênea e delimitada por território vascular do AVC isquêmico.



Vale mencionar ainda um achado precoce que foge dessa lógica de hipodensidade parenquimatosa, porque ele não está no próprio tecido cerebral, mas dentro do vaso ocluído: o sinal da artéria cerebral média hiperdensa, no qual o próprio trombo agudo, fresco e rico em elementos figurados do sangue, aparece como um segmento arterial anormalmente hiperdenso em comparação aos vasos contralaterais, visível classicamente já nos primeiros minutos após a oclusão, muito antes de qualquer hipodensidade parenquimatosa secundária ter tido tempo de se formar, um dos poucos achados tomográficos verdadeiramente hiperagudos do AVC isquêmico e um lembrete direto de que, ocasionalmente, a pista mais precoce de uma lesão não está no território que vai sofrer, mas no próprio encanamento que está entupido.




Captação de Contraste e o Diagnóstico Diferencial da Lesão em Anel, esse é, provavelmente, o exercício de raciocínio radiológico mais valioso desse capítulo inteiro, porque reúne, numa única pergunta, doenças que discutimos em capítulos completamente diferentes desse livro. Quando uma lesão intracraniana capta contraste especificamente na sua periferia, formando um anel hipercaptante ao redor de um centro que não capta, alguns mecanismos fisiopatológicos distintos podem gerar exatamente esse mesmo padrão geométrico, e diferenciá-los depende de reunir o contexto clínico com detalhes mais sutis da própria imagem.



O abscesso cerebral, que acabamos de detalhar no capítulo anterior, forma esse anel porque sua cápsula fibrosa e ricamente vascularizada, construída pelo


próprio hospedeiro na tentativa de conter a infecção, capta contraste intensamente, enquanto o centro necrótico e purulento, avascular, não capta nada; classicamente, essa cápsula tende a ser relativamente fina e uniforme, mais espessa no polo cortical, mais fina no polo voltado para os ventrículos, refletindo diferenças locais de vascularização durante sua formação.
O glioblastoma, o astrocitoma de grau quatro que já detalhamos no capítulo de oncologia, também forma classicamente um anel de captação, mas aqui o motivo é diferente, esse anel corresponde à periferia proliferativa e densamente vascularizada do tumor, enquanto o centro sofre necrose isquêmica por ter crescido além da capacidade da sua própria neovascularização caótica de sustentá-lo, e esse anel tumoral tende a ser mais espesso e mais irregular do que o do abscesso, com contornos internos menos uniformes.
Uma lesão desmielinizante ativa da esclerose múltipla, que já detalhamos no capítulo sobre características diferenciais do sistema nervoso periférico, pode ocasionalmente também captar contraste em anel durante um surto agudo, tipicamente um anel mais fino, incompleto e aberto numa das bordas, o chamado sinal do anel aberto, refletindo a frente de desmielinização ativa avançando radialmente a partir de uma vênula central, um padrão geométrico mais sutil, mas real, que a diferencia das duas anteriores quando presente. E vale mencionar, mesmo sem termos dedicado um capítulo à parasitologia nesse livro, que a toxoplasmose cerebral, tipicamente em pacientes com imunossupressão avançada pelo HIV, o mesmo contexto imunológico que já nos acompanhou repetidamente desde o capítulo sobre encefalopatias, também é uma causa clássica e extremamente prevalente de lesões múltiplas em anel, geralmente localizadas preferencialmente nos núcleos da base, e entra rotineiramente nesse mesmo diagnóstico diferencial na prática clínica real.



Reunir contexto clínico, febre e leucocitose sugerindo abscesso, imunossupressão por HIV sugerindo toxoplasmose, ausência de febre com sintomas mais insidiosos sugerindo tumor, história prévia de surtos neurológicos sugerindo desmielinização, com esses detalhes geométricos mais sutis da própria lesão, é o que transforma essa lista de quatro possibilidades numa hipótese diagnóstica hierarquizada, ao invés de uma simples enumeração.

Vale ainda mencionar dois outros padrões de captação, mais diretos de interpretar. A captação homogênea e intensa, preenchendo toda a lesão sem um centro poupado, é o padrão clássico do meningioma que já detalhamos no capítulo de oncologia, refletindo sua origem extra-axial, bem vascularizada e sem o centro necrótico que caracteriza os tumores mais agressivos e de crescimento mais rápido que ultrapassam sua própria capacidade de suprimento sanguíneo. E a captação leptomeníngea, contornando finamente a superfície do encéfalo e preenchendo os sulcos ao invés de formar uma massa discreta, é o achado clássico da meningite que acabamos de detalhar no capítulo anterior, refletindo diretamente a inflamação e a quebra da barreira hematoencefálica ao longo de toda a superfície pial inflamada, não

localizada a um único ponto.




Calcificações, nem toda hiperdensidade numa tomografia de crânio é sangue agudo, e diferenciar uma calcificação de uma hemorragia é, na maioria dos casos, direto: a calcificação tende a ser ainda mais densa que o sangue fresco, com bordas mais nítidas e definidas, e, crucialmente, não muda de aparência num exame de controle feito dias depois, já que não está passando por nenhum processo biológico de degradação como o sangue está.

Algumas calcificações são inteiramente normais e esperadas, como a calcificação fisiológica da glândula pineal e dos plexos coroides, achados tão comuns em adultos que sua ausência completa, paradoxalmente, é que às vezes chama mais atenção.

Outras calcificações são diretamente patológicas e já apareceram em capítulos anteriores desse livro: o oligodendroglioma, que já detalhamos no capítulo de oncologia, tem predileção conhecida por calcificações intratumorais, refletindo seu crescimento mais lento e mais indolente em comparação aos astrocitomas puros; e a deposição de metais pesados nos núcleos da base, que já descrevemos ao falar de intoxicações no capítulo sobre acidentes farmacológicos e ambientais, também pode gerar densificação bilateral e simétrica dessas estruturas, um padrão distinto das calcificações tumorais justamente pela sua simetria e pela ausência de qualquer efeito de massa associado.


Efeito de Massa e Herniação, qualquer lesão expansiva suficientemente grande, seja hematoma, tumor ou abscesso, eventualmente ultrapassa a capacidade compensatória que já discutimos repetidamente ao longo desse livro através da lei de Monro-Kellie, e os sinais tomográficos desse esgotamento compensatório seguem uma progressão relativamente previsível.




Primeiro, observamos apagamento dos sulcos corticais e das cisternas basais adjacentes à lesão, o próprio espaço de líquor sendo fisicamente comprimido antes de qualquer estrutura mais nobre ser deslocada. Progressivamente, surge o desvio de linha média, a distância entre estruturas centrais normalmente simétricas, como o septo pelúcido, e a linha média óssea teórica do crânio, um valor que se correlaciona diretamente, e de forma bem documentada, com o nível de consciência do paciente, quanto maior o desvio, maior a probabilidade de rebaixamento sensorial associado.

Em estágios mais avançados, o próprio tecido cerebral é empurrado através de aberturas anatômicas fixas, gerando os diferentes tipos de herniação que já detalhamos extensamente no capítulo sobre TCE: a herniação uncal, visível como apagamento ou obliteração da cisterna supraselar pelo deslocamento medial do úncus comprimindo o mesencéfalo, e a herniação tonsilar, visível como descida das tonsilas cerebelares através do forame magno, achado que, quando encontrado de forma crônica e não aguda, nos remete diretamente à malformação de Chiari que já detalhamos no capítulo sobre más formações embrionárias, mais um lembrete de que o mesmo achado de imagem pode representar um processo agudo e catastrófico ou uma condição crônica e


estável, dependendo inteiramente do contexto clínico que o acompanha.



Hidrocefalia, já construímos, ao longo de múltiplos capítulos, praticamente toda a fisiopatologia necessária para interpretar a dilatação ventricular na tomografia, então aqui vale apenas organizar esse raciocínio. Uma dilatação ventricular que afeta todos os ventrículos de forma proporcional, incluindo o quarto ventrículo na fossa posterior, sugere hidrocefalia comunicante, um problema de reabsorção liquórica downstream, como já vimos na meningite bacteriana e na meningite tuberculosa do capítulo anterior, obstruindo as granulações aracnoides ou as cisternas basais.




Já uma dilatação que poupa seletivamente o quarto ventrículo, afetando apenas os ventrículos laterais e o terceiro ventrículo, sugere hidrocefalia obstrutiva não comunicante, com o bloqueio ocorrendo em algum ponto específico do trajeto liquórico normal antes de alcançar aquele quarto ventrículo, como vimos no astrocitoma subependimário de células gigantes da esclerose tuberosa obstruindo o forame de Monro, no capítulo de genética.
Um sinal indireto, mas valioso, que acompanha a hidrocefalia aguda de qualquer origem é o arredondamento dos cornos temporais dos ventrículos laterais, normalmente colabados e praticamente invisíveis num sistema ventricular sob pressão normal, e que se tornam visivelmente dilatados assim que essa pressão liquórica se eleva, frequentemente um dos primeiros sinais a aparecer, antes mesmo de o restante do sistema ventricular se dilatar de forma mais óbvia. E a dilatação ventricular desproporcional ao grau de atrofia cortical presente, sem sinais de obstrução aguda, nos remete diretamente à hidrocefalia de pressão normal que já detalhamos no capítulo sobre demências, uma diferenciação, ventrículos grandes por pressão contra ventrículos grandes por espaço vago deixado pela atrofia, que retoma exatamente a mesma lógica que acabamos de aplicar à própria atrofia cerebral na seção anterior.



Atrofia Cerebral e Seus Padrões, vale fechar o bloco de achados parenquimatosos com uma alteração que não é, por si só, uma lesão aguda, mas que aparece repetidamente como pano de fundo em boa parte das doenças crônicas que já discutimos, e reconhecer seu padrão de distribuição ajuda a apontar de volta para a causa de base.
A atrofia se manifesta na tomografia como alargamento dos sulcos corticais e


dilatação ventricular proporcional, o próprio espaço liquórico expandindo-se passivamente para preencher o volume que o parênquima perdido deixou de ocupar, o oposto conceitual da hidrocefalia que vamos detalhar a seguir, na qual os ventrículos dilatam empurrando o parênquima, não substituindo-o.
Uma atrofia difusa e simétrica é o achado esperado e relativamente inespecífico do envelhecimento fisiológico normal que já detalhamos em capítulo próprio, enquanto uma atrofia desproporcionalmente concentrada no hipocampo e no lobo temporal medial aponta diretamente para a doença de Alzheimer que já construímos no capítulo sobre demências.
Uma atrofia de predomínio frontal e temporal anterior, especialmente quando assimétrica entre os dois hemisférios, aponta para a demência frontotemporal, também detalhada naquele mesmo capítulo. E uma atrofia cortical difusa, mas com relativa preservação do volume hipocampal apesar de sintomas cognitivos importantes, é a pista de imagem que ajuda a diferenciar a demência por corpos de Lewy do Alzheimer, exatamente como já antecipamos naquele capítulo.



Vale lembrar ainda, reconectando com os dois capítulos mais recentes desse livro, que a atrofia cortical também é achado esperado no alcoolismo crônico, com predileção relativa pelo lobo frontal, e na encefalopatia pelo HIV avançado e não tratado, que já detalhamos no capítulo sobre encefalopatias, um lembrete de que a mesma alteração estrutural inespecífica, espaço a mais

onde deveria haver parênquima, pode ter origens fisiológicas, neurodegenerativas, tóxicas ou infecciosas completamente diferentes, e é sempre o padrão de distribuição, nunca a atrofia isolada em si, que carrega o verdadeiro valor diagnóstico.


Alterações Ósseas, fechando esse bloco antes de passarmos ao raio-X propriamente dito, vale lembrar que a tomografia, com sua excelente resolução para tecido de alta densidade, especialmente quando reconstruída na janela óssea que já descrevemos, também é a ferramenta ideal para caracterizar o próprio osso craniano, visualizando com precisão as linhas de fratura que já detalhamos no capítulo sobre TCE, e também alterações mais insidiosas, como a erosão óssea localizada causada pelo crescimento lento e persistente de um tumor extra-axial adjacente, como o próprio meningioma, ou a destruição óssea mais irregular e agressiva causada por um processo infeccioso ativo, como a osteomielite vertebral que já mencionamos como precursora do abscesso epidural espinhal no capítulo anterior.



Capítulo 19.2 | Principais Achados no Raio-X de Crânio.

Antes de qualquer achado específico, vale entender por que dedicamos um subcapítulo inteiro e claramente menor a essa modalidade, e a resposta está na própria física por trás dela. Diferente da tomografia, que gira um feixe ao redor da cabeça inteira e reconstrói matematicamente uma imagem em fatias, o raio-X simples projeta um único feixe através de toda a espessura do crânio de uma só vez, produzindo uma única imagem bidimensional que representa a soma de tudo que o feixe atravessou pelo caminho, ossos, tecidos moles e ar, todos sobrepostos numa mesma imagem plana, sem a capacidade de separar estruturas por profundidade que a tomografia oferece.


Essa limitação fundamental significa que o raio-X simples de crânio praticamente não consegue diferenciar as sutilezas de tecido mole que ocuparam boa parte da seção anterior, sangue, edema, tumor, todos se confundem numa mesma sombra de tecido mole indistinguível, e é exatamente por isso que a tomografia praticamente substituiu o raio-X simples como ferramenta de investigação neurológica na maioria dos contextos clínicos modernos. O que o raio-X ainda faz bem, e faz rapidamente e a baixo custo, é mostrar estruturas com alto contraste natural em relação ao tecido mole ao redor, essencialmente osso e ar, e é exatamente nesses dois tipos de achado que essa seção vai se concentrar.



Linhas de Fratura versus Suturas Cranianas, o desafio mais clássico e mais citado da leitura de um raio-X de crânio pediátrico é diferenciar uma linha de fratura verdadeira de uma sutura craniana normal, já que ambas aparecem como linhas radiolucentes, mais escuras que o osso denso ao redor.
As suturas, que já detalhamos extensamente no capítulo sobre desenvolvimento neural como os pontos de encontro entre os diferentes ossos do crânio, seguem localizações anatômicas fixas e simétricas, bilaterais quando aplicável, e tipicamente exibem bordas onduladas, serrilhadas ou

levemente escleróticas, refletindo a interdigitação óssea gradual e biologicamente organizada que caracteriza seu desenvolvimento normal.
Uma linha de fratura, por outro lado, tende a seguir um trajeto mais reto e mais imprevisível, sem respeitar a localização anatômica fixa das suturas, com bordas mais nítidas, agudas e não escleróticas, e frequentemente exibe um trajeto que se ramifica de forma mais angulada e irregular do que a ondulação suave e previsível de uma sutura, além de, obviamente, corresponder ao local de impacto relatado na história clínica, um detalhe contextual que, na prática, muitas vezes pesa tanto quanto qualquer

característica puramente radiológica na hora de fechar essa diferenciação.



Vale ainda diferenciar os próprios subtipos de fratura entre si, já que essa classificação carrega implicação prática direta e reconecta com o capítulo sobre TCE. A fratura linear simples, uma única linha radiolucente sem desvio dos fragmentos ósseos, é o tipo mais comum e, isoladamente, muitas vezes o menos preocupante, desde que não cruze um trajeto vascular importante, como o sulco da artéria meníngea média, cuja lesão associada já sabemos, do capítulo sobre TCE, ser a origem clássica do hematoma epidural.
A fratura afundada, na qual um fragmento ósseo é deslocado internamente, abaixo do nível esperado da tábua óssea ao redor, carrega risco direto de laceração da dura-máter e do próprio córtex subjacente pelo fragmento deslocado, e sua profundidade de afundamento, tipicamente comparada à espessura do próprio osso adjacente, ajuda a definir a necessidade de elevação cirúrgica. E a fratura diastática, na qual a linha de fratura efetivamente separa e alarga uma sutura craniana existente ao invés de atravessar o osso propriamente dito, ocorre preferencialmente em crianças, cujas suturas ainda não estão completamente fusionadas e por isso representam um ponto de menor resistência mecânica ao impacto, mais um

eco direto do que já construímos sobre a vulnerabilidade craniana específica da infância no capítulo sobre desenvolvimento neural.



Sinais Indiretos de Fratura de Base de Crânio, já detalhamos, no capítulo sobre TCE, a fisiopatologia e as manifestações clínicas clássicas da fratura de base de crânio, os sinais de Battle e o olho de guaxinim decorrentes do extravasamento sanguíneo através de planos teciduais específicos.
No raio-X simples, essa mesma fratura pode ser difícil de visualizar diretamente, pela complexidade anatômica sobreposta dessa região, mas frequentemente deixa pistas indiretas mais fáceis de reconhecer: níveis hidroaéreos dentro dos seios paranasais, uma linha horizontal nítida separando uma camada de ar, mais escura, na porção superior do seio, de uma camada de sangue acumulado, mais clara, na porção inferior, refletindo sangramento para dentro de um seio normalmente preenchido apenas por ar;

e a pneumoencéfalo, a presença de ar livre dentro da própria cavidade craniana, um achado que, à primeira vista, parece contraintuitivo, ar sendo mais escuro que qualquer tecido mole ao redor e por isso fácil de reconhecer como uma bolha anormalmente radiolucente dentro do crânio, mas que representa diretamente a mesma comunicação aberta entre o ambiente externo e o espaço intracraniano que já identificamos, em mais de um capítulo


anterior, como a via de entrada para a meningite pós-traumática.



O Sinal da Impressão Digital, um achado mais raro, mas didaticamente valioso, especialmente relevante em crianças: quando a pressão intracraniana permanece cronicamente elevada por tempo suficiente, tipicamente por hidrocefalia não tratada ou por craniossinostose envolvendo múltiplas suturas, que já detalhamos no capítulo sobre más formações embrionárias, a pulsação constante e transmitida do próprio parênquima cerebral contra a superfície interna do crânio, ainda maleável na infância, remodela progressivamente o osso, criando múltiplas áreas ovaladas de afinamento

ósseo que, no raio-X, lembram visualmente as marcas deixadas por dedos pressionados contra uma superfície maleável, o chamado sinal da impressão digital ou crânio em cobre batido, um achado que, embora hoje raramente seja o método de detecção inicial de hipertensão intracraniana crônica, continua


sendo um exemplo elegante de como a física relativamente simples do raio-X ainda consegue capturar consequências de processos fisiopatológicos complexos que já construímos ao longo desse livro inteiro.



Onde o Raio-X Ainda Compete, vale fechar esse capítulo, e com ele boa parte do raciocínio de imagem construído ao longo desse livro, reconhecendo que a inferioridade geral do raio-X simples em relação à tomografia não significa irrelevância completa. Em cenários de trauma agudo com recursos limitados, ou como triagem inicial extremamente rápida antes de um exame mais definitivo, o raio-X ainda cumpre um papel prático real. E existe um cenário específico em que ele continua sendo, até hoje, a ferramenta de escolha rotineira: o acompanhamento de derivações ventriculares já instaladas, como aquelas usadas no tratamento cirúrgico da hidrocefalia que já discutimos em mais de um capítulo anterior, através do que se chama uma série de shunt, uma sequência de radiografias simples cobrindo todo o trajeto do cateter, do crânio até o abdome, especificamente porque o raio-X é rápido, amplamente disponível, de baixa radiação e excelente para uma única finalidade muito específica, confirmar a continuidade física do próprio cateter radiopaco, identificando desconexões ou fraturas do dispositivo ao longo do seu trajeto

subcutâneo, uma tarefa para a qual toda a sofisticação de reconstrução em fatias da tomografia seria, na prática, um desperdício de recurso para um problema que é, no fundo, puramente mecânico.

Fechamos esse capítulo, e com ele o núcleo técnico desse livro, com uma reflexão que vale a pena carregar para a prática clínica real: nenhuma tomografia ou radiografia se interpreta sozinha, isolada da história e do exame físico do paciente que a gerou. Cada achado que sistematizamos aqui, cada hiperdensidade, cada anel de captação, cada padrão de atrofia, só ganha significado diagnóstico completo quando emparelhado com o raciocínio fisiopatológico que construímos, doença por doença, ao longo dos dezoito capítulos anteriores. A imagem responde à pergunta "onde" e, com frequência, "há quanto tempo", mas raramente responde sozinha à pergunta "por quê", e é essa terceira pergunta, a que efetivamente conecta um achado estrutural a um mecanismo biológico compreendido, que transforma um leitor de imagens num clínico capaz de tratar o paciente por trás dela, não apenas de descrever o que vê.



Capítulo 20 | Finalização.

Acabamos, foi uma longa jornada, no final o que eu planejava escrever apenas 1 capitulo por dia saiu de controle e acabei escrevendo 3, 4, até 5 capítulos diariamente, o que fez com que o livro acabasse mais cedo, hoje no dia 15/07/2026 eu acabo de finalizar meu segundo livro, emocionante, é a palavra que me resta para descrever essa sensação, meu sonho é me tornar neurocirurgião e escrever um livro focado em neurologia para mim foi um marco gigantesco, adiciona a isso a comparação com meu primeiro livro, existe um ditado que é: ´´primeiro você começa, depois aperfeiçoa´´, o meu primeiro livro terminou com ´´apenas´´ 67 páginas e 16.000 palavras, porem foi graças ao meu primeiro livro que esse segundo existe, e graças a esse segundo existir eu pude me aprimorar e perceber como poderia melhorar o meu primeiro livro.

A mensagem que eu gostaria de deixar para quem estiver lendo esse livro é: dê o primeiro passo, muitas vezes temos receio de começar algo, medo de errar ou medo de não ser aquilo que você está imaginando, porém é justamente esse medo que nos prende, o mais curioso é que o medo por si só não existe na realidade, apenas em nossas mentes sobre assuntos futuros que ainda não estão presentes, o medo em si não é real, por isso não devemos deixar um fruto da nossa memória roubar o nosso presente.

Para o meu eu do futuro: Continue, não deixe pensamentos te arrastarem como ancoras para trás, siga em frente e não perca sua dedicação e paixão pela vida, pelas pessoas e pelo conhecimento.

OBRIGADO POR TER CHEGADO ATÉ O FINAL, ESPERO QUE O LIVRO TE AGRADE E AGREGUE EM CONHECIMENTOS!!

Todos os direitos reservados à: **Fabrício Zorzin Borges** ----------
---